

1938 — 1939 NEUNUNDZWANZIGSTER JAHRGANG

O D E N W Ä L D E R PFLANZENKULTUREN lirdolf 67stle.

KAYSER & SEIBERT

INHABER: HANS KAYSER UND HEINRICH SEIBERT

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegr.-Adr.: Kayser Seibert, Roßdorf-Darmstadt Fernsprecher: Ober-Ramstadt 368 · Postscheck-Konto: Frankfurt a. M. Nr. 6147 · Bank-Konten: Deutsche Bank und Disconto-Ges., Fil. Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigst. Roßdorf

Großkulturen und Versand aller winterharten Gartenpflanzen

Blumenstauden und Zierpflanzen sind kein unnötiger Luxus, denn der Umgang mit ihnen bringt jedem Schaffenden die so notwendige Entspannung von anstrengender Tagesarbeit

Inhalts-Übersicht:

	Seite
Wissenswertes	4
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	5-8
Neuheiten und Seltenheiten	9-16
Niedrig bleibende Stauden für Felsanlagen und Steingärten .	17-47
Opuntien (Winterharte Kakteen)	34
Mittelhohe und hohe Stauden für Rabatten u. Blumenschnitt	48-73
Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter	73
Bambusen und Ziergräser	74-75
Sumpf- und Wasserstauden	75-76
Seerosen (Nymphaea)	76
Garten-Blumenzwiebeln und Mignon-Dahlien	77-78
Freilandfarne	78-79
Heidekräuter	79-80
Immergrüne und Moorbeetpflanzen	80-82
Felsensträucher (Zwerggehölze)	82-87
Zwergkoniferen	87
Schönblühende und dekorative Ziergehölze	89-91
Koniferen (Nadelhölzer)	92
Allee- und Zierbäume	92
Hängebäume	92
Heckengehölze	92
Schlingpflanzen	93
Rosen, auch Edel-Wildrosen und Schlingrosen	94
Obstbäume und Beerensträucher	95
Staudensamen	96-98
Pflanzen-Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke	99
Was passt zusammen?	100
Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen	101-102
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis	103-104
Versandbedingungen	lagseite

Zeichenerklärungen

In dem Bestreben, unseren Katalog durch gewissenhafte Ausarbeitung immer mehr zu einem willkommenen Nachschlagewerk sowohl für den Fachmann als auch für den Pflanzenfreund auszugestalten, haben wir die Zeichen, die bei jeder Pflanzenart angeben, für welche Zwecke sie sich besonders eignet und welchen Standort sie verlangt, vermehrt und strenger angewendet. Nachstehend die Erklärungen zu den einzelnen Zeichen.

- O = für sonnigen Standort
- □ = Große Trockenheit ertragend, natürlich auch in normalem Gartenboden gedeihend
- Halbschatten liebend oder vertragend
- Schatten liebend oder vertragend
- △ = für Steingärten oder Alpinums besonders geeignet
- || = für Felsspalten und Mauerfugen
- <u>a</u> = Polsterpflanze, Rasenersatzstaude
- : = für Einfassungen geeignet
- = Rabattenstaude
- x = für Blumenschnitt geeignet
- ⊥ = Solitärstaude (für Einzelstellung)
- ≅ = für feuchten Standort
- A = Winterschutz verlangend
- = durch Herbstlaubfärbung zierend
- # = Immergrün

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben: III = März, IV = April, V = Mai usw. und die Durchschnitts-Höhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) in cm.

Zum Schlusse des Kataloges finden Sie noch Pflanzenzusammenstellungen für die verschiedensten Zwecke der Gartengestaltung, die Ihnen die Auswahl ebenfalls wesentlich erleichtern werden. Außerdem haben wir ein Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen aufgenommen, welches es Ihnen ermöglicht, zu einer Pflanze von der Sie nur den deutschen Namen kennen, den botanischen Namen festzustellen. Es ist dabei zu beachten, daß manche Pflanze unter verschiedenen deutschen Namen geht. Und nicht zuletzt die sicher willkommene Auswahl: Was paßt zusammen.

Die reichere und bessere Bebilderung wird ebenfalls manche neue Anregung geben und unserer Pflanzenwelt immer wieder neue Freunde zuführen.

Wissenswertes

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind viele Jahre ausdauernde, krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert. Bei den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde ab, um im Frühjahr wieder freudig auszutreiben. Stauden waren schon früher die Lieblinge des deutschen Volkes. Aus alten Kloster-, Pfarr- und Bauerngärten wurden sie wieder hervorgeholt und durch unermüdlichen Züchterfleiß zur heutigen vollendeten Schönheit und Leistungsfähigkeit empor gezüchtet. Sammler und Forscher haben ferner aus allen, unserem Klima verwandten Zonen der ganzen Welt, neue Staudenschätze herbeigetragen.

Versand und Empfang.

Alle Pflanzen werden durch geschultes Personal so sorgfältig verpackt, daß sie auch den weitesten Transport tadellos überstehen. Bei Frostgefahr werden die Pflanzen frostsicher verpackt. — Können die Pflanzen nicht gleich gepflanzt werden, so schlage man sie sorgfältig ein, wobei der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben sein soll. Der Einschlag ist bei heißem Wetter zeitweise zu überbrausen. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag in einem hellen, frostfreien Raum vor. Sendungen die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem nicht warmen, aber frostfreiem Raum oder im Keller auftauen; sie werden dann bestimmt keinen Schaden erleiden.

Pflanzzeit:

Im Frühjahr: nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai. Im Herbst: von Anfang September bis zum Eintritt des Winters, d. h. also, solange der Boden offen ist. Einen großen Teil Stauden, hauptsächlich Alpine, halten wir in Töpfen vorrätig, so daß sie das ganze Jahr über verschickt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Pflanzung.

Stauden gedeihen in jedem Gartenboden. Vor der Pflanzung ist der Boden gut umzugraben. Vorzüglich ist die Beigabe von gut durchfeuchtetem Torfmull oder Komposterde. Man beachte, daß die Wurzelkrone nur wenig unter die Erdoberfläche zu stehen kommt. Nach erfolgter Pflanzung gieße man kräftig an.

Gießen.

Solange die Pflanzen nicht angewachsen sind, sei man mit dem Gießen recht vorsichtig, da es sehr oft vorkommt, daß die Stauden totgegossen werden, d. h. durch zu vieles gießen faulen die Pflanzen. Nur bei größerer Hitze ist öfteres gießen notwendig. Sind die Stauden einmal angewachsen, so bedarf es nur noch bei großer Trockenheit des gießens. Dann tue man es aber gründlich, damit das Wasser auch tief genug in die Erde eindringt. Wird nach erfolgtem Regen die Erde gelockert, so ist für lange Zeit das gießen erspart.

Spätere Düngung.

Für ein Belegen der Stauden mit kurzem Stall- oder Torsmist sind die Pflanzen sehr dankbar. Ein solcher Belag düngt auch noch den Boden und hält die Pflanzfläche unkrautsrei. Sind die Stauden angewahsen, so kann man sie mit verdünnter Jauche oder einem der bekannten künstlichen Dünger (nach Vorschrift in Wasser aufgelöst) gießen. Ab Juli sollte man keine Pflanzen mehr düngen.

Weitere Pflege.

Die Anlage ist unkrautfrei zu halten. Abgeblühte Blumen entferne man, da das Samentragen die Pflanzen schwächt. Im Herbst schneide man alles Abgestorbene ab. Ältere Pflanzen, die an Blühwilligkeit nachlassen, teile man (jedoch Papaver und Paeonien nicht) und dünge den ausgesogenen Boden.

Winterschutz.

Winterschutz verlangen nur einige wenige, empfindliche Arten die durch das Zeichen A kenntlich gemacht sind. Am besten gebe man ihnen eine Laubdecke. Der Staudenfreund wird die geringe Mühe nicht scheuen, denn gerade diese Stauden sind sehr dankbare Blüher. Im 1. Winter nach der Pflanzung decke man alle Stauden gut mit Tannenreis ab.

Beurteilung der Stauden.

Wer zum erstenmal Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahr. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahr in ihrer vollen Schönheit.

Wie schützen Sie sich beim Pflanzenkauf vor Enttäuschungen.

Wie bei anderen Waren, so in besonderem Maß bei Stauden, darf nicht das billigste Angebot als das günstigste betrachtet werden, sondern die Güte und das Vertrauen zu einer Firma muß den Ausschlag geben. Die Pflanzennamen in den Katalogen bieten Ihnen keinen Anhalt über die Stärke der Pflanzen. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine starke, blühbare Staude verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Ferner ist bei den billigen Angeboten nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten. Wir liefern gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwuchsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden, selbst unter ungünstigsten Bedingungen. — Unsere Preise sind äußerst kalkuliert, so daß Sie unbedingt die Gewähr dafür haben, für Ihr Geld auch den vollen Gegenwert zu bekommen.

Besuch unserer Kulturen

ist jederzeit lohnend und gerne gestattet. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schillerplatz) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt — Gr. Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Sortenauswahl.

Für jede Jahreszeit, für jeden Verwendungszweck und jede Lage gibt es eine Riesenauswahl feiner und geeigneter Sorten. Falls Sie sich in der zur Verfügung stehenden Auswahl nicht zurechtfinden, unterbreiten wir Ihnen gerne Vorschläge. Bepflanzungspläne können wir erst nach erfolgter Auftragserteilung ausarbeiten und zwar geschieht dies kostenlos. Auf Wunsch senden wir den Bepflanzungsplan vor Lieferung zur Genehmigung ein.

Um Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Sorten behilflich zu sein,

haben wir auch auf den folgenden Seiten für verschiedene Zwecke **Sortimente unserer Wahl** zusammengestellt, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sortenauswahl in unseren Sortimenten aus.



100 Rasenersatz-u. Plattenweg-Stauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 od. mehr Sorten mit Namen zu 24 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm Rasenersatz werden ca. 10-15 Stauden, für 1 qm Plattenweg ca. 5-10 Stauden benötigt.

Bei Bestellung bitte Verwendungszweck angeben.

Für Sonne: (bei jeder Sorte ist die Laubfarbe angegeben) Acaena (blaugrün, hellgrau, braungrün), Antennaria (silbergrau), Armeria (grasgrün), Cerastium tomentosum (silberweiß), Epilobium Hectori (braun), Helianthemum oelandicum (grün), Herniaria glabra (grasgrün), Matricaria caucasica (grün), Paronychia serpyllifolia (graugrün), Phlox subulata (hellgrün), Sedum (grün, braunrot), Thymus (graugrün), Trifolium atropurpureum (schwarzrot), Veronica repens (hellgrün).

Für Halbschaften: Ajuga (braunrot), Asperula nitida (dunkelgrün), Azorella trifurcata (grün), Cotula squalida (braun), Cotula scariosa (hellgrün), Hutchinsia alpina (dunkelgrün), Lysimachia nummularia (hellgrün), Mentha Requienii (grün), Sagina subulata (hellgrün), Sedum spurium (grün), Selaginella (grün), Veronica filiformis (hellgrün), Vinca minor (dunkelgrün).

100 feinste Felsenstauden für alpine Anlagen zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 30 Mark.



Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Für Sonne: Achillea (weiß, gelb), Alyssum (gelb), Androsace (rosa), Arabis (rosa, weiß), Asteralpinus (weiß, blau, rot), Aubrietien (blau, rot, lila), Campanula (blau, lila, violett, weiß), Coreopsis rosea nana (rosa), Dianthus (weiß, rosa, rot), Draba (gelb, weiß), Globularia (blau), Gypsophila (rosa, weiß), Helianthemum (rot, gelb, weiß, rosa), Leontopodium (weiß), Oenothera missouriensis (gelb), Pentastemon (blau, lila), Phlox subulata (rot, rosa, weiß, lila), Saxifraga, rosettenbildende (weiß), Silene (weiß, rot), Sisyrinchium (blau), Veronica (blau, weiß, rosa).

Für Halbschaften: Ajuga (blau), Alchemilla alpina (gelb), Asperula (weiß, rosa), Azorella trifurcata (weiß), Campanula pusilla (blau, weiß), Ceratostigma plumbaginoides (blau), Corydalis (gelb, weiß), Dicentra eximia (rot), Epimedium (gelb, weiß, rot), Hepatica (blau, weiß, rosa), Horminum pyrenaicum (blau), Hutchinsia (weiß), Hypericum (gelb), Iberis (weiß), Linaria (blau), Megasea (rosa), Omphalodes (blau, weiß), Primula (gelb, weiß, rot, blau), Satureia alpina (blau), Saxifraga moosartige (weiß, rosa, rot), Sedum (rosa, gelb, rot), Selaginella (rasenbildend), Tiarella cordifolia (weiß), Viola (blau, gelb, weiß).



100 feinste Trockenmauerstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu **28** Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 gm Mauersläche werden ca. 6-8 Stauden benötigt.

Überhängend (auf den Kopf der Mauer): Alyssum (gelb), Arabis (rosa, weiß), Aubrietia (blau, rot, lila), Cerastium (weiß), Dianthus (rosa, rot, weiß), Eriophyllum caespitosum (gelb), Gypsophila (rosa, weiß), Helianthemum (rosa, rot, gelb), Iberis (weiß), Oenothera missouriensis (gelb), Phlox subulata (rot, rosa, weiß), Saponaria (rosa), Sedum (gelb, weiß, rosa), Veronica (blau).

Für Fugenbepflanzung: Achillea (weiß, gelb), Androsace (weiß, rosa), Antennaria (weiß, rosa), Armeria (rosa, rot, weiß), Campanula (blau, lila, violett, weiß), Draba (gelb, weiß), Erinus (rot, weiß), Globularia (blau), Hieracium (rot, gelb), Horminum (blau, weiß), Paronychia (weiß), Saxifraga, rosettenbildende (weiß), Sedum (rot, rosa, gelb, weiß), Sempervivum (rosa, rot), Silene (weiß, rot), Thymus (weiß, rosa, rot), Tunica (weiß, rosa), Veronica (blau).

100 feinste alpine Zwerg-Gehölze zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu **90** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Flachwachsende: Cotoneaster adpressa, C. Dammeri (humifusa), C. horizontalis, C. microphylla var. thymifolia, C. praecox Nan Shan, Cytisus decumbens, C. Ardoinii, Dryas octopetala, D. Sündermannii, Evonymus radicans minima, E. radicans Carrierii, E. japonica acuta, Genista sagittalis, G. pilosa, G. tinctoria plena, Hedera conglomerata, Juniperus prostrata (repens) Mühlenbeckia axillaris, Polygala chamaebuxus, Potentilla Farreri prostrata.

Aufrechtwachsende: Berberis actinacantha, B. stenophylla, B. Thunbergi atropurpurea, B. verruculosa, B. Wilsonae, B. Veitchi, Chaenomeles Sargentii, Cytisus alba dura, C. praecox, C. purpureus incarnatus, Ephedra Gerardiana, E. sikkimensis, Hypericum Moserianum, Hypericum patulum var. Henryi, H. lysimachioides, Lonicera Alberti, L. yunnanensis, L. nitida, L. pileata, Potentilla (in Sort.), Pyracantha coccinea (Lalandii), Spiraea bum. crispa.



100 schönblühende und dekorative Schattenstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu **30** Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 5-8 Stauden benötigt.

Für Halbschatten:

Niedere: Ajuga (blau), Azorella trifurcata (weiß), Campanula (blau, weiß), Cyclamen (rosa), Dicentra (rosa), Houstonia (blau), Iberis (weiß), Mertensia (blau), Megasea (rosa), Omphalodes (blau, weiß), Primula (bunt), Soldanella (violett), Saxifraga moosartige (rosa, rot, weiß), Tiarella cordifolia (weiß).

Halbhohe: Aconitum (blau, gelb), Aquilegia (blau, weiß, gelb), Anemone jap. (weiß, rosa, rot), Aruncus silvester (weiß), Astrantia (rosa), Astilben (weiß, rosa, rot), Campanula (blau, weiß), Dicentra spectabilis (rosa), Digitalis (gelb, rosa, rot), Geranium (blau, rosa), Helleborus (rosa, weiß), Hosta (blau weiß), Trollius (gelb, orange).

Für Schaffen:

Anemone nemorosa (weiß), Asarum europaeum (weiß), Arum italicum, Asperula odorata (weiß), Convallaria majalis (weiß), Corydalis (weiß, gelb), Epimedium (weiß, gelb, rot), Hepatica (blau, weiß, rosa), Hypericum (gelb), Lamium (gelb, rosa), Oxalis acetosella (weiß), Pachysandra (weiß), Pulmonaria (rot, blau), Symphytum grandiflorum (weiß), Vinca (blau, weiß, rot), Waldsteinia (gelb).





100 feinste Schnittstauden zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 32 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 5-6 Stauden benötigt

Niedere: Arabis (weiß), Anemone (weiß, rosa, rot), Aster, Frühlings- (blau, weiß, rot), Caltha (gelb), Dianthus (weiß, rosa, rot), Heuchera (rosa, rot), Iberis (weiß), Helleborus (weiß, rosa), Lychnis (rot), Polemonium (blau), Primula (bunt), Viola cornuta (weiß, gelb, blau), Viola odorata (blau).

Halbhohe: Aquilegia (bunt), Asfer amellus (blau, rosa, violett), Anemone jap. (bunt), Centaurea (bunt), Chrysanthemum ind. (bunt), Chrysanthemum leucanthemum und Chr. maximum (weiß), Coreopsis (gelb), Campanula (blau, weiß), Doronicum (gelb), Erigeron (blau, lila), Eryngium (blau), Gaillardia (bunt), Gypsophila (weiß), Helenium (gelb. braun), Heliopsis (gelb), Iris germanica (bunt), Kniphofia (rot, orange, gelb), Liatris (purpur), Phlox paniculata (bunt), Pyrethrum (bunt), Scabiosa (blau, weiß), Trollius (gelb, orange).

Hohe: Achillea fil. Parkers var. (gelb), Aconitum (blau), Aster, Herbst- (bunt), Aruncus silvester (weiß), Chrysanthemum uliginosum (weiß), Delphinium (blau, weiß), Echinops (blau, weiß), Helianthus (gelb), Heliopsis (gelb), Helenium (gelb, braun, braunrot), Rudbeckia (gelb), Solidago (gelb), Thalictrum (blau, gelb).



100 feinste Rabatten-Stauden für sonnige Lage, zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 34 Sorten mit Namen zu 32 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 4-6 Stauden benötigt.

Niedere: Alyssum (gelb), Achillea (gelb), Aster, Frühlings-(blau, weiß), Dianthus (weiß, rosa, rot), Geum (rot, orange, gelb), Heuchera (weiß, rosa, rot), Iris pumila (bunt), Veronica (blau, rosa), Viola corn. (blau, weiß gelb). Halbhohe: Aster amellus (blau, violett, rot), Campanula (blau, weiß), Chrysanthemum ind. (bunt), Chrysanthemum leucanthemum und Chr. maximum (weiß), Coreopsis (gelb), Dicentra spectabilis (rosa), Doronicum (gelb), Euphorbia epithymoides (gelb), Helenium (gelb, braun, rotbraun), Hemerocallis (gelb, orange), Iris germanica (bunt), Iris interregna (bunt), Lychnis (rot), Oenothera (gelb), Papaver orient. (rot, rosa), Phlox paniculata (bunt), Platycodon (blau, weiß), Rudbeckia speciosa (gelb), Sedum fabaria (rot, rosa), Solidago (gelb).

Hohe: Aconitum (blau, weiß), Anchusa (blau), Althaea, Malven (rosa, rot, gelb, weiß), Astern, Herbst-(bunt), Chrysanthemum uliginosum (weiß), Delphinium (weiß, hellblau, dunkelblau), Echinops (weiß, blau), Heliopsis (gelb), Helenium (gelb, braun, rot), Monarda (rosa, rot, violett), Rudbeckia (gelb), Solidago (gelb), Thalictrum (blau, gelb), Verbascum (kupfer, gelb).



100 Einfass - Stauden zu sammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in Sorten mit Namen zu **24** Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für das laufende Meter Einfassung werden 5 Stauden benötigt.

Bei Bestellung bitte angeben, ob wenig Sorten gewünscht werden, oder ob die Einfassung recht bunt werden soll.

Niedere Sorten für schmale Einfassung: Arabis (weiß, rosa), Achillea (gelb), Ajuga (blau), Alyssum saxatile (gelb), Armeria (weiß, rot, rosa), Aster alpinus (blau, weiß, rot), Aubrietia (blau, rot, lila), Brunella (blau, rosa), Campanula (blau, weiß), Cerastium (weiß), Dianthus (rosa, rot, weiß), Iberis (weiß), Iris pumila (bunt), Phlox subulata (weiß, rosa, rot, blau), Primula (gelb, weiß, rot), Saxifraga (rosa, rot, weiß), Sedum (gelb, weiß, rot, rosa), Teucrium chamaedrys (Buxersatz), Vinca minor (blau), Viola cornuta (blau, weiß, gelb), Viola odorata (blau).

Höhere Sorten für breitere Einfassungen: Aster subcoeruleus (blau), Dianthus plum. (weiß, rosa. rot), Geum (gelb, orange, rot), Heuchera (rosa, rot). Hosta (weiß, blau), Iris interregna (bunt), Iris germanica (bunt), Megasea (rosa), Nepeta (blau), Santoline (grün- und graublättrig), Sedum fabaria (rosa, rot), Stachys lanata (graufilzig), Veronica (blau, rosa), Waldsteinia (gelb).

Winterhart ausdauernde Blütenstauden das idealste Pflanzenmaterial

zur farbenfrohen Ausgestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen Anlagen.

Einmalige Anschaffung! Jahrzehntelanges Blühen! Geringster Aufwand für Pflege!

Bewährten Neuzüchtungen und Neueinführungen des In- und Auslandes widmen wir immer unsere besondere Aufmerksamkeit und scheuen vor keinen Kosten und Mühen zurück, diese auch unserer Kundschaft zugänglich zu machen. Wir halten so unser Sortiment immer auf der Höhe und können ohne Ueberhebung behaupten, eine der größten existierenden Sammlungen zu besitzen.

Wir machen besonders aufmerksam auf die am Kopf der Seiten sich wiederholenden Zeichenerklärungen.

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Neuheiten und Seltenheiten

Stauden - Kakteen - Ziergräser - Ericaceen - Gehölze

0.70

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1 St. 1	Artilbo korzoonsis Dika minuis ("1 (St
$\mathcal{R}_{\mathcal{M}}$	Astilbe koraeensis. Dichte, reinweiße, etwas überge- bogene Blütenrispen. Seltene Art aus Korea.
Aster amellus Moerheim Gem. Eine Verbesserung der guten, alten Sorte "Rudolf Goethe" mit tiefdunkel-	40 cm VII-VIII 0.80
violetten Blumen. 40-50 cm VIII-X 2	— Taquettii superba. Schöne Spielart von A. Taquetti mit stärker verzweigten u. breiteren, kräftigpurpur-
— Regina. Wuchs und Blumengröße ähnelt der Sorte Imperator. Die großen, edlen Blumen sind jedoch	lila Blütenrispen ähnlich "Gloria" u. "Hyacinth".
von schöner reinrosa Farbe. 60 cm VIII-IX 1.—	80 cm VIII-IX 0.70
- Schönste von Eisenach. Sehr große, edle, dunkel-	Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae ○ △ : □ □ □
rosa Blüten, welche in breiten Sträußen stehen. 50-60 cm VIII-IX 1.20	— deltoidea Vesuv. Schöne, kräftig wachsende Polster, die im Frühjahr unter einer Fülle karminroter Blu-
- Silberstern. Die erste reinweiß blühende Aster	men verschwinden. 10–15 cm IV-V 0.70
amellus. In dichten Sträußen sehr reichblühend. Kompakter Wuchs. 50–60 cm VIII-IX 1.50	Prinzessin Wunderhold. Sehr schöne, silbrig-
— dumosus Hybriden ○ △ □ # Eine neue Herbstastern-	weißbunte Belaubung und leuchtend dunkellila Blüten. 10–15 cm IV-V 0.80
art, die nur 20-30 cm hohe kugelige Büsche bildet.	— — Godstone. Großblumig, tiefviolettkarmin.
Infolge ihrer guten Eigenschaften ist sie sowohl	10-15 cm IV-V 1
zur Bepflanzung von Steingärten, als auch von Staudenrabatten sehr gut geeignet. Bei der Aus-	— Magnificent. Frischgrüne Belaub. u. große, tiefrote Blumen mit braunem Auge. 10-15 cm. IV-V 0.80
schmückung der englischen Kriegergräber in Nord-	- Russel Vincent. Große, reintiefrote Blumen.
frankreich spielen sie eine große Rolle. VIII-X — — Countess of Dudley. Reinrosa 0.50	10-15 cm IV-V 1.—
— — Diana. Große halbgefüllte, blaßrosa Blumen. 1.—	Campanula, Glockenblume, Campanulaceae ○- • △ : □
— — — Dwarf Ronald. Leuchtend rosa 0.50	— carpathica Chewton Joy. Großblumig, hellblau. 20—25 cm VII-VIII 0.80
— — Dwarf Nancy. Hellilarosa 0.60 — — Dwarf Victor. Reinhellavendelblau 0.50	— Elegant. Zartblau. 10–15 cm VII-VIII 0.80
Lady Henry Meddocks. Reinzartrosa 0.50	— — Liliput. Eine Zwergform von C. carp. turbinata
— — Lilac Time. Großblumig, zartlila 0.80	mit dunkelblauen Blüten. 5–10 cm . VI-VII 1.20 — maxima. Sehr große, lichtblaue Schalenblüten.
— — Marjory. Lebhaftrosa	20-25 cm VI-VII 0.60
Peter Pan. Leuchtend rosa 0.80	— Moonlight, Zartsilbriglila, 20–25 cm VII-VIII 0.80
— — Snowsprite. Reinweiß 0.70 1 — linariifolius ○ □ X Kleine, dichtgestellte lineal-lanzett-	— Queen of Somerville Die flachen, offenen Blüten- schalen sind von zartporzellanblauer Farbe.
liche Blätter und lilaweiße Blittenbüschel. Seltene	20-25 cm VII-VIII 0.80
nordamerikanische Art. 30–40 cm . IX-X 1.—	— Riverslea Giant. Zartsilbrigblau. 20-25 cm VII-VIII 0.80
— novi belgii Amethyst, Herbstaster ○□ X Fast voll-	— garganica Mrs. H. H. Payne. Dunkellila Blumen mit
kommen gefülltblühend, tiefpurpurblau. 80–100 cm	auffallender, weißer Mitte. Sehr dankbarer Blüher.
Blue Eyes. Große, leuchtend blaue Blumen mit	5-10 cm VII-VIII 0.70 - hybr. Abundance. Hybride mit hellilafarbenen, halb-
kleiner, gelber Mitte. 100–120 cm . IX-X 0.60	aufrechten mittelgroßen Blütenglocken. Der reiche
— — Col. F. R. Durham. Gut gefüllte, violettblaue Blumen, außerordentlich reichblühend.	Flor und die späte Blütezeit machen die Sorte be- sonders wertvoll. 20–25 cm VII-VIII 0.80
100-120 cm IX-X 0.80	Hendersonii ○ □ X Hybride zwischen C. carpa-
Little Pink Lady. Leuchtend rosa. Sehr reich- blühend. 40-50 cm	thica u. C. pyramidalis. Die pyramidal verzweigten
Mount Everest. Hohe, edelgeformte Pyra-	Büsche sind überschüttet mit leuchtend lilafarbenen Blütenglocken. 40–50 cm VI-VII 1.20
miden, besetzt mit großen, weißen Blüten.	R. B. Loder. Reizende, kriechende Staude mit
120–150 cm IX-X 0.00 – Pink Nymph. Große, lebhaftrosa Blumen.	halbgefüllten lila Blumen. 5-10 cm. VI-VII 1.20
120-150 cm IX-X 0.80	— Poscharskyana. Sehr schöne, an C. Mayi erinnernde Art mit großen sternförmigen lila Blüten in großer
Red Rover. Die erste Varietät dieser Astern- klasse, die man als wirklich rot bezeichnen kann.	Masse. 20-25 cm VII-VIII 0.60
80-100 cm IX-X 0.70	— pulla alba. Unterscheidet sich von der Stammform durch ihre blendend weißen Blütenglocken. Ver-
- Robinsonii. Ähnlich Aster Frikarti, jedoch robuster	langt kalkfreien Boden. 10–15 cm VI-VII 1.20
und daher windfester. Große, prachtvoll himmel- blaue Blumen. 60-70 cm VIII-X 1.50	- rhomboidalis alba. Reinweiße Art dieser schönen,
Astilbe, Prachtspiere, Saxifragaceae ○ ① □ ≃	reichblühenden Alpenglockenblume. 20—30 cm VI-VII 1.—
— hybr. crispa elata () △ Im Wuchs gleicht die Sorte	— persicifolia Ackermannii ○ □ X Schöne weißgefüllte
den A. crispa, jedoch sind die rosafarbigen Blüten-	Campanula. Sie ist viel großblumiger, dabei aber
rispen schlanker und höher wie bei den übrigen. 15-25 cm VII-VIII 1.—	cleganter als die bekannte Sorte Moerheimii. 60-80 cm VI-VIII 1.—
- simplicifolia hybr. atrorosea. Außerordentlich reich-	Centaurea, Kornblume, Compositae ○ □ X
blühende Varietät von intensiv rosaroter Farbe, die	— dealbata Steenbergii. Fiederlappige, unterseits weiß-
es bis jetzt noch nicht gab. 30-40 cm. VIII-X 0.70 praecox. Eine frühblühende Varietät, die sich	behaarte Belaubung. Große, purpurrote Blumen mit
auch für die Treiberei eignet. Die Farbe der Blüten-	weißer Mitte. 40-50 cm VII-VIII 1.—
rispen ist ein schönes Rosa. 30-40 cm. VIII-X 0.80	Chrysaboltonia pulcherrima O - X Herrlicher, 70 cm
- Arendsii Fanal. Die 60-70 cm hohen, schlanken, fedrigen	hoher Bastard von Boltonia latisquama u. Chrysan- themum Zawadskii. Streng aufrechtwachsende,
dichten Rispen sind glühend dunkelgranatrot. In ihrer leuchtenden, dunklen Farbe übertrifft die Sorte	windfeste, viele Wochen blühende Herbststaude
alle im Handel befindlichen Astilben. Sie ist sehr	mit großen, rosaroten Margaretenblumen. Schnitt-
reichblühend u. eignet sich gut zur späten Treiberei 0.80	und Schmuckstaude ersten Ranges VIII-X 0.70

Stauden-Neuheiten Fortsetzung	1St.
Chrysanthemum, Compositae ○□ ¼	Rispen mit warmhellblauen Blumen 2.
- koreanum hybr., Korea Margerite. Eine neue Rasse	— Nachthorn. Eine frühblühende, großblumige Sorte
prachtvoller einfach- u. gefülltblühender Gartenchry- santhemen, die in keinem Garten fehlen sollten u. die	mit tiefdunkelblauen, rotgetuschten Blumen 3.—
bestimmt überall bald beliebt werden. Sie sind	- Purpurritter, halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes, weißes Auge 1.50
außerordentlich reichblühend und eignen sich auch	— Rosenenzian, hellenzian mit rosa, gefüllt 2.—
zur Topfkultur vorzüglich. 40-50 cm X-XI - Aphrodite. Zartrosa 2.50	- Tropennacht. Eine wunderbare, harmonische Ver-
— — Apollo. Warmbraunrot mit lachsrot überlegt,	bindung der Farben Nachtblau, Enzianblau und Rot mit großem, weißen Auge
Mitte altgoldfarbig 2.50	— Uberwinder, hellrosa, in hellblau übergehende, weiß
— Hebe. Leuchtend rosa, in zartlavendelrosa übergehend 2.50	geaugte Blumen an kräft., groß. Rispen m. reichem Nebenrispenflor. Enorm wüchsig und fester Bau . 2.—
— — Innocence. Blendendweiß, später zartrosa . 2.50	Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○ △ : :
— — Mercury. Tief bronzerot mit kupferfarben 2.50 — — Saturn. Orangebronzefarben. Die kleine Mitte	— caesius lilacinus. Auf graublauer Belaubung erscheinen
ziert ein zartorangefarbener Ring 2.50	die großen, lilarosa Blüten, die den Flor der Stamm-
— — Venus. Tiefrosalila. 3 - 4 Reihen Blumenblätter 2.50	sorte D. caesius verlängern. 15-20 cm. VI-VII 0.80 — robusta splendens. Eine besonders starkwüchsige
— maximum fl. pl. Esther Read. Marguerite Die dichtgefüllten, schneeweißen Blumen ähneln	und großblumige Form von D. caesius. Die Blüten
cinem Riesen-Pyrethrum. Durchaus straffstielig	sind leuchtend purpurrosa. 15-20 cm V-VI 0.80
und windfest. 40-50 cm VI-IX 1.50	Brigeron, Berufskraut, Compositae O = X
— Non plus ultra. Die riesigen, schneeweißen Blüten haben einen doppelten, massigen, gespreizt ange-	— hybr. Hundsstern. Die späteste, dunkelste und niedrigste Erigeronsorte. Außerordentlich reich-
ordneten Blütenblätterkranz. 60-70 cm VI-VII 0.70	- blühend. 30 cm VI-VII 1.—
Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ○ - ① 🗓 □	— Merstham Glory. Die hübsch., halbgefüllt. Blumen sind v. hellavendelbl. Farbe. 50-60 cm. VI-VII 0.80
reiner weiß als die der Sorte acerina, auch er-	- Mrs.E.M.Beale. Auf 40 cm hohen, reichverzweigten
scheinen sie ca. 14 Tage später. Der Wuchs der	Stielen stehen die feinstrahligen, 5 cm im Durch-
Pflanze ist gedrungener. 70-80 cm VIII-IX 0.80	messer großen, lilafarbigen Blüten . VI-VII 0.80 — Sommerneuschnee. Im Wuchs der E. Quakereß
— simplex Armleuchter. Die hohen kräftigen reichverzweigten Blütenstiele erscheinen in fast doppelt so	ähnlich. Blumen im Aufblühen reinweiß, später
großer Zahl als bei der Stammform. Die Blütenrispen	zartrosa überhaucht. 50–60 cm VII-VIII 0.60
sind v. schneeweißer Farbe. 120-150 cm. VIII-IX 1.— Commelina, Tagblume, Commelinaceae ○ △ △	mucronatus Moerheimii. Eine unermüdlich blühende Staude mit kleinen Blättchen und tiefrosa Blüten
— dianthifolia. Herrliche Alpine aus den Gebirgen Ari-	in großen Sträußen. 30-40 cm VII-IX 0.80
zonas, die man für eine niedrig bleibende Form der	— speciosus roseus. Die reinrosafarbenen Blüten er- scheinen in großer Fülle. Der straffe Wuchs und
Dreimasterblume, Tradescantia virginica, halten könnte. Ihre azurblauen Blumen erscheinen in reicher	die große Haltbarkeit der Blumen machen sie zur
Fülle den ganz. Sommer über. 20-30 cm. VI-X	Schnittblume erst. Ranges. 40—50 cm. VI-VII 0.70 — Ronsdorf. Die im Durchmesser 5 cm großen, edlen
Coreopsis, Mädchenauge, Compositae ○ □ — verticillata grandiflora. Bedeutende Verbesserung der	halbgefüllten Blumen sind von dunkellila Farbe.
Stammart mit viel größeren, dunkelgelben Blüten	50 cm VI-VII 0.60 — Wuppertal, Halbgefüllte Blumen von schöner,
in großer Fülle. 50–70 cm VII-IX 0.80	lila Farbe. 60 cm VI-VII 0.70
Crucianella, Riesenwaldmeister, Rubiaceae ○─① — stylosa rubra. Auf frischgrüner grob waldmeister-	Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ∞ □ X
artiger Belaubung sitzen statt der frischrosa Blüten-	- yuccaefolium. Auffallende Staude mit grauschimmern-
dolden, purpurrote. 15—20 cm V-VII 0.80	der yuccaähnlicher Belaubung. Die runden, weißen Blütenköpfe sitzen auf kräftigen Stengeln.
Delphinium cultorum, Rittersp., Ranunculaceae ○□¾ ⊥ Sämtliche hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich	60-80 cm VII-IX 1.—
durch riesengr. Blumen an besond. lang. Rispen aus.	Frankenia, Seeheide, Frankeniaceae ○ △ △
Sie sind völlig windfest und meltaufrei. 150-180 cm VI-VIII	— laevis. Fast halbstrauchige, lockerrasige Staude mit linealen Blättchen und hellrosa Blüten. VI-VIII 0.80
- Berghimmel. Die reinhellblauen Blumen sind von	— thymifolia. Thymianähnliche Belaubung und leuchtend
guter Fernwirkung	rosa Blüten VI-VIII 0.80
- Enzianturm, leuchtend tiefenzianblau, turmartige	Gaillardia, Kokardenblume, Compositae ○ □ X — aristata The Prince. Die außerordentlich großen Blu-
Rispen in großer Zahl	men sind goldgelb mit einem breiten, karminroten
farbe, gefüllt	Rande in der Mitte. Straffstielig und windfest.
- Fön. Diese prächtige Sorte hat sehr große Blüten-	Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae ○—①□△
rispen. Die Blumen sind nachtblau, warmrot gegetönt und schwarz geaugt	- grandiflorum fl. pl. Belaubung tief-fünflappig und
— Gletscherwasser, leuchtend helleisblau, schön ge-	stark behaart. Blumen tiefviolettblau und stark gefüllt. 20-30 cm V-VII 0.80
baute Büsche	gefüllt. 20—30 cm V-VII 0.80 — hybr. Russel Prichard. Gut belaubter, im Herbst pracht-
— Größenwahn, Riesenrispen hellblauer Blumen . 3.— — Havelland, halbgefüllt, kornblumenblau, Füllung	voll sich färbender Steingartendauer blüher mit leuch-
perlmutterrosa	tend karminroten Blumen. 20—30 cm. VI-IX 0.80
- Kirchenfenster, tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ △ — hybr. Gladys Perry. Prächtige Zwergform mit großen.
Leuchtturm, lockere Rispen mit einsachen, hell-	warmorangeroten Blüten. Sehr reichblühend.
blauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte 2.	15 cm V-VI 1.20

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1St.	Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ □ X	S
Gypsophila, Schleierkraut, Caryophyllaceae ○□ ¼ ⊥	— pumila hybr. Darmstadt 🛆 : Außerordentl. reichblüh.	Ris
paniculata praecox rosea. Einf., leudit. rosa Blüten.	u. weithin leuchtend, Dom lila, Hängeblätter samtig-	
Lieferbar Herbst 1937. 40-50 cm VI-VIII 2.—	violett mit hellerer Berand. 20-30 cm. IV-V 0.6	6
— — rosea plena. Ein frühblühendes stark gefülltes	— chrysographes Margot Holmes. Grasartige Belau-	
Schleierkraut v. rosa Farbe. Lieferbar Herbst 1937.	bung, verzweigte Stengel, Blumen samtigpurpur- violett mit goldener Zeichnung. Ein selten schönes	
40-50 cm VI-VIII 3.— hybr. fl. pl. Rosenschleier ○ △ X Eine wertvolle	Farbenspiel. 40-50 cm VI-VIII 1.	
Neuheit mit großen, lockeren Rispen schön gefüllter	- japonica Ledgers var. Acorus-ähnliche Belaubung und	
rosafarbiger Blüten. Der Wuchs ist kräftig und	kleine, flache, weiße, hellblau schattierte Blumen	
gesund. 20-30 cm VI-VIII 0.70	mit orangefarbig. Flecken. 40-50 cm. VI-VII 1.	
Helenium, Sonnenbraut, Compositae ○□ ×	— germanica Député Nomblot. Dom kupferfarbig	
- auf. praec. Hessei. Straff aufrechtwachsend u. wind-	bronze mit lila Schein, Hängeblätter weinfarbig karmoisin mit brauner Aderung. Sehr großblumig.	
fest. Große reingelbe Blumen in großen Massen.	80-100 cm V-VI 3	
100-120 cm VII-IX 0.80 — Bigelovii superbum. Die großen edlen Blumen zeigen	— Grace Sturtevant. Dom braunpurpur. Hängeblätter	
einen warmen Goldton mit schwarzer Mitte. Der	glänzend schwarz-karmoisin. Sehr große Blumen auf	
straffe, windfeste Wuchs macht die Sorte besonders	starken Stielen. 80–100 cm V-VI 2.	
wertvoll. 40-50 cm VII-VIII 0.70	— Nadia. Dom hellrosa-amarant, Hängeblätter röt- lich-granatfarbig. 80–100 cm V-VI 1.	
hybr. Braungold. Die mittelgroßen Blumen haben einen	— Sirius. Domblätter ageratumblau, Hängeblätter	
schwarzbraunen Knopf und leuchtendbraune Innen- zone, die in einen goldgelben Rand ausläuft.	leuchtend blau. 80-100 cm V-VI 1.5	5
100-120 cm VIII-IX 1.—	- White Knight. Schr großblumig, alabasterweiß.	0
Chipperfield Orange. Sehr großblumig, orange-	Ungeheuer reichblühend. 40-50 cm. V-VI 0.8	81
farben, Unterseite der Blumenblätter rot, Mitte	Kirengeshoma, Wachsglocke, Saxifragaceae ○-① X □	
rötlichbraun. 120–150 cm VIII-IX 0.70	- palmata. Seltene japanische Staude mit graugrünen	
— Moerheim Beauty. Blumen von leuchtend roter Farbe auf straffen Stielen. Verbesserung der Sorte	Stengeln und handförmig geteiltem Laub. Am Ende	
Crimson Beauty, 60-80 cm VIII-IX 0.70	besetzt mit zahlreichen goldgelben wachsartigen	0
- Peregrina. Die großen Einzelblüten sind dunkel-	Blumen. 60-70 cm VIII-IX 1.5	21
kastanienbraun mit schmalem, gelblichem Rand.	Kniphofia, Japan. Fackellilie, Liliaceae ○ □ ¾ ⊥ ∧	
Das dunkelste bis heute erreichte Heleniumbraun.	— gracilis Goldelse. Grasartige Belaubung und graziöse	
120-150 cm VIII-IX 0.80	zitronengelbe Blütenkolben, die sich sehr gut für feine Binderei eignen. 40–50 cm VII-IX O	70
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae O O A:	- hybr. Luna. Große, primelgelbe, volle, schöne Blüten-	4
— hybr. Ben More. Graugrüne Belaubung und einfache, dunkelorangerote Blüten. 10—20 cm. V-VII 0.80	ähre. 50–70 cm VII-IX 1.	_
— Ben Nevis. Großbl, strohgelb. 20 cm. V-VII 0.80	Lavandula, Lavendel, Labiatae ○ ∞ □ : :	
— Ben Venue. Mit groß., einfach. rötlichorangefarb.	— vera alba. Silbergraue Belaubung und weiße Blüten.	
Blumen, mit dunkl. Mitte. 10-20 cm. V-VII 0.80	Selten. 30-40 cm VII-IX 1.5	2
- Blutströpfchen. Außerordentlich wüchsig und	Linum, Lein, Linaceae ○ □ □	
reichblühend, große, blutrote einfache Blumen. 20–25 cm V-VII 0.50	- narbonnense Six Hills var. Grob nadelförmige frisch-	
— Goldlachs. Graugrün belaubte, wüchsige Sorte mit	grüne Belaubung und große leuchtend himmelblaue	
großen, einfachen, lachsorangeroten Blüten, zu	Blumen auf festen Stielen. Sehr reichblühend.	5
denen die goldgelben Staubfäden herrlich kon-	40-50 cm V-VIII 1.	,)
trastieren. 10-20 cm V-VII 0.80	Lupinus, Lupine, Leguminosae ○ — (□ V-VII — polyphyllus hybr. Ada. Maisgelb, goldgelb schattiert.	
— Watergate Orange. Silbergraue Belaubung und orangegelbe, einfache Blumen, die eine rotbraune	Niedrig. 40-50 cm	2
Mitte ziert. 20-30 cm V-VII 0.60	Black Knight. Indigoblau, fast schwarz 1.	
Helleborus, Christrose, Ranunculaceae ○-① X □	Chocolade Soldier. Ganz auffallende Er-	
- hybr. praecox. Schöne, besonders große reinweiße	scheinung. Die oben gelben, unten violettbraunen	=
Blüten in großer Fülle schon von Oktober ab bis	Blüten steh. in langen Risp. 60-80 cm 1. — — Countess of March. Die unt. Rispe ist zartlila-	0
in den Winter hinein. 20-30 cm 1.20	blau, die ob. weiß. Sehr fein. 60-80 cm 2.	.5
Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ □ X	Downers Delight. Dunkelrosa, sehr große Risp. 1.	
hybr. Margaret Perry. Leuchtend scharlachorange mit	— — Downers Pink Pearls. Tief ladisrosa 1.9	
auffallend gelbem Mittelnerv in jedem Blumenblatt.	— — Elisabeth Arden. Praditvoll orangefarbig. 1.	
40-50 cm V-VII 1.20 - Viscountess Byng. Die großen, hellgelben Blumen	— — — Flamingo. Rötlkastanienbraun. Flügel karmin 1. — — Goldcrest. Goldorange, sehr aparte Farbe 1.	
sind tiefbraun geadert. 40-50 cm . V-VII 1.50	Goodwood. Prächtigrosa, hellbraun schattiert 1.	
Hypericum, Hartheu, Guttiferae ○-① △	— — Magnificense. Violettpurpur mit weißer	
polyphyllum grandiflorum. Blauschimmernde, nadel-	Schattierung. 60–80 cm	.5
förmige Belaubung und außerordentlich große	— — Nelly. Zweifarbig, elfenbeinweiß, ins bläuliche	
gelbe Blumen mit auffallend großen Staubfäden und	schimmernd. 60–80 cm	
kupferfarbigen Knospen. 10-15 cm. V-VII 0.70	Verblüh. in blaßlila u. braunviolett über. Sehr apart O.	.8
Hypsella longiflora O A & Kriechendes Pflänzchen mit	— — Ruby King. Reinpurpurne Farbe 0.	
kleinen Blättchen und weißen, trompetenartigen,	Lysimachia, Felberich, Primulaceae $\bigcirc - \bigcirc \triangle \cong$	
karminrot gestreiften Blumen. 5 cm., VII-VIII 0.80	- phyllocephala. Hodinteressante Pflanze mit großen,	
Incarvillea, Freiland-Gloxinie, Bignoniaceae	tiefgelben, achselständigen Blumen. Die blätterlosen	
— hybr. Bees Pink. Große, zartrosa trompetenförmige	Stengel enden in einem Blätter- und Blumenkranz.	0

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1St.	Pentastemon hybr. Andenken an Purpus. Aus einer 1 St.
Macleaya, Federmohn, Papaveraceae $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bot$	Anzahl Sämlingen v. P. Andenken an Hahn, die im
— cordata Kelway's Coral Plume. Über den großen, blau-	freien Lande Kältegrade bis zu 10° ohne Deckung
grünen, gelappten Blättern stehen hohe, rosig ge-	überstanden, wählten wir diese Sorte aus. Höhe,
färbte Blütenrisp., die sich herrlich von dem tropen-	Wuchs u. Blühwilligkeit wie die Stammsorte, jedoch
haft üppig. Laub abheben. 150-200 cm. VIII-IX 1.—	mit lachsrosaroten Blüten. 30-40 cm VII-X 0.80
Mimulus, Gauklerblume, Scrophulariaceae $\bigcirc \triangle \cong$	Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae (
- hybr. Netzfalter. Die großen Blumen sind goldgelb,	— adsurgens △ Tiefgrüne, ovalrunde Belaubung und
benetzt m. braunen Punkten. 15–20 cm. VI-IX 0.70	leuchtend rosa Blüten, deren einzelne Blumen-
- Postillon. Großblumig gelb mit großen braunen und	blätter mit einem roten Strich gezeichnet sind.
roten unregelmäßig. Tupfen. 15-20 cm. VI-IX 0.70	15-20 cm V-VII 2.—
- Schmetterling. Die außerordentlich großen Gauk-	— hybrida Cecil Davis △ ⊕ Eine starkwüchsige Sorte
lerblumen zeigen ein solch großartiges Farbenspiel	mit rundlichen Blättchen an langen Ranken.
von rot, gelb und braun, wie man es nur bei Orchi-	Die rosalila Blüten stehen in lockeren Sträußen.
deen findet. Von der Ferne gleichen die Blumen	15-20 cm VI-VIII 0.80
Schmetterlingen. 15—20 cm VI-IX 0.70	— subulata Rotkäppchen △ a Ein Gegenstück zu der
Monarda, Etagenblume, Labiatae O	Sorte Schneewittchen, mit kleinen, roten Sternblütchen in großer Fülle. 5–10 cm V-VII 0.80
- hybr. Mrs. Perry. Eine Verbesserung der leuchtend	
roten Sorte Cambridge Scarlet, mit mehr orange in	— paniculata. □ ¼ VII-IX
der Farbe und bedeutend reichblühender und härter. 120–150 cm VII-VIII 0.70	— Biedermeier. Riesenbl., weiß m. dunkl. Auge. 60 cm 0.80
	— Daily Sketch. Sehr große, lachsrosa Blumen mit karmesinrotem Auge. 80–100 cm 0.80
Myosotis, Vergifsmeinnicht, Borraginaceae O-① X =	- Erntefeuer. Große Dolden leuchtend lachsorange-
palustris Thüringen. In allen Teilen fast doppelt so groß als alle anderen Varietäten. Leuchtend rein-	roter Blumen. 80 cm
blaue Blumen. 25-30 cm V-IX 0.70	— Feuerreiter. Große, erdbeerrote Blütendold. 80 cm 0.80
Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ □ : \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Mandelduft. Gr. hortensrosalila Blumen. 60 cm 0.80
- hybr. Six Hills Giant. Außerord. wertvolle Hybride	— — Nelkendom. Zartnelkenrosa Blütendolden. 50 cm 0.70
der bekannten und beliebten N. Mussinii. Die reich-	— Opal. Große, warmros. Blumen m. rot. Auge. 80 cm 0.70
verzweigten Büsche bringen ununterbroch. während	— Septemberschnee. Großblumig weiß, sehr spät-
des ganzen Sommers kräftige Rispen leuchtend lila-	blühend. 80 cm
farbener Lippenblüten. 25–30 cm. VII-X 0.60	— Sir William Lawrence. Große, frischklarrote
nervosa. Immerblühende Steingarten- und Rabatten-	Blumen mit klein., weiß. Auge. 70-80 cm 0.80
staude mit prächt., fingerlangen, ultramarinblauen	Phyllitis, Hirschzungenfarn, Polypodiaceae () – •
Ahrenblüten mit weißer Unterlippe, welche gut über	— scolopendrium var. Hookeri. Außerordentlich lang-
der Belaubung erscheinen. 20–30 cm. VI-IX 0,60	und breitblättrig, am oberen Blattende merkwürdig
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae O A D	geteilt. Erinnert stark an Platycerium, den Geweihfarn des Glashauses. 30–40 cm
linearis. Diese Nachtkerzenart bildet reichverzweigte, halbhohe Büsche mit schmallanzettlichen Blättern	
und einer Fülle von hellgelben, mittelgroßen Blu-	Physostegia, Etagenerika, Labiatae O = X
men. 20-30 cm VII-VIII 0.70	— virginiana Vivid. Lanzettliche, gekerbte, quirlständige Belaubung und auffallend weinrote Lippenblüten
Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae ○ □ X	an langen, aufrechten, dichtbesetzten Ähren. Sollte
— sinensis Königin Wilhelmine. Sehr große, gut gefüllte	in keinem Garten fehlen. 60-80 cm. VII-VIII 0.80
Blumen von vollendeter Schönheit. Herrlich silber-	Polystichum, Punktfarn, Polypodiaceae ()—
rosa, nach der Mitte zu in lachs übergehend. Eine	angulare prolif. nephrolepifolium. Herrlicher, immer-
wirklich vornehme Farbe. 60-70 cm. V-VII 2.—	grüner Farn, dessen vornehme, gelblichgrüne We-
Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ X	del an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten 3.—
orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn m. stark	Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae ○ ≅
gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm V-VI 1.—	— cordata robusta. Von dem bekannten Gartengestalter
— May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe.	Herrn A. Seifert-München erhielten wir diese durch-
50-60 cm V-V1 1.—	aus winterharte Art, die in München große Kälte-
Olympia. Die leuchtend feurigscharlachroten Blu-	grade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang
men stehen auf straffen, festen Stielen und sind	gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt
stark gefüllt. 40-50 cm V-VI 1.—	werden. Bisher nur als subtropisch bekannt.
- Sturmfackel. Die nur mittelhohen, in großer Zahl	100-120 cm VII-VIII 3.—
erscheinenden Blütenstiele sind straff aufrecht	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △
und tragen mittelgroße, feurig rote Blumen von außerordentlicher Leuchtkraft. Nicht umfallend.	- chrysocraspeda aurantiaca. Die dichten Polster
30-40 cm V-VI 1.—	sind übersät mit warmorangegelben Blüten.
- Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte.	5-10 cm V-VI 0.70
30-40 cm	— insignis. Silberweiße, erdbeerartige Belaubung, zu der
Pelargonium, Geranium, Geraniaceae ○ △ △	die in großen Mengen erscheinenden, mennigroten
- Endlicherianum. Seltene Art mit fleischigem Wurzel-	Blütenherrlichkontrastieren. 20-30 cm VI-VIII 1.—
stock und rundlich-herzförmigen Blättern. Die eigen-	Pyrethrum, Bunte Marguerite, Compositae ○ □ X
artig geformten Blüten sind frischrosa und karmin	- ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist
geadert. 20–25 cm VII-VIII 1.50	von einem prächtigen, karminrosa Strahlenkranz
Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae O	umgeben. Die langgestielten Blumen messen bis zu
Hallii & Seltene Alpine m. spatelförm. Belaub. u. leucht.	12 cm im Durchmesser. 50–60 cm . V-VI 0.80
blauen Blütenrispen. 10–20 cm VI-VII 1.— - heterophyllus True Blue. Schmal-lanzettiiche Blätter	— Mrs. James Leake. Die Blumen haben einen
u. leucht. hellbl. Blütenrisp. 30-40 cm VI-VII 1.—	Durchmesser von 8 cm, sind reindunkelrosa und stehen auf starken Stielen. 60-70 cm V-VI 1.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung	Sempervivum metallicum giganteum. Durch Kreu- 1St.
Pyrethrum ros. Rubens. Große, leuchtend karminrosa	zung der größten und schönsten Sempervivum ist
Blumen. Sehr frühblühend, daher für Schnittzwecke	es gelungen, eine riesenrosettige Art in den herr- lichen Metallfarben der Echeverien zu erzielen.
besonders wertvoll, 60-70 cm V. VI 0.80	5-10 cm VII-VIII 1.20
— lucan. Leucht. karminrot, einfach m. krauser gelber Mitte. Früh- u. reichblüh. 50–60 cm V-VI 0.80	Senecio, Kreuzkraut, Compositae $\bigcirc - \bigcirc \cong \Box \perp$
Primula, Primel, Primulaceae	- hybr. Hessei. Sehr dekorative Staude, die durch Kreuz-
— Juliae Gloria. Saftiggrüne Belaubung u. magentarote	befruchtung von S. Clivorum, Wilsonianus und
Blumen mit goldgelbem Auge. 5-10 cm IV-V 0.70	Veitchianus entstanden ist. Belaubung dreieckig, Blütenstiele langgestreckt, ähnlich S. Wilsonianus,
— pruhoniciana E. R. Janes. Herrliche, gut belaubte Kissenprimel mit besonders großen, leuchtend rosa-	jedoch erinnern die Einzelblumen an S. Clivorum.
roten Blumen in der Farbe wie Pr. rosea grdfl. Un-	Farbe leucht. orangegelb. 150-180 cm. VII-VIII 1.50
gemein reichblühend. 10–15 cm IV-V 0.80	— palmatilobus. Schöne Dekorationsstaude mit stark zerteilten Blättern u. lebhaftgelben Blütenständen.
— Purple Splendour. Große, purpurfarbige Blumen mit orangegelbem Auge. Die einzelnen Blumen-	Thre frühe Blütezeit macht sie im Senecio-Sortiment
blätter sind geschlitzt und der Rand etwas gewellt.	besonders wertvoll. 120-150 cm VI-VII 2.50
10-15 cm IV-V 0.80	Solidago, Goldraute, Compositae O A
— Rubin. Sehr große, samtigkarminrote Blumen. 10-15 cm IV-V 0.60	— brachystachya robusta. Eine robuste Form von S. brachystachya. Die stark verzweigten Büschel
Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae O \(\triangle \)	bringen im zeitigen Herbst eine Fülle leuchtend
— Arendsii. Interessante Hybride von R. amplexicaule X	gelber Blumen. 30–35 cm IX-X I.—
R. gramineus mit schweselgelben Blüten.	Stylophorum, Schöllkrautmohn, Papaveraceae () — () — diphyllum. Buschige Staude mit hellgrüner, fieder-
20-30 cm V-VI 1	teiliger Belaubung und gelben, mohnähnlichen
Roscoea, Zingiberaceae ○ △ — cautleoides August Beauty. Orchideenähnliche Staude	Blumen. 30-40 cm V-VI 1.
mit dicken Stengeln und fingerlangen, lanzettlichen	Thymus, Thymian, Labiatae O OO A De- membranaceus. Seltene Art aus Spanien, übersät mit
Blättern. Die leuchtend gelben Blüten mit helm-	großen, weißen Blüten. 10–15 cm VI-VII 0.80
artiger Oberlippe sitzen direkt am Stengel. 20-30 cm VIII-IX 2.—	- rotunditolia Purpurteppich. Ähnlich Th. serpyllum mit
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae ○ ≅	größer., rundlich. Laubwerk u. weithin leuchtenden weinpurpurroten Blüten. 5–10 cm VII-VIII 0.60
- sagittifolia fl. pl. Stark weiß gefülltblühend. Pfeil-	Tunica, Felsennelke, Caryophyllaceae $\bigcirc \bigcirc \triangle $
artige Blätter und große levkojenähnliche Blüten. Eine der schönsten und seltensten Sumpf- und	- saxifraga alba plena. Das nadelförmige Laub ist den
Wasserstauden. 40-50 cm VII-VIII 1.50	ganzen Sommer überdeckt mit gypsophilaähnlichen, weiß gefüllt. Blüten. Selten. 15-20 cm VII-IX 0.80
Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae 🕽 🛆 ::	— superba plena. Die Blumen dieser neuen Form sind
— caespitosa hybr. Astrild. Kräftigwachsende Blatt- polster, karmoisinrote große Blumen. Sehr apart.	in der Farbe dunkler als die der Sorte "robusta pl."
10-15 cm V-VI 0.80	15-20 cm VII-IX 0.80 Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae ○ ∞ ⊥ □
Bees Pink. Moosartige Belaubung und große,	— hybr. C. R. Adams. Schmuckvolle Staude mit grund-
leuchtend rosa Blüten, die in der Sonne nicht verblassen. 10–15 cm V-VI 0.80	ständiger Blattrosette und prachtvollen, goldgelben
Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae ○ □ X	großen Einzelblüten an langen, verzweigten Rispen. 100–120 cm V-VIII 1.—
- caucasica Amethyst. In Wuchs und Blütenform der	Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ ∞ △
S. Schöne von Eisenach ähnlich, jedoch mit dunkelblauen Blumen. 40–50 cm VI-X 1.—	— Armstrongii A Neusceländer Veronica. Durch die
— Frieda. Starkwüchsige Sorte m. zartblauen, großen,	dicklichen Zweige von auffallend leuchtender gold- bronzener Farbe erinnert die Pflanze an eine
edlen Blumen. 40–50 cm VI-X 0.80	Konifere. Sehr selten. 20–30 cm 1.50
— Mrs. Willmott. Mit großen, weißen Blumen aus mehreren Blumenblätterkränzen bestehend.	- hybr. Blaukerze. Herrlicher Bastard von V. Hender-
40-50 cm VI-X 0.80	soni und V. latifolia. Stramm aufrechtwachsend, tiefblaue Blütenrispen. 30—40 cm VII-IX 1.—
- Prachtkerl. Eine außerordentlich robuste Form mit	— filifolia. Fädig zerteilte, hellgrüne Belaubung und
großen, leuchtend blauen Blumen auf drahtartigen Stielen, wie sie bei keiner anderen Sorte zu finden	hellila Blütentrauben. 10–15 cm VI-VII 0.70
sind. 50–60 cm VI-X 1.20	— incana rosea. Silbergraue Belaubung und leuchtend rosarote Blütenrispen. Sehr reichblühend und stark
Sedum, Fetthenne, Crassulaceae ○ ∞ ① △	auffallend. 15-20 cm VI-VII 1.—
— spurium album superbum. Auf üppigen Polstern er-	— spicata Blauer Zwerg. Fällt durch die Fülle kleiner
scheinen die großen, reinweißen Blüten in großer Fülle. 510 cm VII-VIII 0.50	dunkelblauer kandelaberartiger Rispen im Steingarten unbedingt auf. 10—20 cm VI-VIII 1.—
— - splendidissimum. Sehr großblumig und reich-	- rubra. Mit leuchtend roten Blütenrispen.
blühend. Leuchtend dunkelkarminrote Blumen.	20-30 cm VI-VIII 0.80
5-10 cm VII-VIII 0.50 — telephium Munstead Dark Red. Schwarzrote, flei-	— teucrium prostrata Loddon Blue. Herrliche Zwerg- form mit kleiner rundlicher Belaubung u. leuchtend
schige Stengel und Blätter. 30-40 cm. VIII-IX 1.—	blauen Blütenähren. 5–10 cm V-VI 0.80
Sempervivum, Dachwurz, Crassulaceae ○ ∞ △	– rupestris rosea. Rosablühende Form von Veronica
Borisii. Mittelgroße, hellgrüne Blattrosetten, die weiß bewimpert sind. Hellgelbe Blüten. Sehr schön.	rupestris, die ebensoreich blüht.5-10 cm. V-VI 0.80 — alba. Die dunkelgrüne Belaubung verschwindet im
3-5 cm VII-VIII 0.80	Frühjahr unter einer schneeweißen Blütendecke.
- hybr. Rauhreif. Herrliche, purpurrote Hauswurz,	5-10 cm V-VI 0.80
die in der Jugend mit einem dicken Spinnenge-	Vinca, Immergrün, Apocynaceae ○—● △ — major acutiloba. Großblättriges' Immergrün mit groß.
webe überzogen ist. Die Rosetten werden bis 10 cm im Durchmesser und bringen karminrosa Blumen.	weißen Blüten, die von Frühjahr bis zum Herbst
3-5 cm VII-VIII 0.60	fast ununterbrochen erscheinen. 20-30 cm 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung 1 St.	Chrysopogon, Indianer-Goldfeder, Gramineae 1St.
Vinca minor Bowles var. Besonders schönes Singrün mit	— nutans. Schmale, bläulichgrüne Belaubung und leuch-
leuchtend blauen Blüten. 5–10 cm . IV-V 0.70	tend braungelbe Blütenrispen. 100 cm. Selten 0.80
Viola, Veilchen, Violaceae ○ △ : : X	Pennisetum, Lampenputzergras, Gramineae ○ ⊥ □
— cornuta Spaßvogel. Das alte, wunderbar schöne	— compressum. Sehr dekoratives, schmalblättriges
V. c. Jakanapes hatte den großen Nachteil, daß es	Ziergras mit 20 cm langen, walzenförmigen, rot-
nicht sehr winterhart war und außerdem beim Ver-	braunen Blütenähren auf kräftigen langen Stengeln.
pflanzen immer Verluste brachte. Nach jahrelanger	Eine besonders edle Erscheinung unter den Gräsern.
Bemühung ist es uns gelungen einen Sämling heraus-	60-80 cm VIII-IX 1.—
zuzüchten, der in Wuchs, Farbe und Blühwilligkeit	Heidekräuter-Neuheiten
dem alten "Jackanapes" gleicht, aber dessen Fehler	Heidekräuler-Neuliellell
abgelegt hat. Die oberen Blumenblätter sind braun,	Calluna, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :::
die unteren goldgelb. 10–15 cm IV-IX 0.80	— vulgaris alba plena. Rahmweiß, gefülltblühend.
grac. Alabaster. Schr wiichsiges, hartes Hornveilden	20-30 cm VIII-IX 1.50
in der Tracht wie Viola grac. Hansa, jedoch mit	- Camla Variety. Niedrig bleibende Form mit
alabasterweißen Blüten. 10–15 cm. IV-IX 0.60	leuchtend rosa Blütenrispen. Gefülltblühend.
- Strolch. Ein Sämling von Viola grac. Lord Nelson,	20-30 cm VIII-IX 1.—
welcher hübsche, runde Büsche bildet u. ungeheuer reich blüht. Blütenfarbe leuchtend veilchenblau, wie	— Foxii. Ganz niedere, runde Kissen bildende Pflanze
sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist.	mit purpurroten Blüten. 3–5 cm VIII-IX 1.—
10-15 cm 1V-1X 0.80	— H. G. Beale. Die dichtgefüllten, großen Blüten sitzen an langen Rispen. Eine sehr prächtige,
odorata Triumph () X Wohlriech, Veildien, Kräftige,	empfehlenswerte Sorte, die weiteste Verbreitung
dunkelgrün belaubte Büsche. Die großen Einzel-	verdient. 20–30 cm VIII-IX 1.—
blüten stehen straff auf langen, bequem pflück-	Johnson var. Die rosalila Blütenrispen erscheinen
baren Stielen. 15–20 cm III-IV 0.80	erst, wenn alle anderen Sorten verblüht sind.
Viscaria, Pechnelke, Caryophyllaceae ○ □ △	Selbst frühzeitiger Frost kann ihnen nichts anhaben.
- viscosa lilacina. Schöne fliederfarbene Pechnelke,	20-30 cm X-XI 1
deren immergrüne Blattrosetten sich im Herbst pur-	— — Mullion. Stark verzweigte, tiefrosa Blütenrispen.
purrot färben. 20-30 cm V-VI 0.80	20-30 cm VIII-IX 0.80
Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ △ ⊥	— prostrata. Kriechendes, sich sest dem Erdboden
agavaefolia. Interessante Pflanze mit agavenartiger	anschmiegendes Heidekraut mit lila Blütenrispen.
Belaubung und cremeweißen Blüten an starken	Eine ganz neue Erscheinung unter den Ericaceen.
Schäften. 30-40 cm VII-VIII 2	3-5 cm VIII-IX 0.80
Zauschneria, Kolibriblume, Oenotheraceae ○ △	— — atrorosea. Leuchtend rosa Blüten VIII-IX 0.80
— arizonica. Bedeutend härter, widerstandsfäh. u. stark-	flagelliformis. Peitschenförmige Zweige und
"1 ' 1 ' 1'C ' D' 1 1, D'	Lilanous Blitton
wüchsiger als Z. californica. Die leucht. rot. Rispen	lilarosa Blüten VIH-IX 0.80
erscheinen in großer Masse. 20-30 cm. VIII-X 0.80	= — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne
erscheinen in großer Masse. 20-30 cm. VIII-X 0.80	— — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.—
	— — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend.
erscheinen in großer Masse. 20-30 cm. VIII-X 0.80	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80
Winterharte Kakteen-Seltenheiten	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :::
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae O O A VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkel-
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.—	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ○ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae O O A VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tief-	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.—	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : : - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grun-	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : □: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80–100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50–60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ : □: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.—	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen,	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reich-	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.—	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: — carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 — Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Schr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.—	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten	— Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— — tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○ □ △ △	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Raßnesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Schr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○—(△ △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst	Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerorden(lich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ♯: - carnea afrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm II-IV 0.80 - gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10—15 cm II-IV 1.— - Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10—15 cm II-IV 1.— - Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10—15 cm II-IV 0.80 - ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20—30 cm VIII-IX 0.80 - hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15—25 cm VIII-IX 0.80 - vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20—30 cm VIII-X 0.80 - Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20—30 cm VIII-IX 0.80 - St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färbung auszeichnet. 20—30 cm VIII-X 0.80 Neue Moorbeetpflanzen Azalea (Rhodod). Azalee, Ericaceae ○ ♠ △
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80—100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50—60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rasinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae ○—(△ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner	Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VIII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :: - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII — arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, straudige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— — arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— ×anthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae O— △ △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60−70 cm	Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— tenuis. Außerorden(lich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ♯ carnea afrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm II-IV 0.80 gracilis. Außerordentlich feinlaubige u. feinblütige Form. Blüten rosa. 10—15 cm II-IV 1.— Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüten. 10—15 cm II-IV 1.— Ihomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10—15 cm II-IV 0.80 ciliaris hybr. Mrs. C. H. Gill ∧ Aparte Sorte mit prachtvollen, großen, purpurnen Blütenglocken. 20—30 cm VIII-IX 0.80 hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständigen Trauben. 15—25 cm VIII-IX 0.80 vagans F. D. Maxwell ∧ Auffallende Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarbenen Blumen in reicher Fülle. 20—30 cm VIII-X 0.80 Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 20—30 cm VIII-IX 0.80 St. Keverne ∧ Neue Sorte, die sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färbung auszeichnet. 20—30 cm VIII-X 0.80 Neue Moorbeetpflanzen Azalea (Rhodod). Azalee, Ericaceae ○ ♠ △
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandiff. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, schr großen Blüten. Sehr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, sehr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Sehr selten und sehr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Sehr seltene Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Sehr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten. Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae O—⊕ △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60−70 cm	- — Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ﷺ - carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10-15 cm
Winterharte Kakteen-Seltenheiten Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ VI-VII arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weiß bestachelten Gliedern und stumpfroten Blüten. 80−100 cm 3.— arizonica Griff. Die größtgliedrigste und schönste aller Freiland-Opuntien. Sie erreicht in der Heimat eine Höhe von etwa 1 m. Die Glieder sind flach, oft über 20 cm breit und über 25 cm lang. Blüten groß, tiefgelb, innen am Grunde orangerot. 50−60 cm 3.— grandifl. Engelmann. Schöne wüchsige, der Opuntia Rafinesquiana nahestehende Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern und tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, schr großen Blüten. Schr hart . 1.50 Howeyii. Prachtvolle, großgliedrige, schr robuste Büsche bildende Art. Glieder rundl. flach, 12-14 cm breit, dicht m. schneeweißen Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb. Schr selten und schr winterhart . 3.— utahensis J. A. Purpus. Schr seltene Art mit größen, prachtvoll karminroten Blüten. Die schön- und reichblühendste aller Freilandopuntien. Schr hart 2.— xanthostemma orbicularis. Herrliche seltene Art mit länglichovalen stark bestachelten Gliedern und leuchtend rosaroten großen Blüten. Sehr hart 2.— Ziergräser-Neuheiten Carex, Segge, Cyperaceae O— △ △ ⊥ Buchananii. Rehfellsegge. Schr dekoratives, äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung, wie es solche unter den Schmuckgräsern nicht mehr gibt. 60−70 cm	Kuphaldii. Kissenförmiger Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten VIII-IX 1.— - tenuis. Außerordentlich früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm VII-VIII 0.80 Erica, Heidekraut, Ericaceae ⊙ Δ :

Neue Moorbeetpflanzen Fortsetzung	Hydrangea, Hortensie, Saxifragaceae ○ ⊥ □ 1St.
Rhododendron hippophaeoides hybr. Kräftig	— macrophylla Domotoii. Eine bezaubernde Schönheit, AM
wachs. interessante Hybride mit großen, rosalila	der man die Hortensie nur an Wuchs u. Belaubung
Blumen 1V-V 4.—	ansieht. Große, gefüllte Blütendolden hübsch rosa.
praecox splendens. Kreuzung zwischen Rh. praecox	$30-40$ cm. Sommer 1.50 Juniperus, Wacholder, Pinaceae $\bigcirc \triangle \bot$
und Rh. dahuricum, die sich von der Stammsorte	— communis compressa. Miniaturwacholder. Bildet
durch einen strafferen, aufrechteren Wuchs und et-	ganz kleine, blaugrüne Säulchen u. ist gegenwärtig
was kleinere Belaubung unterscheidet. Die Blüten sind leuchtend rötlichlila	die zierlichste Konifere überhaupt. 15-20 cm 4.
— racemosum hybr. delicatum. Eigenartige schöne Hy-	— squamata Mayeri, Geweihwacholder. Wundervoll.,
briden zwischen Rh. racemosum und Rh. praecox.	graublau bezweigte Art von sparrigem, aufrechtem,
Kräftige, lanzettliche Belaubung. Mittelgroße, zart-	aber langsamem Wuchs
rosa Blüten III-IV 4.—	Kolkwitzia, Scheinweigelie, Caprifoliaceae O
— — roseum. Ähnlich voriger, jedoch mit frischrosa	- amabilis. Eine Neueinführung aus China mit glockig-
Blüten III-IV 4.—	röhrigen Blumen, die in der Form an Weigelien
Phyllodoce, Glockenheide, Ericaceae ○ △	erinnern. Sie sind von schöner, hellrosa Farbe und
- empetriformis splendens. Große Blütenglocken von	erscheinen in groß. Mengen. 120-150 cm. Sommer 2.—
dunkelkarminrosa Färbung. 10-15 cm V-VI 1.50	Ligustrum, Liguster, Oleaceae O-1 \(\Delta \) \(\L\) — ionandrum. Prächtiger, immergrüner, aufrechtwach-
Neue und seltene Gehölze	sender Zwergstrauch mit kleiner myrthenähnlicher
Buddleia, Sommerflieder, Loganiaceae ○ ¾ ⊥	Belaubung und weißen Blütensträußen. Im Herbst
- alternifolia. Die schlanken, leicht überhängenden	blauschwarze Beeren. 40-50 cm 1.50
Zweige tragen schmale, weidenartige Blätter, blatt-	Lonicera, Geißblatt, Capritoliaceae O— .
winkelständige Blütenbüschel von schöner rosalila	- Heckrottii. Starkwachsender Schlinger mit ziemlich
Farbe in großer Menge. 80-100 cm. Sommer 1.50	großer, ovaler tiefgrüner Belaubung. Die in lockeren
Chamaecyparis, Scheinzypresse, Pinaceae ○ △ ⊥	Sträußen stehenden Blüten erscheinen den ganzen
- Fletscheri. Schmale Säulen bildende Zwergkonifere in	Sommer hindurch. Die Knospe ist lebh. rosakarmin,
der Tracht eines Säulen-Juniperus mit silbergrauer	die geöffnete Korolle fleischfarbig, später goldgelb 2.—
Benadelung. Ein Edelstein unt. d. Zwergnadelhölz. 4.—	— Tellmanniana. Schlinger mit dunkelgrüner Belaubung u. langröhrigen, goldgelben Blüten in reicher Fülle;
Convolvulus, Winde, Convolvulaceae ○ ∞ △ ∧ — cneorum. Halbstrauchig, seidenhaarige silbergraue	ähnlich einer Azalea pontica. Sommer 2.—
Blättchen. Große weiße, rosa angehauchte Winden-	Parthenocissus (Ampelopsis) Efeu-Wein, Vitaceae O
blüten. Sehr schön. 20–30 cm VIII-IX 1.50	- tricuspidata var. Lowii. Herrlicher, stark auffallender,
Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae ○ △	durchaus winterharter Selbstklimmer mit kleinem,
- amoena. Aufrechtwachsender, dichtverzweigter Zwerg-	gekräuseltem Laubwerk von rosaroter Herbstfär-
strauch mit graugrüner Belaubung u. roten Beeren	bung. Sehr eigenartige japanische Einführung 2
in großen Mengen. 50-60 cm 2.50	Perowskia, Blauraute, Labiatae ○ ∞ △ ⊥
— Dammeri radicans (humifusa) <u>a</u> Eine großblättrige und in allen Teilen robustere Form von C. Dammeri.	— abrotanifolia. Artemisiablättriger, silbergrau. Zwerg- strauch mit leuchtend blauen Blütenrispen.
Auch die Beeren erreichen die doppelte Größe.	10 50
Außerordeutlich stark fruchtend 2.—	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △
- horizontalis fol. var. Weißbuntblättrige Felsenmispel,	- fruticosa Beesii. Sibergrau belaubt., niedriger Straud,
von der sich die roten Beeren prächtig abheben . 2.—	dessen große, goldgelbe Blumen zu dem schönen
microphylla cochleata. Eine vornehme Erscheinung	Laub herrlich kontrastieren. Blüht den ganzen
unt. d. Zwergmispeln. Im Wuchs ähnlich C. glacialis,	Sommer. 40-50 cm VII-IX 1.50
sich jedoch noch mehr an den Boden anschmiegend. Belaubung rundlich, glänzend dunkelgrün. Beeren	— Purdomii. Ein herrlicher, fein gesiederter Zwerg-
klein zinnoberrot	strauch mit unzähligen hellgelben Blumen während
- prostrata fructu sanguinea. Sich flach auf dem Erd-	des ganzen Sommers. 40-50 cm VII-IX 1.—
boden ausbreitende Felsenmispel mit roten Beeren 2.—	Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae O - D A L
Cytisus, Edelginster, Leguminosae ○ ∞ △ △	— coccinea praecox. Stacheliger, wintergrüner Strauch mit weißen Blütenbüscheln. Er unterscheidet sich von
- decumbens. Ganz flache Rasen bildende Ginsterart	der Stammform dadurch, daß der prachtvolle, rote
mit goldgelben Blüten in großen Massen. Sommer 1.50	Beerenschmuck 2-3 Wochen früher erscheint. Auch
Escallonia, Saxifragaceae ○ ⊥ virgata. Herrlicher immergrüner vollst. harter Zwerg-	fruchtet die Pflanze bedeutend reicher V 2
strauch mit kleinen Blättchen und großen roten	— crenulata Rogersiana, Orangefeuerdorn. Groß-
Bouvardienähnlich. Blütenbüsch. 80-100 cm. Sommer 1.50	blättriger und großfrüchtiger als vorige Art mit
Evonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae O-1 \(\triangle \)	noch lebhafteren, orangefarbenen Beeren 2.50
— japonica acuta. Ein an Vinca major erinnerndes, immer-	Ribes, Zierjohannisbeere, Šaxifragaceae O – () \triangle — Gayana Äußerst seltener Zwergstrauch m. fast immer-
grünes Gehölz mit flach auf dem Boden liegenden,	grüner Belaubung und gelben Blüten. 40–60 cm. 4.—
bis 1 m langen Ranken und prächtiger Färbung im	Salix, Zwergweide, Salicaceae ○ - ① △
Herbstu. Wint. Gute Bodenbedeckungspfl. 20-30 cm 1.— obovata. Im Wuchs ähnlich E. nana Koopmannii,	— Bockii. Reizender, kleiner chinesischer Zwergstrauch
jedoch mit großen, rundlichen Blättern besetzt,	mit stumpfovalen, unterseits blauweiß behaarten
die sich im Herbst rosarot färben. Selten.	Blättchen und kleinen weißen Kätzchen während
20 – 30 cm	des Sommers. 40-60 cm
Fuchsia, winterharte Fuchsie, Oenotheraceae O-1 \(\triangle \)	- simulatrix. Kriechende Zwergweide, deren Zweige mit
- grac. Iom Ihumb. Eine durchaus winterharte Zwerg-	silberweißen Kätzchen besetzt sind. Guter Wachser,
fuchsie, die den ganzen Sommer bis in den Herbst	jedoch nicht wuchernd. 30 cm
hinein überaus reich blüht. Die Kelchhülle ist rot,	Senecio, Kreuzkrautstrauch, Compositae O _
die inneren Kronblätter blau. Eignet sich ebenso hervorragend als Topf- wie als Steingartenpflanze.	— Greyi. Immergrüner, silbergraublättriger, 1 m hoher
Spielt in England eine gr. Rolle. 15-20 cm. Sommer 1.—	Zierstrauch mit großen gelben Kreuzkrautblüten in großen Büscheln. Sommer 1.50
1	

Niedrig bleibende, winterhart-ausdauernde Stauden

für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz Felsengehölze siehe Seite 82 Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 48

Es gibt wohl kaum eine Pslanzengruppe, die sich in den letzten Jahren solcher Beliebtheit erfreute, als die reizenden Kinder der Alpenflora, kurz Alpinen genannt. Wenn man unter dem Namen Alpinen ursprünglich nur Pslanzen unserer Alpenländer verstand, so bezieht man heute auch alle die herrlichen Kleinstauden mit ein, die unermüdliche Forscher und Sammler aus allen, unserem Klima verwandten Erdteilen, hauptsächlich den Gebirgen, zusammengetragen haben. Durch Züchtersleiß sind weiterhin eine ganze Anzahl Verbesserungen entstanden, so daß wir heute unter dem Sammelbegriff "Alpinen" über eine Riesenauswahl, im Charakter zusammenpassender Stauden verfügen, die sich durch ihren Formenreichtum, ihre Farbenpracht, ihre Reichblütigkeit und nicht zuletzt durch ihre Anspruchslosigkeit die Herzen aller Gartenfreunde erobert haben. Unser Umsatz beweist dies. Wir haben deshalb auch gerade dieser Pslanzengruppe unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet und alles schöne, was für unser Klima von Wert ist, in Kultur genommen (keine Pslanzen von nur botanischem Wert). Wir können Ihnen daher mit einer Auswahl dienen, die nur von ganz wenigen Firmen erreicht wird. Wenn Ihnen das Auswählen Schwierigkeiten macht, dann wenden Sie sich bitte an uns, wir machen Ihnen gerne Vorschläge. Auch verweisen wir nochmals auf unsere Sortimentszusammenstellungen auf Seite 5—8, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten.

Eine große Anzahl alpiner Stauden und Zwerggehölze halten wir stets in Töpfen vorrätig, so daß sie ohne jegliche Gefahr das ganze Jahr über verschickt und gepflanzt werden können. Diese sind auch sehr für Geschenkzwecke geeignet.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

Wir machen besonders aufmerksam auf die sich wiederholenden Zeichenerklärungen.

Acaena, Stachelnüßchen, Rosaceae O O A A 1 St. Rasenbildende Stauden mit miniaturrosenblättriger Belaubung und kugelförmigen, stacheligen Früchten im Sommer. Die Blüten sind weniger schön, die Fruchtstände um so interessanter.
— Buchananii. Schön blaugrün belaubt, Blüten weiß 0.40 — fissistipula var. violacea. Sehr hübsche Varietät, die besonders wertvoll ist, weil ihre Blätter im Winter eine prächtige, violette Färbung annehmen 0.40
— glaucophylla. Starkwüchsige graublättrige Art 0.40 — inermis. Mit silbrigbraungrüner Belaubung 0.40 — microphylla. Feine, bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen 0.40
novae zealandiae. Starkwachsend, mit rotborstigen Früchten. Laub bräunlich 0.40 pinnatifida. Seltene Art, grüne Belaub., weiße Blüten 0.40 rotundifolia. Rundblättrige, starkwüchsige Form 0.40
androsaceum. Blaugrüne Polst., rosa Blüt. VII-VIII 1.50 armenum. Silbergraue, nadelförmige Rosetten und
große, rosarote, nelkenähnliche Blütensträuße. 20 cm VII-VIII 1.50 — glumaceum. Stachelige, dichte, dunkelgrüne Polster mit zahlreichen ährenähnlichen, leuchtend karmin-
rosa Blumen. 10 cm VII-VIII 0.70 venustum. Graugrün belaubt, rosa Blütenähren. 10 cm 2.— Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae O - A Perringii. Tiefgezahnte, 15 cm lange Blätter bilden wurzelständige Rosetten. Die großen Lippenblüten
sind von prächtig rosa Farbe, 20 cm. VI-VII 0.50 Aceranthus diphyllus. Siehe Epimedium. Achillea, Alpenschafgarbe, Compositae 0 0 1 Niedrige, dichtrasige Pflanzen mit aromatischem,
silbergrauem oder grünem Laubwerk. V-VII ageratifolia. Weißblühende Art mit Ageratumblättern 0.40 aizoon. Silberweißblättrig, weiße Blumen. 20 cm 0.40 ambigua. Schöne, weiße Blüten. 15 cm 0.40 argentea. Reinweiße Blumen u. weißfilzige Belaubung 0.40 aurea. Feinzerteilte graue Belaub., goldgelbe Blüten 0.40 brachyphylla. Silbergraue Belaub., goldgelbe Blüten 0.40 chrysantha. Längl.grünl Blätter, Blüten hellgelb. 20 cm 0.60 Clavenae. Silbergraue Belaub., weiße Blüten. 15 cm 0.40 conjuncta. Siehe Neuheiten 0.80 Formaneckii. Schöne lange Silberbl., weiße Blum. 20 cm 0.50 Fraasii canescens. Weißgraue Blätt., weiße Blum. 20 cm 0.50

Achillea (Fortsetzung)
- Fronmülleri. Schöne, grüne Rasen bildend, Blumen
weiß
- Huteri. Graugrüne Belaubung, weiße Blüten. 15 cm 0.40
— Jaborneggi. Aschgraue Belaub., weiße Blüten. 20 cm 0.40
- Kellereri. Blätter schmal u. lang, silbergrau, weißbl. 0.50
- Kolbiana. Silbergraues Blattwerk, weiße Blüt. 15 cm 0.40
- Lewisii (King Eduard). Graue Belaubung, zartgelbe
Blumen. 20 cm
- lingulata. Blätter zungenförm., rosettenbild., weiße Blüt. 0.50
- macedonica. Aschgraue Belaub., weiße Blüt. 30 cm 0.40
- Portae. Graugrüne, stark gesiederte Blätter, weißbl. 0.40
- pseudopectinata. Silbergrau mit gelb. Blüten. 30 cm 0.40
- rupestris. Grün belaubt, Blüten weiß. 15 cm 0.40
- serbica. Große, schneeweiße Blumen, silbergraue Be-
laubung. 20 cm 0.40
- spinulifolia. Im Wuchs an Santoline chamaecyparissus
erinnernd. Blüten gelblich. 20 cm 0.40
- tomentosa. Graugrüne Belaub., goldgelbe Blütendold. 0.40
citrina. Siehe Neuheiten 0,60
— citrina. Siehe Neuheiten
- Wilczeckii. Ähnlich A. lingulata, große, weiße Blüten 0.40
Aconitum. Siehe unter mittelhohe Stauden.
Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae ○ △
palustris. Schmaleiförmige, grob gezähnte Blätter und
tiefblaue, röhrigglockige Blumen. 30 cm VII-VIII 0.60
Adonis, Adonisröschen, Ranunculaceae ○-① △
- amurensis. Goldgelbe, große, schalenförmige Blumen
über zierlichem Laub. Selten. 30 cm. IV-V 1.50
- fl. pl. Dichtgefüllt, später blüh. 30 cm IV-V 1.50
— Nadorkakii. Goldgelb. Selten. 20 cm IV-V 1.50
- pyrenaica. Ähnlich vernalis, stärker wachsend.
30 cm IV-V 1.—
— vernalis. Buschige Pflänzchen mit feinzerteiltem Laub,
große, goldgelbe Blüten, 15 cm IV-V 0.70
Aethionema, Steintäschel, Cruciferae ○ ∞ △ ∧ V-VI
- armenum. Aufrechte kleine Büsche, rosenrote Blüten.
30 cm
— cordifolium. Kleinherzblätterig, schön rosarot. 30 cm 0.60
— grandiflorum. Leuchtend rosa Blumen. 30 cm 0.60
— pulchellum. Nadelförmige, blaugrüne Belaubung mit
rosa Blütenträubchen. 15 cm 0.40
- Warley rose. Polster mit leuchtend rosa Blüt. 15 cm 0.60
Agrostis. Siehe unter Ziergräser.
Ajuga, Günsel, Labiatae $\bigcirc - \bullet \cong \underline{\wedge}$
Wintergrüne, kriechende Staude mit pyramiden-
förmigen Blütenquirlen IV-V



Leontopodium alpinum



Saxifraga sancta



Primula denticulata



Anemone pulsatilla



Adonis vernalis



lris pumila hybrida

laubung, nickende, mattlila Blütenglocken. 20 cm 0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Alyssum saxatile (Fortsetzung) 1 St.
T.M.	
Ajuga (Fortsetzung)	sulphureum. Silbergraue Belaubung mit hell-
- genevensis Brockbankii. Aufrechtwachs., dunkel-	goldgelben Blütensträußen. 30 cm 0.40
blaue Blüten. 10 cm 0.40	- serpyllifolium. Kleinblättr., kriech, Blüten gelb. 10 cm 0.40
— — Tottenhamii. Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten 0.50	- spinosum. Silbergraublättriges Sträuchlein, vollbesetzt
	mit weißen Blütchen. 25 cm. Selten 0.75
— metallica purpurea. Rot metallisch glänzende Blätter,	
blaue Blüten. 10 cm 0.30	- roseum. Mit rosa Blütchen. 25 cm. Schr Selten . 1.50
— crispa. Glänzend grüne, gekrauste Belaubung, eine	Anacyclus, Zwergmarguerite, Compositae ○ △
ganz interessante Erscheinung. Selten. 10 cm 0.50	- depressus. Die Pslanze bildet aschgraue Rasen mit
- reptans fol. var. Mit schönen weißbunten Blättern u.	fein gesiederten Blättchen und bedeckt sich mit rot-
blauen Lippenblütchen. 10 cm 0.40	violetten Knospen bezw. mit großen, weißen
— foliis multicoloris. Die Färbung ist der Alternan-	Strahlenblüten. 5 cm VI-VIII 1.—
thera Juwel ähnlich, auf der rotbraunen Grundfarbe	Anaphalis, Strohblume, Compositae ○ ∞ △ ∧
der Blätter erscheint die in roten Tönen gehaltene	- Royleana. Kriechende Polster bildend, Belaubung grau-
unregelmäßige Zeichnung derselben. 10 cm 0.30	filzig, Blumen gelb. 20 cm VII-VIII 0.50
— fol. purpureis superba. Blätter dunkelbraunrot,	— cinnamomea. Zimtbraune Blättch., Blüten weiß. 30 cm 0.50
tiefblaue Blüten. 10 cm 0.40	- triplinearis. Weißsilzige Blätter, weißblühend. 20 cm 0.50
	Anchusa myosotidifl. Siehe mittelhohe Stauden.
— rosea, Grüne Belaubung, rosa Blüten, 15 cm 0.30	
Alchemilla, Frauenmantel, Rosaceae $\bigcirc -\bigcirc \cong \triangle$	Androsace, Mannsschild, Primulaceae O-D A II
- alpina. Behaarte, nierenförmig geteilte Blätter und	Vielgestaltige Gattung. Teils rasige, teils Rosetten
grünlichgelbe Blüten. 10 cm VI-VIII 0.40	oder Kugelpolster bildende Pflanzen mit meist
- vulgaris. Große, nierenförmig geteilte Blätter, Blüten	silbergrauer Belaubung und primelartigen Blüten-
grüngelb. 20 cm VI-VIII 0.40	dolden. Die auserlesensten und typischsten Alpen-
Allium Alpophumoplauch Liliaceae O-() A	kinder, wahre Wunderwerke der Schöpfung. Lieben
Allium, Alpenblumenlauch, Liliaceae O-1 A	
Doldenblütige, sommergrüne Zwiebelgewächse mit	humosen Boden. 5-10 cm IV-VI
grasartiger Belaubung. Lieben humosen, trockenen	— arachnoidea. Kleine, weiß übersponnene Rosetten . 0.60
Boden VII-VIII	— carnea brigantiaca. Reichblüh., weißbl. Zwergsorte 0.50
- albopilosum. Bis 25 cm breite, lilafarbene Blüten-	— — Laggeri. Kleine, dichte Rasen bildend, hellrote Blüt. 0.60
dolden auf festen Stielen. 30 cm. Sehr dekorativ . 0.60	— Halleri rosea. Sehr feinrosettig, rosa Blumen 0.80
	- chamaejasme. Rosetten flach, Blüten weiß mit gelbem
cyaneum. 20 cm hohe, himmelblaue Blüten 0.40	
— album. Sehr schöne, weißblühende Abart d. blauen	Schlund
Blumenlauchs. 15 cm 0.40	— cinerea. Silbergraue Belaubung, rosarote Blütchen . 0.60
— — coelestinum. Leuchtend hellblaue Varietät. 15 cm 0.40	— foliosa strigilosa. Breitblättrig, hellrosa Blumen 0.70
superbum. Schöne, dichte, dunkelviolette Blüten-	— lactea. Polster bildend. Blütchen weiß 0.50
köpfe. 15 cm. Die späte Blütezeit machen diese	— lanuginosa. Zartrosa blühend, auf kleinen Ranken . 0.50
Sorten für den Steingarten besonders wertvoll . 0.50	- Leichtlinii. Blüten weiß mit rotem Auge 0.60
	— oculata. Weiß mit gelbem Auge 0.60
Farreri. Purpurfarbene Blütendolden. 30 cm 0.50	
— flavum. Hellgelbe Blüten. 20 cm 0.40	— obtusifolia. Weißblühend. Selten
- karafaviense. Breite, bläuliche, zungenartige Blätter	- sarmenfosa. Wolligseidige Blattrosetten und kleine
und große, rosafarbige Kugelblüten. 20 cm 0.50	Dolden rosafarbener Blütchen, sehr wüchsig 0.40
- moly (luteum). Breite, blaugrüne Blätter, leuchtend	— — Chumbyi. Kriechend, silberw. Belaub., lila Blütch. 0.50
gelbe Blütendolden. 30 cm 0.40	- primuloides. Große, rosarote Blum. auf schön. Polst. 0.50
- narcissiflorum (pedemontanum). Auf festen Stielen	- Watkinsii. Leuchtend rosarot, sehr gut gedeihend 0.40
großglockige purpurne Blütendolden. 20 cm 0.50	— sempervivoides. Blätt. fleisch. dachziegelig, Blüt. rosa 0.60
gronglodige purpurne Dittendorden 20 cm 0.50	
odorum. Schöne, weiße Blütendolden. 30 cm 0.50	- villosa, Blätt, dicht weiß behaart, Blüt, weiß b. rosenrot 0.50
Ostrowskianum. Große, karminpurpurne Blüten. 30 cm 0.50	- yunnanensis. Ahnlich A. sarmentosa mit leuchtend
– pulchellum. Lilarote, lockere Blütendolden. 30 cm 0.40	rosaroten Blüten in großer Menge. Selten 0.60
sikkimensis. Blaue, hängende Glöckchen. 20 cm 0.50	Anemone , Buschwindröschen, Ranunculacea $\bigcirc - \bigcirc \triangle \triangle$
- speciosum. Siehe Neuheiten 0.60	Beliebte Frühlingsblume. Eignen sich vortrefflich zur
- sphaerocephalum. Blütendolden purpurkarmin. 50cm 0.50	Unterpflanzung von lichtem Gebüsch. Lieben hu-
- tibeticum. Siehe Neuheiten	mosen Boden IV-V
umbellatum. Weinrote Blütendolden. 25 cm 0.40	— apennina ∧ Große, schöne, himmelbl. Blüten. InWuchs
yunnanensis. Weiße Blütendolden. 20 cm. Selten 0.60	u. Belaubung gleicht sie unserem Buschwindröschen 0.50
Alyssum, Steinkraut, Cruciferae O O A Meist grau-	— alba A Schöne, weißblühende Form. 15 cm 0.50
grünlaubige Stauden mit gelben Blüten. Sie sind	— blanda atrocoerulea ∧ In Belaubung d. vorig. ähnlich,
sehr reichblühend und passen sehr schön zu Au-	aber noch früher blühend, dunkelblauviolett. 15 cm 0.60
brietien, Iberis und Polsterphlox, mit denen sie zu-	— nemorosa. Weiß. Busch-Windrösch., Osterblume. 10cm 0.30
sammen blühen V-VI	— — Allenii. Großblumig, weichlila, eine der schönsten 0.70
	— — Blue Beauty. Lichtblau mit silbrig. Rückseite. 20 cm 0.80
- amanum. Silbergraue Polster, gelbe Blumen. 10 cm. 0.40	— Celestial. Klares, helles Himmelblau. 15 cm 0.70
- argenteum (rostratum). Kräftig wachsende Art mit	1 1 1
großen, gelben Blütensträußen. 30 cm 0.40	- cornubiensis. Dunkellilam. purpurnem Schein. 15cm 0.80
- diffusum. Dunkelgrüne Polster, Blumen gelb. 10 cm 0.40	— fl. alba pl. Weißgefülltes Buschwindröschen. 10 cm 0.60
— Moellendorfianum. Kriechend, silbergraue, rundliche	— fl. rubra. Rosa blühend. 10 cm
Blättchen und gelbe Blütenbällchen. 10 cm 0.40	— — Robinsoniana. Zarthellblau. 10 cm 0.70
- montanum. Graugrün, kriechend, gelbe Blüten. 15 cm 0.40	- ranunculoides. Gelbes Buschwindröschen. 10 cm 0.40
— pyrenaicum. Graugrün belaubt, weiße Blüten. 15 cm 0.40	— — fl. pl. Gelb gefüllte Spielart, kleinblumig. 20 cm . 0.60
	— Zeemannii. Hellgelber Bastard zwischen A. nemorosa
repens. Niedrige Polster, gelbblühend. 10 cm 0.40	
- saxatile compactum. Blätter silbergrau behaart, Blüte	und ranunculoides. 15 cm
rehr reich, leuchtendes Gelb. 30 cm 0.40	Anemone, Kuhschelle, Ranunculaceae ○ △
— — citrinum. Schöne, hellschwefelgelbe Blüten. 30 cm 0.40	Behaarte Belaubung, nickende Blüten und auf-
- fl. pl. Große Sträuße dichtgefüllter, goldgelber Blüt-	fallende Fruchtperücke. Lieben humos. Boden. IV-V
0.40	albiquanca (albana bubrida) Feingandlitata Re

fol. var. Weißbunte Art, Blüten goldgelb. 30 cm 0.50

Anemone (Fortsetzung)	Arabis albida (Fortsetzung)
- amoena. Prächtige, violette Glocken. 20 cm 0.50	— rosea. Blumen v. zartrosenroter Farbe, die namentl. ** in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt. 15 cm 0.30
— montana rubra. Rotblühende Küchenschelle. 20 cm. 0.50 — Halleri. Ähnlich Anemone Pulsatilla mit größeren,	— — superba. Bes.großblum. Varietät, Blüten weiß. 20cm 0.30
außen zottigeren Blüten. 20 cm 0.60	— alpina coccinea. Siche Neuheiten
pulsatilla. Mit violetten Blüten. 15 cm 0.40	— Rosabella. Große Blüten von leuchtender rosa Farbe, die im Verblühen nicht hell wird. 15 cm. 0.40
— Mrs. v. d. Elst. Prachtv. rosa blühend. 20 cm. Selten 1.50 — regalis. Riesenblütige pulsatilla. 30 cm. Selten 2.—	- Schneehaube. Siehe Neuheiten 0.60
coccinea. Scharlachdunkelrot. 30 cm. Selten 2	 androsacea. Zierl. Art mit silbriggrünen Blätt. 10 cm 0.40 caespitosa. Glänz. grüne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.60
— Weißer Schwan (alba). Reinweißblühend. 15 cm 0.60 vernalis. Violettweiße, kleine Glocken. 10 cm 0.70	— carduchorum. Niedrig, rasenbildend, weißblüh. 10 cm 0.40
Anemone, Alpenanemone, Ranunculaceae ○ - ① △	— Ferdinandi Coburgi. Graugrüne Belaubung, kleine
alpina. Die weiße Alpenanemone. 20 cm VI-VII 0.80	weiße Blütentrauben. 10 cm 0.50 — Halleri. Lockere Polster mit zierl., weißen Blüt. 10 cm 0.40
— — baldensis. Eine alpine Form von A. silvestris mit großen, weißen Blumen. 20 cm IV-V 0.70	— Kellereri.Hübsche, aschgr. Polster, Blüt. reinweiß. 10cm 0.50
- sulphurea, Gelbblühend. 30 cm VI-VII 0.70	 procurrens. Saftiggrüne Polster m. weiß. Blütch. 10 cm 0.30 Scopolii. Dunkelgrüne Rasen, weiße Blüten. 10 cm . 0.50
caroliniana (decapetale). Schwefelgelb blühendes,	— Sturii. Dunkelgrüne Polster, weißblühend. 10 cm 0.40
großblumiges Bergwindröschen, ähnlich Anemone silvestris, jedoch grundverschieden in der Belaub. 0.80	— Sündermannii. Schöne, graugr. Polst., weiße Blüt. 10 cm 0.50
Lesseri. Siche Neuheiten	 vochinensis. Kleine zierliche Art, weißblühend. 10 cm 0.40 Wilczekii. Sehr schöne Polster bildend, weiß. 15 cm 0.60
narcissiflora. Kräftigwachsende Art, mit weißen, doldenständigen Blüten. 30 cm V-VII 0.70	Arenaria, Sandmiere, Cariophyllaceae ○ ∞ △ △
pratensis. Dreifachfiederteilig, Blum. dunkelviol. 25cm 0.60	Duftige, nadelblättrige Kissen bildende Pflanze
Antennaria, Katzenpfötchen, Compositae O O A De Dichte Polster bildende Pflanzen mit aschgrauer	— armeriastrum. Sehr schöne grüne starre Polster bil- dend, weißblühend. Selten VI-VII 0.70
bis silberweißer Belaub. u. kleinen Strohblümchen.	— caespitosa. Siehe Sagina subulata.
alpina. Kleines, silbergraues Blattw. 5 cm V-VI 0.40	— foliosa. Grob nadelblättrig, Blüten groß, weiß. 10 cm 0.50 — grandiflora. Großblumig, weiß. 20 cm . VI-VIII 0.40
aprica. Besond. großblättrig, silberweiß. 10 cm 0.30 dioica. Blätter graugrün, Blütchen strohblumenartig	— Ledebouriana. Blaugraue Rosett., gelbgrüne Blüt. 20cm 0.50
hellrosa. 10 cm V-VI 0.30	— montana. Prachtv. Art, blendendweiße Blüten. 10 cm 0.40
rubra. Wie vorsteh., jedoch rosenrote Blüten. 10 cm 0.40 rosularis. Silberweiße kleine Blättchen. 5 cm 0.50	— purpurascens. Blättchen glänzenddunkelgrün, Blüten hellrosa. 10 cm VII-VIII 0.50
tomentosa candida. Blätter silbergr., Blütchen weiß.	— rigida. Schöne grüne Polster bildend, weiß. 10 cm . 0.40
Anthemis, Bergkamille, Compositae \bigcirc \triangle Aromatisches	Rosanii. Siehe Minuartia. rotundifolia. Feste Polster mit runden Blättchen, weiß-
Laubwerk u. margueritenähnl. Blüten VI-VIII	blühend. 3 cm VI-VII 0.30
aizoon. Siehe Adillea aizoon.	— tetraquetra. Dichte Polster, deren vierzeilig angeord- nete, übereinander liegende Blättchen die Triebe
Biebersteinii. Die feinzerteilt. Blätter sind silbrigseidig behaart; die Blüte ist gelb. Sehr feine Art. 25 cm 0.50	vierkantig erscheinen lassen. 5 cm VII-VIII 0.50
carpathica (styriaca). Feinzerteilte graugrüne Belaub.,	Aretia vittaliana. Siehe Douglasia.
blendendweiße, ziemlich große Margaretenbl. 20 cm 0.40 — cinerea. Große, weiße Blüten. 20 cm 0.50	Armeria, Grasnelke, Plumbaginaceae ○ ○ △ : Dichte, runde Büschel grasartiger Blätter u. rote,
montana. Feinlaubig, weißblühend. 15 cm 0.40	weiße oder rosa Blütenköpfe IV-VI
— santolinoides. Frischgrüne Rasen, fein zerschlitzte Belaubung, gelblichweiße Blumen, besonders stark	— alpina. Runde Büsche grasartiger Blätter, Blüten- köpfe leuchtend rot. 20 cm 0.40
aromatisch duftend. 30 cm	— caespitosa hybr. Kleine, zierliche Art, feste Polster
Anthyllis, Wundklee, Leguminosae ○ ∞ △	bildend, rosa Blüten. 5 cm 0.60 — alba. Weißblühend, sonst wie vorige 0.60
montana. Schmetterlingsblütler mit behaarten Fieder- blättern. Hübsch rosa. 20 cm V-VI 0.50	— formosa splendens. Dichte Rosette, lanzettliche
- angustifolia. Schmalblättrige und starkwüchsige	Blätter, blendend rote Blütenköpfe. 30 cm 0.50 - hybr. Bees Ruby. Mit 30 cm hohen Stielen u. großen
Form. 20 cm V-VI 0.60 vulneraria rubrifolia. Grob schmalförmige Belaubung,	leuchtend rosaroten Blütenköpfen 0.60
rosarote Blumen. 30 cm V-VII 0.40	- leucocephala. Niedrige Art mit weißen Blüt. 15 cm 0.30
Antirrhinum, Löwenmaul, Scrophulariaceae O A A glutinosum. Ähnelt dem bekannten Löwenmäulchen,	— majellensis. Kräftige Belaubung, lilarosa Blüt. 30 cm 0.50 — maritima. Mit lilaroten Blütenköpfen. 30 cm 0.30
ist jedoch mehr niederliegend. Blüten weißlichgelb.	— alba. Ähnl. der vorigen, mit reinweißen Blüt. 30 cm 0.30
Aposeris, Hainlattich, Compositae (\bigcirc \bigcirc \triangle	— Laucheana. Lilarosa, reichblüh.u. großblumig. 30 cm 0.30 — rosea compacta. Frischkarminrosafarbene Blüten
foetida. Hübsche, löwenzahnartige, gelbblühende	auf kräftigen Stielen. 20 cm 0.40
Pflanze für absonnige und feuchte Stellen. 15 cm 0.50	Schöne von Fellbach. Lilarosa, sehr großblumig
Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae O-1 \(\triangle \) — alpina. Alpenakelei. Leucht. blau. 30 cm V-VI 0.60	und reichblühend. 30 cm
Helenae (flabellata nana). Dunkelblau mit weißer	purpurkarminroten Blütenköpfen. 15 cm 0.50
Korolle. $30~\mathrm{cm}$ V-VI 0.50 Arabis, Gänsekresse, Cruciferae $\bigcirc \triangle \parallel : \square$	Arnebia, Prophetenblume, Borraginaceae O A
Rasen- oder rosettenbildende Stauden mit einer	— echloides. Die 30 cm hohen Blütenstengel bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit 5
Fülle von Blütentrauben III-IV	schwarz. Fleck. gezierte Blumen hervor IV-V 1
— albida atrorosea. Siehe Neuheiten 0.80 — fl. pl. Die Rispen dichtgefüllter Blumen sind kleinen,	Arnica, Wohlverleih, Compositae ○— ↑ △ — longifolia. Siehe Neuheiten
gefüllten Nachtviolen ähnlich und liefern ein vor-	— montana. Goldgelbe Marguerite. Bekannt. Heilmittel
zügliches Schnittmaterial. 20 cm 0.30 fol. var. Hübsche weißbuntblättrige Form, Blüten	für Wunden. 35 cm VI-VIII 0.50
weiß. 20 cm 0.40	— sacchalinensis. Goldgelb, besonders große Blumen.



Viola cornuta Spassvogel



Soldanella pusilla



Globularia trichosantha



Tunica saxifraga robusta fl. pl.



Achillea macedonica



Asperula nitida



Opuntia xanthostemma orbicularis



Carlina acaulis



Phlox subulata Sprite .



Cyclamen europaeum

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Astragalus, Tragant, Leguminosae O O A Niederge- 1St.
Artemisia, Edelraute, Compositae O \otimes \triangle	streckte, aufstreb. Triebe unpaariggesiederte Blätter,
Zwergbuschige, meist silberweiß belaubte Stauden.	rundköpfige Blütentrauben. 20 cm VI-VII — alpinus. Kriechende Polster, Blumen blauweiß 0.80
Blüten nur botanisch interessant, dafür ist aber das	- angustifolius. Prächt., silbrige Stachelpolst., Blüt.weiß 0.60
aromatische Laubwerk um so schöner.	- aristatus. Hellgrüne stachelige Zweige, Blüten rosa . 1.50
— Baumgartenii. Breitgesiederte Silberblätter. 15 cm. 0.70 — brachyphylla splendens.Feinzerteilte silbr. behaarte	- hypoglottis (purpureus). Buschige Polster, rote
Blätter. 10 cm	Blütenköpfe
— caucasica. Großweißfilzige Polster. 20 cm 0.60	— carniolica. Zierliches, kleines Pflänzehen mit zerteilten
— lanata (pedemontana). Lockerrasig, silberweiß. 10 cm 0.50	Blättern und grünlichweißen Blütendolden.
— mutellina. Noch niedriger wie die vorige. 10 cm 0.50 — pontica. Silbergraue Belaubung. 30 cm 0.50	15 cm V-VI 0.50
— pontica. Silbergraue Belaubung. 30 cm 0.50 — rupestris. Graugrüne Belaubung. 20 cm 0.50	Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae ○ △ : □ □
— Stelleriana. Silberweißblättrig, 40 cm 0.50	Alle Aubrietien bilden dichte, niedrige Polster von
Arum. Siehe mittelhohe Stauden.	meist graugrüner Belaubung, welche im Frühling jedoch völlig verschwinden unter der Fülle der
Asarum, Haselwurz, Aristolochiaceae 1 - 4	Blüten. 10 cm 1V-V
— europaeum. Staude für waldige Plätze, frischgrün. lederartiges aromatisches Laubwerk. 10 cm 0.30	- croatica. Zierlichste u. kleinste von all. Aubrictien, blau 0.40
Asperula, Waldmeister, Rubiaceae ○ - ① △ △	— deltoidea. Hellila, sehr frühblühend 0.30
Verwandte unseres Waldmeisters mit nadelförmigen	 — Alfred Willcock. Großblumig, rotviolett 0.50 — Blue King. Lavendelblau, sehr großblumig 0.40
Blättchen. Lieben, mit Ausnahme des heimischen	— Campbell Improved. Dunkelpurpurblau 0.40
Waldmeisters, frisch humose, sonnige Lage.	— — Dr. Mules. Groß, leuchtend dunkelviolett 0.40
— Athoa. Graugrüne Polster, gelbblühend 0.70	— Feuerkönig. Leuchtend rot
- capitata. Ein duftiges Kissen, weißblühend 0.00	— Froebelii. Dunkelpurpur 0.30 — Gloriosa. Leuchtend rosa, großblumig 0.50
- cynanchica. Uppiges Polster, rosablühend 0.60	- Godstone. Siehe Neuheiten
— Gussonei. Dunkelgrüne Polster, rosa Blütchen. 5 cm 0.70	— — Hendersonii. Schön violettblau
— hirta. Reizende, rosablühende Alpine, schöne, lockere Polster bildend	- H. Marshall. Leuchtend violett, großblumig 0.40
- longifolia. Lange nadelförmige Belaubung, weiße	— Lavender. Prächtig hellavendelblau 0.40
Blütendolden 0.60	 — Leichtlinii Crimson. Großblumig, leuchtend rot 0.40 — Lilakönigin. Gutremontierende Sorte mit besonders
- nitida. Polsterbildend mit zierlichen rosa Blütchen . 0.50	großen, hellila Blumen, sehr vornehme Färbung 0.50
— odorata. Der bekannte Waldmeister, der sich auch zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten	- Magnificent. Siehe Neuheiten 0.80
vorzüglich eignet	— Moerheimii. Großblumig von schöner rosa Farbe 0.40
— suberosa. Aschgraue Pölsterch. mit rosa Blüt. übersät 0.80	— Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkelpurpurblau 0.40 — Pauls Lilac. Zartrosalila, großblumig 0.40
Asphodeline. Siehe mittelhohe Stauden.	— Peter Barr. Großblumig, dunkelviolett 0.50
Aster, Bergaster, Compositae O & X : Bilden rundliche Büsche und sind sehr anspruchslos . V-VI	— Prichards. Herrlich dunkelviolette Blüten 0.30
— alpinus. Reichblühend, hellblau. 20 cm 0.40	— Prinzessin Wunderhold. Siehe Neuheiten 0.80
— — albus. Weiße Form. 20 cm	— — Purple Robe. Purpurrosa, großblumig 0.30 — — Purpurkönig. Dunkelpurpur 0.40
— — Dunkle Schöne. Tiefdunkellila. 20 cm 0.50	— Purpurteppich. Leucht. dunkelviolette, groß. Blum. 0.40
— Goliath. Sehr große hellblaue Blüten. 20 cm 0.40 — Güte. Siehe Neuheiten	— rosea splendens. Großblumig, leuchtend rosa . 0.40
- Liebe. Siehe Neuheiten	- Russel Vincent. Siche Neuheiten 1.
— magnificus. Besonders großblumig, hellblau. 10 cm 0.40	— The Queen. Rotviolett, sehr reichblühend 0.40 — Vera Prichards. Große, karminrote Blumen 0.50
— Mut. Siehe Neuheiten 1.20	Vesuv. Siehe Neuheiten
— Nixe. Großblumig, rosalila. 20 cm 0.40 — Reinheit. Siche Neuheiten 0.80	— Vindictive. Dunkelrot, sehr großblumig 0.50
- Rex. Große, bis zu 6 cm im Durchmesser haltende	— graeca grdfl. Großblumig, violettblau 0.30
Blumen, edel geformt, herrlich weichlila. 15 cm . 0.40	— superba. Sehr kompakt bleibende Form. Große, hellila Blumen
— ruber. Blumen rosarot. 20 cm	- tauricola. Dunkelblaue, ganz niedrig bleibende Art . 0.30
— Schönheit. Siehe Neuheiten	— — alba. Große weiße Blumen
— superbus. Mit mittelgroßen, schön geformten Blu-	Azorella, Andenpolster, Umbelliferae O – 1) 🛆 🕮
men, äußerst reichblühend, hellblau. 20 cm 0.30	— peduncularis. Immergrüne, noch dichtere Polster als A. trifurcata. Selten V-VI 0.80
— Treue. Siehe Neuheiten	- trifurcata. Herrliche, immergrüne, unverwüstliche
— Wunder. Siehe Neuheiten	Polsterstauden mit gezackten Blättchen, Blüten
- brachystrichus. Tracht wie A. subcoeruleus, jedoch	grünlichweiß V-VI 0.40
früher blühend. Blumen hellblau. 30 cm 0.50	Bahia, Wüstenfeinstrahl, Compositae ○ ∞ △ — lanata, Graufilz. Belaub., gelbe Strahlenblüten. 20 cm-0.40
- sibiricus. Lila Sternblüt., lanzettliche Belaubung. 20 cm 0.50	Banffia petraea. Siehe Gypsophila transylvanica.
Astilbe, Zwergspiraee, Saxifragaceae O-O ≅ △ Leder-	Bellium , Zwergbellis, Compositae ○ - 1 △
artige, gekrauste dunkelgrüne Belaub. VII-VIII — crispa Däumling. Blüten hellrosa mit dunkler. Spitzen,	minutum. Reizendes, kleines Pflänzchen mit weißen,
etwas kräftiger wachsend wie die übrigen crispa 0.60	an Gänseblümchen erinnernde Blumen. Blüht den
- elata. Siehe Neuheiten	ganzen Sommer hindurch. 5 cm 0.40
— Gnom. Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen 0.60	Bergenia (Megasea) Saxifragaceae O-() A:: Derbe
 Kobold. Dunkelrosa Rispen. 15 cm	Stauden mit meist immergrüner, großer, rundlicher Belaubung u. hohen Blütendolden. Lieben frischen,
— Perkeo. Purpurlila, besonders nieder. 15 cm 0.60	humosen Boden IV-V
- sinensis pumila. Prächtige, kleine Ausläufer treibende	— ciliata. Längleiförmige Blätter u. rosa Blüten. 20 cm 0.60
Art mit rötlichlila Rispen in großer Zahl. 30 cm. 0.50	— cordifolia. Dunkelrot, sehr großblumig. 30 cm 0.40

Bergenia (Megasea) (Fortsetzung)	Campanula (Fortsetzung)
- cordifolia erecta. Große, aufrechte, rosa Blüten-	- glomerata acaulis. Dichte, runde Sträuße dunkel-
dolden. 20 cm	violetter Glockenblumen, fast stengellos, auf saftig-
- crassifolia. Frühblühende Blattstaude mit großen, glän-	grünen Blattrosetten. 10 cm
zendgrünen Blättern und rosaroten Blüten. 30 cm 0.40	— — Hendersonii. Siehe Neuheiten
— Delavayi. Kerbzähnige Blätter, rosa Blütendold. 20 cm 0.50 — orbicularis. Rundliche Blätter, rosenrote Blüt. 30 cm 0.50	— R. B. Loder. Siehe Neuheiten 1.20 — istriaca. Aus der Verwandtschaft der C. garganica, aber
— pacifica. Kleine, eiförmige Blätter, Blüt. rosa. 20 cm 0.50	kräftiger wachsend, mit hellila Sternblüten. 10 cm 0.60
- Schmidtii. Rundl. eiförm. Blätter, rosarote Blütendold. 0.50	— pelviformis. Flache, tellerförm. hellblaue Blum. 20 cm 0.50
speciosa. Sehr frühblühend, rosa. 30 cm 0.50 Stracheyi. Frischgrüne Belaubung. Blüt. weißlichrosa 0.60	 — alba. Weißblühend, sonst wie vorige. 20 cm 0.50 — Portenschlagiana. Niedrige Art mit dunkelblauen
Betonica nivea. Siehe Stachys.	Blüten, schön für Mauern. 10 cm 0.50
Brunella, Braunelle, Labiatae O-D & Guter Dauer-	- muralis. Etwas schwächer wachsend wie die vorher-
blüher mit anschnlichen Lippenblüten in dichten Ähren, 15–20 cm	gehende u. einige Tage früher m. d. Blüte beginnend 0.50 - Poscharskyana. Siehe Neuheiten 0.60
grandiflora alba. Große reinweiße Blüten 0.40	— Pipperi. Ähnl. rhomboidalis m. hellblauen Blüt. 30 cm 0.40
- rosea. Schön karminrosa	— pulla Tiefdunkelviolette nickende, große Glock. 10 cm 0.50
— incisa. Blum. dunkelviolett, Blätt. tief eingeschnitt. 0.40 — rubra. Dunkelrosa blüh. Varietät der vorhergeh. 0.40	— alba. Siehe Neuheiten
Webbiana. Große violette Lippenblumen 0.40	verhältnismäßig großen, dunkelvioletten Glocken;
Calamintha alpina. Siehe Satureia.	außerordentlich reichblühend. 15 cm 0.50
Calceolaria, Pantoffelblume, Scrophulariaceae ○─● △ /	— punctata. Mit unterseits rot. Blattwerk v. weinroten, fingerhutähnlichen, hängenden Blütenglock. 30 cm 0.50
polyrrhiza. Mit verkehrt eiförmigen, fast grundstän-	— — alba. Weißblühende Form. 30 cm 0.50
digen Blättern und gestielten, gelben pantoffel-	pusilla. Kleine, hellblaue Glöckchen, sehr reichblühend,
förmigen Blüten. 15 cm VI-VII 0.80 Callianthemum, Jägerkraut, Ranunculaceae ○ △	reizend für Mauern und Felspartien. 10 cm 0.40 — alba. Mit kleinen, weißen Glöckchen. 10 cm 0.40
anemonoides. Anemonenartige weiße Blüten.	— — Hallii. Mit zieml.groß. bläulichweißen Glock. Selten! 0.70
20 cm III-IV 1.50	 — Mifs Willmott. Silbrighellblau, großblumig. 10 cm 0.50 — pallida. Mattblaue Glöckchen. 10 cm 0.40
Campanula, Zwergglockenblume, Campanulaceae	— Seiberti. Dunkelgrüne Belaubung u. stark dunkel-
	blaue Blüten, die in großer Fülle erscheinen. 15 cm 1.—
Gehören zu den schönsten und dankbarsten Felsen- stauden. Bilden dichte Büsche oder lockere Rasen,	 — tiroliensis. Großblumige dunklere Varietät. 10 cm 0.40 — Raddeana. Zierliche Art, violette Glöckehen, sehr
welche zur Blütezeit mit aufrechten oder nickenden	reichblühend. 30 cm 0.60
Blütenglocken übersät sind VI-VIII	Raineri vera. Seltene, niedrigbleibende, weichbehaarte
abietina. Mit lanzettlichen Blättchen und großen, dunkelblauen Blüten. 20 cm 0.40	Art mit großen, porzellanblauen Glocken. 10 cm . 0.70 – rhomboidalis. Leuchtend blaue Glocken. 30 cm 0.40
- Allionii. Seltene hochalpine Art aus den Westalpen	— — alba. Siehe Neuheiten
mit großen, blauen Glocken. 20 cm 1.— carpathica. Runde Büsche bild., reichblüh., lila. 30 cm 0.40	rotundifolia olympica. Hellblaue Spielart, die fast den
- alba grdfl. Blendendweiße Blütenglocken. 30 cm 0.40	ganzen Sommer über ununterbrochen blüht. 30 cm 0.40 — superba. Dunkle, großblumige Form unserer wilden
- Chewton Joy. Siehe Neuheiten 0.80	Wegrand-Glockenblume. 30 cm 0.40
— Elegant. Siche Neuheiten 0.80 — Isabell. Die schalenförmigen Blumen sind von be-	— saxifraga. Große, dunkelviolette, enzianartige Blumen auf gedrungenem Laubbusch. 10 cm 0.60
sonders dunkler Farbe. 20 cm 0.50	- Scheuchzeri. Ähnlich C. caespitosa, mit unterirdischen
Liliput. Siehe Neuheiten	Ausläufern. Blumen mittelgroß, blauviolett. 20 cm 0.40
- Little Gem. Großblumig weiß. 15 cm 0.50 maxima. Siehe Neuheiten 0.60	— — alba. Mit weißen Blütenrispen. 30 cm 0.50 — Stansfieldii. Reizende niedr. Hybride, die mit ihr. Flor
minor. Blaublühende kleinblumige Form. 15 cm 0.30	später als die and. kleinblum. Sorten beginnt. 10 cm 0.60
— alba. Weißblühend. 15 cm 0.30 — Moonlight. Siehe Neuheiten 0.80	— Tommasiana. Kleine Blättchen u. blaue Blüten. 15 cm 0.70
— Queen of Somerville. Siehe Neuheiten 0.80	— Waldsteiniana. Zierl., kleine Art, mit grauschimmerndem Laub und kleinen, lila Glöckehen. 10 cm 0.70
Riverslea. Kräftigwachsend, mit großen violetten	- Wockeana, Reizend. Bastard zwisch. Waldsteiniana
Blumen. 20 cm	und Tommasiana; blaue Sternblüten. 10 cm 0.80
- turbinata echt. Reizende Art mit aufrechten,	Cardamine, Teppich schaumkraut, Cruciferae O-(D ≅ \(\omega\) — asarifolia. Gute Bodendekungspflanze für feuchte
dunkelvioletten, flachen Glocken. 15 cm 0.50 White Star. Starkwachsende Spielart mit großen	Lagen. Blüten weiß. 20 cm V-VI 0.40
flachtellerförmigen weißen Blüten. 20 cm 0.50	Carex. Siehe Ziergräser.
— Wilsonii. Zur Zeit der Blüte verschwindet die grau-	Carlina, Wetterdistel, Compositae O O A II
grüne Belaubung fast ganz unter der Fülle der großen dunkelvioletten Glocken. 10 cm 0.50	— acaulis. Auf der Blattrosette sitzende große silber- weiße Blüten. 5 cm VI-VIII 0.50
collina. Mittelgroße, dunkelviolette Glocken. 15 cm. 0.50	var. caulescens. Die großen Blumen sitzen auf
elatines. Kleine, kriech., hellblaue Felsensorte. 5 cm 0.40	30 cm hohen Stengeln VI-VIII 0.50
fenestrellata. Grüne Blattrosett., blaue Sternblüt. 10 cm 0.60 garganica. Niedr. Art mit kriechenden, reichverzweigt.	— acanthifolia. Gelbliche Blütenköpfe, großblumiger als die vorige. 15 cm VI-VII 0.60
Blütenranken und sternförm., hellila Blumen, 6 cm 0.40	- cynarea. Mehr weiße, noch größ. Blüt. 25cm VI-VII 1
- erinus major. Große violettblaue Sternblitt. 10 cm 0.60	Centaurea, Zwergkornblume, Compositae ○ △
- Mrs. H. H. Payne. Siehe Neuheiten 0.70 - villosa. Zottig hehaarte Abart. 6 cm 0.50	bella. Mit zerteiltem silbergrauem Laub und rosa
alba, Weißblüh, behaarte Form, 6 cm, Selten, 0.70	Blüten, Selten, 20 cm VI-VII 0.60

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Coreopsis, Zwergmädchenauge, Compositae ○ △ 1St.
Centaurea (Fortsetzung)	- rosea nana. Margueritenähnliche Staude mit rosa
Koeningi. Silberige eingekerbte Blätter, rosarote	Blüten, für kalkhaltigen, nicht zu feuchten Boden.
Blüten. 20 cm VI-VII 0.80	20 cm VII-VIII 0.40 Cornus, Teppichhartriegel, Cornaceae ○ - ① △ △
Cerastium, Hornkraut, Caryophyllaceae ○ ∞ △ 🕮	- canadensis. Blätter quirlig, große, weiße Blüten und
Niedere, kriechende Gewächse mit gegenständigen,	rote Beeren. Verlangt Moorboden. 10 cm 2.—
kleinen lanzettlichen Blättehen, meist silberweiß oder graugrün. 10–20 cm V-VI	Coronilla, Kronenwicke, Leguminosae ○ △ — vaginalis. Wickenartige Pflanze mit Dolden kleiner
alpinum villosum. Starkwollig behaarte, silberweiße	gelber Schmetterlingsblüten. 20 cm . VI-VII 0.50
Blättchen, große weiße Blüten 0.40	Cortusa, Heilglöckchen. Primulaceae
— arvense compactum. Reinweißer, geschlossener Blü- tenteppich. Wächst geordneter als alle übrigen 0.30	— Matthiolii. Primelartige Pflanze mit karminroten Glöck- chen. 15 cm V-VI 0.60
Biebersteinii. Herrlich für Böschungs- u. Mauerplätze,	- pubescens. Besonders stark und weich behaart.
silbergraue Belaubung, weiße Blütenmassen. 20 cm 0.30	15 cm V-VI 0.60
— tomentosum. Silberweiße Belaub. Niedl. Art. 15 cm 0.40 — candidissimum. Schneeigfilzig, große, weiße Blu-	Corydalis, Lerchensporn, Papaveraceae ○ - ● △ Bilden dichte Büsche mit farnartiger Belaubung
men. 10 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	und lockeren Blütenrispen. Gehören zu den besten
— Columnae. Noch weißer als tomentosum. Nicht	Dauerblühern. 20 cm V-X
wuchernd. 15 cm	- cheilanthifolia. Farnwedelähnliche Blätter, mit gelben Blüten. 25 cm
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae O-D A	lutea. Eine unverwüstliche Pslanze unter den Dauer-
plumbaginoides. Glänz. frischgrüne Belaub., enzian-	blühern des Steingärtchens, goldgelbblühend. 20 cm 0.40
blaue Sternblum. i. groß. Masse. 20 cm. VII-IX 0.50	— gracilis. Besonders feinblättrig und feinblütig.
Chaenorrhinum. Siehe Linaria.	20 cm. Selten
Cherleria. Siche Minuartia. Chiastophyllum, Goldtröpfchen, Crassulaceae ○-••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Lerchensporn gleichend, nur mit gelblichweißen
— oppositifolium (Cotyledon simplicifolia). Fleischige,	Blüten. 20 cm
sedumartige Blätter und gelbe Blüten in zierlich	Cotula, Fiederpolster, Compositae ○ - ①
überhäng. Rispen. Sehr schön. 20 cm. VI-VII 0.50	bildend. Weiße Blütchen VI-VII 0.30
Chrysanthemum, Alpenwucherblume, Compositae	— squalida. Hübsche moosartige Polster bildende Pflanze
- alpinum. Polsterbildende Alpenpflanze mit weißen	mit feingefiederter, braungrüner Belaubung 0.30 Cotyledon, Nabelkraut, Crassulaceae ○ - ① △
Margueritenblumen. 15 cm VI-VII 0.70	- chrysantha. Graugrüne, hauswurzähnl. Blattrosetten
arcticum. Frischgrüne dickfleischige Blätter, sehr schöne, große, weiße Margueritenblumen. Der spä-	mit grünlichgelben Sternblumen. 15 cm. VII-VIII 0.40 — simplicifolia. Siehe Chiastophyllum.
ten Blüte wegen sollte diese Psanze in keinem Stein-	sempervivoides. Große grüne Rosett., rosarote Blüt.
garten fehlen. 30 cm IX-XI 0.40	10 cm VII-VIII 0.60
— atratum. Aehnlich Chr. alpinum, jedoch viel leichter gedeihend. Blätter dicklich kahl, dunkelgrün, mit	— spinosa. Eigenartig schöne, hauswurzähnliche Pflanze mit blaugrünen Blättern u. fester, kugeliger Winter-
3-7 Lappenzähnen. Bildet dichte, frischgrüne	rosette. Grünlichweiße Blumen in dichter, ähren-
Polster. Blumen weiß. 20 cm VII-VIII 0.50	artiger Rispe. 30 cm VII-VIII 0.50
— millefoliatum. Starkgesiederte, graugrüne Belaubung, gelbe Blütenköpfe. 30 cm VI-VIII 0.60	Crepis, Pippau, Compositae O A
- olivanum. Hübscher Bastard zwischen Chrysanthe-	Blüten. 20 cm
mum arcticum und montanum, dessen große weiße	Crucianella, Riesenwaldmeister, Rubiaceae ○- → △
Blum, sehr frühzeit, erscheinen, 30 cm. VI-VII 0.60 Zawadskii. Gezackte Blätter, große rosa Blüten.	- stylosa. Kriechende Pflanze mit waldmeisterartiger
20 cm VI-VII 0.50	Belaubung, rosa Blütchen. 25 cm V-VII 0.40 — rubra. Siehe Neuheiten
Chrysogonum, Goldkörbchen, Compositae ○ △	Cyanthus, Blauröhre, Campanulaceae ○ △ △
virginicum. Die gelben Blütenköpfehen vereinigen sich zu kleinen Rispen. 30 cm VI-IX 0.70	- lobatus. Niederliegende Pflanze, lilablaue Röhren-
Chrysopsis, Goldaster, Compositae $\bigcirc \bigcirc \triangle$	blüten, nur für warme Lagen, 10 cm VII-VIII 0.60 — incanus. Mit veilchenblauen Blum. 10 cm VII-VIII 0.70
- villosa Rutteri. Mit gelben Strahlenblüten und grau-	Cyclamen, Alpenveilchen, Primulaceae O-1 A
grüner Belaubung. 20 cm VI-VIII 0.50	Knollenbild. Gewächse mit rundl. oder efeuähnl.,
Chrysosplenium, Goldmilz, Saxifragaceae ○-① ≅ ⊕	meist marmoriert. Laubwerk u. veilchenähnl. Blüt. Lieben Waldhumusboden u. geschützte Lag. 10 cm.
— rosulare. Saftiggrüne Polster mit gelben Blütendolden, geeignet für feuchte Lagen. 10 cm 1V-V 0.40	Atkinsii. Mit silbrigmarmorierter Belaubung und rosa
Circaea, Alpen-Hexenkraut, Onagraceae O-1 A	bis roten Blüten
- alpina. Frischgrüne Belaub. u. zahlreiche kleine weiße	— album. Weiße Abart mit rot. Schlund. III-IV 0.80 — cilicicum. Rosenrote Blumen IX-X 0.80
Blütchen. Boden-Deckpflanze. 30 cm. VI-VIII 0.40 Cirsium, Zwergdistel, Compositae $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \triangle$	— coum. Blätter oberseits einfarbig dunkelgrün, unter-
- acaule. Stark geschlitztes Laub und rote stengellose	seits rot. Blumen dunkelrot II-III 0.80
Blütenköpfe. 20 cm VII-VIII 0.50	— europaeum. Das bekannte reizende, rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges VIII-IX 0.50
Clematis alpina. Siehe Schlingpflanzen. Commelina dianthifolia. Siehe Neuheiten 1.—	— ibericum. Mit runden, silbrig gezeichneten Blättern
Convallaria, Maiglöckcken, Liliaceae () – ● X	und roten Blüten III-IV 0.60
- majalis grdfl. Die Glocken u. Stiele sind doppelt so groß	— neapolitanum (hederaetolium). Efeublättrige Art,
wie bei der gewöhnl. Maiblume. 20 cm V Pflanzkeime 0/0 RM 6.— Ballen 0.40	— repandum (vernum). Dünne, herzförmige, etwas ge-
— flore pleno. Gefülltblühende Form. Selten : 0.70	zackte Blätter. Blumen leuchtend karmin mit weit
— — rosea. Rosablühende Form. Selten 0.70	vorstehendem Griffel und Staubfäden III-IV 0.80

Cv	pripedium, Frauenschuh, Orchidaceae 🕽 🛆 1 St.	D ' 11 (D	1 St.
_	calceolus. Prächtige, frauenschuhähnliche, rotbraune	Dianthus (Fortsetzung)	RM
	Blüten mit hellgelber, rot punktierter Lippe.	- suavis. Blendendweiße Blumen. 25 cm	
	Liebt humosen Boden. 30 cm V-VI 1.50	- subacaulis. Feste Polster, kleine rosa Blüten. 10 cm	
De	Iphinium, Zwerg-Rittersporn, Ranunculaceae ○△	- vaginatus atrorubens. Glühendrote Knäuelblumen	
-	grandiflorum chinense Tom Thumb. Leuchtend blau,	auf festen Stengeln. 30 cm	
	sehr reichblühend. 30 cm VI-VIII 0.40	15 cm	
	nudicaule. Prächtig granatrot. Sehr reichblüh. 30 cm 0.60	- zonatus. Große Rasen bildende Art, weiß. 30 cm	
Di	anthus, Felsennelke, Caryophyllaceae ○ △	Dianthus plumarius fl. pl. ○ # X □ Gefülltblüh., wohl-	
	Niedrige, meist polsterbildende Gewächse mit	riechende Federnelken. Liefern sehr feines Schnitt-	
	grüner oder blaugrüner Belaubung und prächtigen	material und sind sehr beliebte Einfassungsstauden.	
	wunderbar duftend. Blüt. Dürfen in keinem Stein-	20-30 cm	
	garten fehlen da sehr anspruchslos. V-VII	— — Alpha. Reinweiß, sehr großblumig, ganzrandig .	0.40
	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	Delicata. Seidenartig lila mit heller Cremetönung	
N Printers	20 Sorten	— — Diamant. Großblumig, weiß	
	alpestris. Graugrüne Polster bildend, weißlichrosa, geschlitzte Blüten. 20 cm 0.40	Erfolg. Die Blumen stehen aufrecht und meist ein-	
	alpinus. Karminrote Alpennelke, sehr großblum. 10 cm 0.60	zeln auf kräftigen Stielen, lilarosa	
-	anatholicus. Rosafarbige Blüten. 15 cm 0.40	— Excelsa. Großblumig, rosa	
-	arenarius. Rasenbildend, rosa Blüten. 20 cm 0.50	— Fleur de May. Leucht, rosarotblühend. Sehr früh — Gloriosa. Lilarosa, großblumig	
***********	brevicaulis. Kurzstengelig, weißblütig. 10 cm 0.40	— Her Majesty. Reinweiß	0.40
100000	caesius carminatus. Leuchtend karmin. 20 cm 0.60	— — Maischnee. Früh, weiß	
	- compactus. Dichte Polster bildende Form, mit	- Marktkönigin. Silbergraue Belaubung, große	
	großen rosa Blüten. 10 cm	weiße Blumen	
-	- hybridus. Rosa od. rote Blüt. in groß. Masse. 20 cm 0.40	— — Mrs. Sinkins. Weiß mit grünlicher Mitte	
	— Leuchtfeuer. Mit großen, einfachen, weithin leuchtenden, purpurroten Blumen. 30 cm 0.70	— — Nobel. Großblumig, weiß, platzt nicht	
	— lilacinus. Siehe Neuheiten	— Purpurkönigin. Ungewöhnlich kräftig hohe Stiele,	
	robustus splendens. Siehe Neuheiten 0.80	purpurrote Blumen	
-	splendens. Mit leuchtend rosaroten Blüten. 20 cm 0.50	— Roter Vorbote. Rot, sehr frühblühend	
-	carthusianorum. Langstielig, Blum. leucht. dunkelrot 0.40	— Rotkäppchen. Streng aufrechtwachsend, von	
-	corsicus. Schöne Teppiche bildend, rosa blühend 0.50	schöner, roter Farbe	
	deltoides. Mit niederliegenden Zweigen u. blutroten	starkwüchsig	
	Blüten. 20 cm	Saxonia. Prächt. purpurrote Blum. auf kräft. Stiel.	
	- albus. Weißblühende Form der vorigen. 20 cm . 0.40	— Schöne von Prag. Großblumig, rosa	
	- Brillant, Leuchtend karminrote Blumen, 20 cm . 0.40	- Thomsons Frühe. Elsenbeinweiß, sehr frühblühend	
-	ragrans. Gefranste weiße Blüten. 20 cm 0.40	scoticus. Einfachblühende Federnelke, feinstes	
-	furcatus. Reiz. kleine ganzrandige weiße Blüten. 20 cm 0.50	Farbenspiel	0.30
-	glacialis Freynii. Herrliches Zwergpolster, vielblütig,	Dicentra (Dielytra) Herzblume, Papaveraceae () 🛆	
	rot10 cm	— eximia, Gesiedertes Blattwerk m. rosasarbenen Blüten.	
-	- neglectus. Hübsche Alpenpslanze mit leuchtend	30 cm VI-VIII	
	karminroten Blumen. 15 cm 0.50	— formosa. Mitrosa Herzblüten. 30 cm hoch. VI-VIII	0.50
-	giganteus. Besond. starkwüchs., rosarote Blum. 30 cm 0.40	Dodecatheon, Götterprimel, Primulaceae () \triangle	
-	granificus. Ähnlich "deltoides" mit karminroten Blüten 0 40	- Jeffreyi. Großblum. als nachsteh. 30 cm. V-V1	0.60
-	juniperifolius. Stachelige Polster, lilarot. 20 cm 0.40	— meadia. Breit lanzettliche Belaubung, cyclamenartige	
	Knappii. Gelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.60	Blumen auf kräft. Kandelaberdolden. Nach dem	
-	Lerechii. Kleine, rosarote Blüten. 5 cm 0.60	Verblühen zieht die Pflanze ein. 30 cm. V-VI	0.60
-	macrodemus, Starkwüchsige Art. Blüten weiß. 20 cm 0.40	Douglasia (Aretia) Goldprimel, Primulacea O-D A	
-	microlepis. Niedrige Art mit roten Blüten. 10 cm . 0.50	Sie gehören zu unseren schönsten, nicht schwierig zu haltenden Hochalpinen. 5 cm IV-V	
-	Musalae. Dichtrasig, aufsitzende rote Blüten. 10 cm. 0.50	- cinerea. Aschgraue Zwergpölsterchen, gelbblühend.	0.70
_	nardiformis. Nadelförmig silbergraue Blättchen, lila-	— praefusiana. Silberblättrig, goldgelb	
-	rosa Blüten. 20 cm. Selten 0.80	- Vitaliana. Dunkelgrüne Polster, goldgelb	0.60
_	nitidus. Flache Polster, dunkelrosa. 10 cm 0.60	Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○ △ Niedrige	
	Blumen. 10 cm 0.60	grüne oder graugrüne Rasen bis kleine Rosetten	
	pelviformis. Kleine leuchtend rote Blütchen. 30 cm . 0.40	bildende Gewächse mit doldenartigen Blütenträub-	
-	petraeus. Blaugrüne Polster bildend, tiefgeschlitzte,	chen im zeitigen Frühling. 5-10 cm III-IV	
	zartrosa Blüten. 15 cm	aizoides. Kleine Rosett., lineale Blättch. Blüt. goldgelb	0.50
-	pruinosus. Wohlriechend, rasenbildend, weiß. 25 cm 0.40	— aizoon. Spitzblättrige Rosett., sehr früh, goldgelb blüh.	
	pungens. Blaugrüne Polst., weiße geschlitzte Blum. 25cm 0.50	- argaea. Weichhaariges Pölsterchen, gelbblühend	0.40
-	rupicola. Schöne, rundliche Polster, rosabliih. 15 cm 0.40	- ciliata. Kleine Rosettenpolster, weißblühend	
	sanguineus. Blutrote Blüten. 30 cm 0.50	— diversifolia. Lockerrasige Kugelrosetten, gelb	0.40
	silvestris. Schöne Steinnelke, rot. 25 cm 0.60 — frigidus. Zierliche Art mit rosa Blüten. 10 cm 0.50	— Dedeana. Kleine Polster, weiß	0.40
-	Spiculifolius. Kräftige Polster mit seinzerteilten weißen	— repens. Kriechende Art, gelbe Blüten	0.40
	Blüten. 25 cm 0.50	- rigida (dicranoides). Schöne Zwergpolster, goldgelbe	00
	spinosus. Spitzstachel. Blättch., rote Knäuelblüt. 20 cm 0.50	Blütchen	0.50
	Sternbergii. Seegrüne Belaubung. Blumen federig,	- Salomonii. Zwergige Polster, Blüten weiß	
	rosarot. 20 cm		0.50
	strictus (integer). Blaugrüne Polster mit reizenden,	- streptocarpa. Breite Blättchen, dunkelgelbe Blüten	
	ganzrandigen weißen Blütchen. 15 cm 0.50	- Sündermannii, Schöne grüne Polster, weißblühend	0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Erigeron (Fortsetzung) — grandiflorus Siehe Aster Andersonii RM
Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae ○ △	granding as. Siene Hatel Hillersolli.
- botryoides. Aschgraue Blätter, Blüten rosa. 20 cm 0.60	- leiomerus. Man glaubt eine ganz niedliche, kleine
- nutans alpinum. Niedrige Büsche, Blum. tiefblau. 20 cm 0.60	Alpenaster zu sehen. Die Blütchen sind zartblau.
- Ruyschianum. Schmallanzettl. Blätter, blaue Blüten in	20 cm VI-VII 0.50 — salsuginosus. Ähnl. E. glabellus, jedoch mit kleineren
groß. Fülle, gut. Dauerblüher. 30 cm. VI-VIII 0.40	Blüten und Blattwerk. 20 cm VI-VIII 0.50
Dryas, Silberwurz, Rosaceae ○ △ ⊕ Halbholzige Pflanze mit kleinen, gekerbten Blättchen und anemone-	- trifidus. Die graugrünen Blättchen sind fein zerschlitzt,
artigen Blumen. Überzieht ganze Felsen. Liebt	die Blütchen blau mit gelber Mittelscheibe. Eine
feucht humosen Boden. Unbedingt eine der schön-	reizende Alpenpflanze. 10 cm V-VI 0.70
sten Alpenpflanzen, 10-15 cm V-VIII	Erinus, Leberbalsam, Scrophulariaceae ○-D △ II
- Drummondii. Weißwollige Blattunterseite. Blüt. gelb 1	Uberaus anspruchsloses und zierliches Pflänzchen
— grandiflora. Großblumig, gelb 1.50	mit dunkelgrünen Blättchen und 10-15 cm hohen
- octopetala. Mit großen weißen Sternblumen, schön	Lippenblütenrispen V-VII
federige Samenstände im Herbst 0.60	— alpinus. Dichte Polster von roten Sternblüten 0.40
— robusta. In Belaubung u. Blüten bedeutend größer	— albus. Weißblühend
als vorige. 20 cm	— Olivanus. Leuchtend karminviolett 0.60
— lanata. Silbrigbehaarte, besonders reichblühende Abart der vorigen mit weißen Blüten 0.80	Eriogonum, Wollknöterich, Polygonaceae ○ ∞ △
— minor. Dichtlaubige und sehr zierliche Zwerg-	— James II. Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits
form. Sehr selten	silbrigen Blättern und 10 cm hohen goldgelben
— — vestita. Filzig behaarte Zwergsorte, weißblühend 1.—	Blütendolden VII-IX 1.20
— Sündermannii. Großblumig, weiß, halbgefüllt 0.60	- racemosum. Silbergraublättrige, aufrechtwachsende
- tenella. Schr seltene Zwergform, weißblühend 1.20	Art mit rosa Blüten. 20 cm VII-IX 1.20
Edraianthus, Büschelglocke, Campanulaceae ○ △	- umbellatum. Der vorigen ähnlich, jedoch mit gelblich-
Glockenblumenartige Pflanzen von niedrig. Wuchs	weißen Blütendolden VII-IX 1.20 Eriophorum. Siehe Ziergräser.
und großem Blütenreichtum. 10-15 cm V-VII	Eriophyllum, Wüstengoldaster, Compositae $\bigcirc \bigcirc \triangle$
dalmaticus, Dunkelpurpurne Blüten 0.60	- caespitosum. Silbergraue Belaubung und goldgelbe
— dinaricus. Silbergraue Polster, mit dunkellila Blüten 0.60	Coreopsis ähnliche Blüten während des ganzen
— graminifolius. Fingerlange grasartige Blätter und leuchtend blaue Blüten 0.60	Sommers, 20 cm VI-VIII 050
- intermedius. Dichte, silberblättrige Zwergpolster,	— Janatum, Siehe Bahia.
Blumen leuchtend blau. 5 cm 0.60	Erodium, Reiherschnabel, Geraniaceae ○- □ △
- pumilio. Noch niedriger wie die vorhergehende 0.60	Fast den ganzen Sommer blühende Staude mit zer-
- serpyllifolius. Dichte, dunkelgrüne Rasen mit tief blau-	schlitzter Belaubung u. geraniumähnlichen Blüten.
violetten Blüten 0.60	Sehr anspruchslos. 20-30 cm V-VIII
- tenuifolius. Steifgewimperte Blätter u. leuchtend blaue	 absinthioides (Sibthorpianum). Schöne Polst., rotblüh. 1.— amanum. Graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen 0.60
Blüten auf langen Stielen 0.60	- chamaedryoides. Zierl. Art m. leuchtend rosa Blüten 0.60
Epilobium, Weidenröschen, Oenotheraceae O- DA La Hectori. Mit bräunlichen kleinen Blättchen und weißen	- cheilantifolium. Weiß mit schöner dunkler Zeichnung 0 80
Blütchen. 5 cm VII-VIII 0.40	- chrysanthum. Schwefelgelb. Blüt.m. rostrot. Staubbeut. 0.80
Fleischeri. Schmallanzettliche Blättchen, rosarote	— macradenum. Kleinbleibende Art mit dunkel gezeich-
Rispen. 20 cm VII-IX 0.60	neten lilarosa Blumen 0.50
Epimedium, Sockelblume, Berberidaceae () 🛆	- Manescavii. Mit großen rosafarbigen Blumen 0.60
Bildet dichte Büsche mit äußerst haltbaren, fast	— seseliflorum. Schöne aparte Blüten 0.60 Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ∞ △ x
immergrüner, gesiederter Belaubung und zierlichen	Bourgatii. Stark zerteilte, weiß geaderte ornamentale
Blütenrispen, die vielfach an tropische Orchideen	Blätter, blaue Blütenstände. 40 cm. VII-IX 0.60
erinn. Liebt feucht humos. Bod. 20 cm IV-VI — alpinum. Violettrote Blumen, Blätter schön bronzerot 0.50	- maritimum. Silberweiße, stachelig gezähnte, ornament.
bicolor. Zweifarbig rot und gelb 0.50	Blätter u. Blütenstände. Echte Stranddistel. 40 cm 0.60
— diphyllum. Länglich herzförmige Belaubung und bläu-	— Siehe auch mittelhohe Stauden.
lichweiße Blüten 0.60	Erysimum, Scheindotter, Cruciferae ○ △
- hexandrum (Vancouveria). Sehr starkwiichsig, zier-	- Kotschyanum. Sehr schöne, goldgelbe Zwergsorte.
lich belaubt und weiße Blüten 0.50	Silbergraue Blättchen. 5 cm V-VI 1.—
ilacinum. Lilablühend 0.50	ochroleucum (helveticum). Kräftige Büsche bildend,
macranthum, Mit schön geformten groß, weiß. Blüt. 0.80	gelbblühend. 30 cm V-VI 0.60
- niveum. Weiß, frühblühend, niedrigste Art 0.50	— pumilum. Hübsches Felsenpflänzchen mit goldgelben Blüten. 20 cm V-VI 0.60
— violaceum. Lilablühend 0.50 — Musschianum. Niedrig, weißlichrosa 0.50	- rupestre aurantiacum. Prächtige, orangefarbene
— pinnatum elegans. Lebhaft gelbblühend. Prachtvolle	Blüten. 20 cm V-VI 0.50
großblumige seltene Art 0.70	Euphorbia , Wolfsmilch, Euphorbiacea ○ ∞ △
- rubrum. Rot mit weißer Mitte 0.50	- capitulata. Kriechende, kissenbildende Alpine, Blüten
— — coccineum. Mit roten Blüten	goldgelb. 5 cm V-VI 0.60
— sulphureum. Schwefelgelb blühend 0.50	- cyparissias. Nadelartige Belaub., Blüten gelb. 30 cm 0.40
Eranthis, Winterling, Ranunculaceae O- A	— epithymoides (polychroma). Siehe mittelh. Stauden.
- hiemalis. Reizender Vorfrühlingsblüher mit gelben	— myrsinites. Niederlieg., silbergraue diddliche Blätter u. gelbe Blütendold., auffall. schön. 20 cm V-VI 0.60
Schalenblüten. 5 cm II-III 0.40 Erica. Siehe Heidekräuter.	gelbe Blutendold., auffall. schön. 20 cm V-VI 0.60 rigida. Im Habitus E. myrsinites ähnlich, jedoch auf-
Erigeron, Berufskraut, Compositae ○ △	rechtwachsend u. höher werdend. Blume goldgelb,
— aurantiacus. Mit orangekupferfarbigen Strahlenblüten.	Belaubung immergrün, graublau. 30 cm V-VI 1.50
30 cm VI-VII 0.40	Evonymus radicans. Siehe Zwerggehölze.
— glabellus alpinus. Mit intensiv blauen Blüten.	Festuca. Siehe unter Ziergräser.
30 cm V-V1 0.40	Frankenia laevis. Siehe Neuheiten 0.80

Frankenia (Fortsetzung)	Geranium cinereum subcaulescens (Fortsetzung)
- thymifolia. Siehe Neuheiten	——— splendens. Zeichnet sich durch besonders
Gaillardia, Kokardenblume, Compositae O ∞ \wedge	auffallende Färbung aus. Die Blumen sind leuch-
- hybr. nana Colibri. Kugelförmige, dichte, kleine Büsch-	tend reinkarminrot
chen, Blüten rot mit gelb. 30 cm. Sommer VII-IX 1.— Galax, Bronzeblatt, Diapensiaceae △	 Endressii. Niedrig bleibende rosablühende Art 0.40 grandiflorum, Tiefviolettblau, sehr großblumig und
- aphylla. Liebt frischlumosen Boden. Lederartige, herz-	reichblühend
förmige, immergrüne Belaubung mit prächtigen	- fl. pl. Siehe Neuheiten 0.80
rosaweißen Blütenähren. 25 cm V-VI 3.—	 hybr. Russel Prichard. Siehe Neuheiton 0.80 ibericum platypetalum. Von leuchtend blauvioletter
Galium, Labkraut, Rubiaceae () - ● △ △ — cinereum. Silbergraue Blättchen und gelblichweiße	Farbe. Eine der schönsten
Blüten. 10 cm VI-VIII 0.60	- macrorrhizum. Großblumig, blutrot 0.40
- helveficum. Schöne kleine Polster bildend, gelb-	— pratense album. Weißblüh. Wiesenstorchschnabel. Bis 40 cm hoch werdend 0.50
blühend. 10 cm VI-VIII 0.70 incanum. Schöne graugrüne Polst. 10 cm VI-VIII 0.70	- sanguineum. Dunkelgrünes Laub, Blumen leuchtend
ochroleucum. Waldmeisterartige Belaubung, zahl-	dunkelkarmin
reiche Rispen hellgelber Blütch. 20 cm VI-VIII 0.50	— lancastriense. Kriechende Art mit rosa Blüten . 0.50
Genista. Siehe unter Felsensträuchern.	— sylvaticum. Lilarote Blüten
Gentiana, Enzian, Gentianaceae O-D A Herrliche, reichblühende Pflanzen von verschiedenartigem	— albiflorum. Kräft, Büsche bildend. Weiße Blumen 0.50
Charakter, die in keinem Garten fehlen sollten.	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ △ ≅ — hybr. Gladys Perry. Siehe Neuheiten 1.20
Sie lieben alle feuchten, lehmigen oder moorigen	— montanum. Immergrüne Belaubung. Leuchtend gelb,
Boden. 10 – 30 cm. Frühling-Spätsommer. Siehe auch halbhohe Stauden.	großblumig. 30 cm V-VI 0.40
- acaulis. Mit großen, glockenförmig., tiefdunkelblauen,	— aurantiacum. Hübsch, goldorange, Hybride von Geum Heldreichi. 30 cm V-VI 0.40
aufrechtstehenden Blüten. 15 cm V-VI 0.70	Rossii. Feingestederte Belaubung, leuchtend gelbe Blü-
— angustifolia. Schmaleliptische Blätter und große hellblaue Blumen. 10 cm V-VI 1.—	ten. 20 cm V-VI 0.50
- Clusii. Ähnlich G. acaulis jedoch mit bedeutend kräf-	— triflorum. Interessante rosenrote Blüten mit zierenden Samenträgern. 20 cm. Selten V-VI 0.50
tigerer Belaubung und riesiggroßen, aufrechten, leuchtend blauen Blüten. Sehr gut gedeihend und	Siehe auch mittelhohe Stauden und Neuheiten.
außerordentlich reichblühend. 10 cm. V-VI 1.—	Glechoma, Gundelrebe, Labiatae → ♠ △ △ — hederaceum fol. var. Eine weißbunte Form der be-
Cruciata. Vielblütig, blau. 20 cm VII-VIII 0.50	kannten, heimischen Gundelrebe. Sie ist sehr wert-
dahurica. Großblumig, dunkelblau, lanzettliche Belaubung. 30 cm VIII-IX 0.80	voll, besonders dadurch, daß sie tiefen Schatten
decumbens. Hellbl. Büschelblüten. 30 cm VII-VIII 0.70	verträgt. Herznierenförmige Blätter u. hellviolette Blüten. 10 cm IV-VI 0.40
depressa. Niederliegend, hellblau. 20 cm VII-VIII 0.70	Globularia, Kugelblümchen, Globulariaceae O-D \triangle
Farreri. Nadelförmige Blätter, hellblaue, hellgelb ge- streifte Blüten. 20 cm VIII-X 1.50	Dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immer-
Fetisowii. Hell- bis dunkelblau. 30 cm. VIII-X 0.50	grünen Blättchen und 10–20 cm hohen Kugelblümchen. Lieben frischen Boden V-VI
Freyniana. Ähnlich septemfida, glänzend dunkelgrüne Blätt., himmelblaue Knäuelblüt. 20 cm VII-IX 0.70	— angustifolia. Lanzettliche Blätt., dunkelblaue Blumen 0.50
Blätt., himmelblaue Knäuelblüt. 20 cm VII-IX 0.70 Kesselringii.Kräft.belaubt,weißblüh.30cm VIII-IX 0.50	— corditolia. Schöne Alpine mit hellblauen Köpfchen 0.50
Phlogitolia. Großbl., blaue Büschel. 30 cm VII-IX 0.70	— — alba. Blüten weiß
pneumonanthe. Lineales Laub, kornblumenblaue, langtrichterige Blumen. 20 cm VIII-IX 0.80	- incanescens. Sehr reichblumig, leuchtend blau 0.50
pterocalyx. Ähnlich Gentiana cruciata, jedoch mit	— nana. Zwergige Art, welche Felsen dicht überspinnt.
schmälerem Laubwerk u. aufrechten Blütenstengeln,	Kleine, blaue Blütenköpfchen 0.60 — trichosantha. Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue
die dicht besetzt sind mit leuchtend reinkornblumen- blauen Blüten. 30 cm. Selten VII-1X 1.—	Kugelblüten
semptemfida. Blaue Blumen mit hellerem Schlund	 vulgaris (nudicaulis). Großblättr., hellbl. Blütenköpfe 0.50 Willkommii. Rosetten bildend, große blaue Blüten 0 50
in starkem Knäuel. 15 cm VII-IX 0.60	Grafiola, Gnadenkraut, Scrophulariaceae $\bigcirc\cong$
lagodechiana. Auf 20 cm hohen Stielen stehen die hellblauen Knäuelblumen, die während des ganzen	— officinalis. Gegenständige, lanzettliche Blätter und
Sommers erscheinen. Eine der allerbest. u. schönst. 0.70	weiße Blüten. 20 cm VI-VIII 0.60 Gypsophila,
- cordifolia. Kräftigerer Wuchs als vorige. 15 cm 0,70 sino ornata. Ähnlich Farreri mit etwas gröberer Belau-	Schleierkraut, Caryophyllaceae 🔾 🗠 🗘 🕮 📙
bung, leucht. blaugrün gestreift. 20 cm. VII-IX 150 l	Die niedrigen Schleierkrautarten sind herrliche
Inianshanica. Vielgestaltige Art, bald hell-bald	Steingartenstauden mit kleinen, lanzettl. Blättern u. schleierartig. Blütenständen. 10-30 cm. V-V11
dunkelblau. 30 cm VII-IX 0.70 tibetica. Starkwüchsig, weiße Büschelblüten, groß-	Siehe auch mittelhohe Stauden.
blumig. 30 cm VII-IX 0.50	- aretioides. Zwergschleierkraut, ähnl. einer Androsace
Walujewi. Großblum., weißlichblau. 40cm. VII-IX 0.50	helvetica, m. weiß. Blüt. Bildet steinh. Polster. 5 cm 1.20 Bungeana. Überspinnt ganze Felsen, weißblüh. 10 cm 0.60
Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae O-D A	cerastoides. Mit behaarten Blättchen und großen
Nicht allein durch ihre Blüten, sondern auch durch ihr schönes Herbstlaub sich auszeichnende Staude	weißen Blüten mit violetten Adern. 15 cm 0.50
mit grundständigen, fünflappigen Blättern und	- curvifolia. Starre verzweigte Polster, weißblüh. 10 cm 1.— - hybr. fl. pl. Rosenschleier. Siehe Neuheiten 0.70
Hachen Blumen. 20–30 cm VII-VIII	— Ilbanofica. Mit zartrosa Blütchen. 15 cm 0.40
argenteum. Silberweißes Laub, rosablühend 0.60 armenum (psilostemon). Großblumig, karminrot 0.60	— repens. Kriechend, weißblühend. 10 cm 0.40 — monstrosa. Starkverzweigte Stiele reinweiß. Blüt.
Graugrunes Laub, rosa	Prächtige Pflanze für größere Felspartien. 30 cm 0.40
- subcaulescens. Leucht. purpurne. Blüt., sehr schön 0.60	- Purpusi. Breitblättrig, kriechend, weißblüh. 10 cm 0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung 1 St.	Heloniopsis, Sugerokia, Liliceae → - △ 1St.
- HM	Heloniopsis, Sugerokia, Liliceae → △ 1 St. — breviscapa. Japanische Art mit Rosetten frischgrüner
Gypsophila repens (Fortsetzung)	lanzettlicher Blätter, aus denen sich Blütenstiele
— rosea. Reizende zartrosa Blütenrispen. 10 cm 0.40 — reptans (prostrata) rosea. Ähnlich voriger, jedoch	mit rosa Glocken erheben. 15 cm IV-V 1.—
schmäleres Laubwerk. Auch im Wuchs ist sie	- japonica. Wintergrüne Rosetten mit großen, finger-
lockerer. Blüten rosa. 15 cm 0.40	breiten, lanzettlichen Blättern. Rosa Blütenrispen.
— Sündermannii. Kräftig wachs., mit weiß. Blütenrisp. 0.40	20 cm IV-V
transylvanica. Mit weißen Blüten. 10 cm 0.50	Hepatica, Leberblümchen, Ranunculaceae
Haberlea, Gesneriaceae ↑ △	Drei- oder fünflappige, lederartige, fast immergrüne Blätter u. anemoneartige Blüten im zeitig. Frühjahr.
— Ferdinandi Coburgi. Dunkelgrüne Blattrosetten, mit	Sie verlangen frischen humosen Boden. 10-15 cm.
kleinen, hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten Standort, mögl. an absonnig. Fels. 10 cm VI-VII 1.50	angulosa. Fünflappige Blätt. u. große hellblaue Blüt. 0.60
- rhodopensis. Ähnlich der vorhergehenden, mit etwas	alba. Großblumig, weiß, einfach 0.70
größeren Blüten. 10 cm V-VII 1.20	— rosea. Großblumig, rosa, einfach 1.—
Hacquetia , Schaftdolde, Umbelliferae $\bigcirc - \bigcirc \triangle \cong$	- triloba. Dreilappige Blätter u. leuchtend blaue Blüten 0.40
epipactis. Reizende Pflanze für humosen Boden mit	— — plena. Blau, gefüllt
gelappten Blättern und gelben Blütendolden in grüner Hülle. 10 cm IV-V 0.60	— — plena. Weiß, gefüllt
grüner Hülle. 10 cm	- rubra (rosea). Rosarot, einfach 0.60
Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae ○ ∞ △ :	— — piena. Rotblühend. Stark gefüllt 0.80
Niedrige, holzige Gewächse mit lanzettlichen Blätt-	Herniaria, Tausendkorn, Caryophyllaceae O A A
chen und kleinen, wildrosenartigen Blüten in großen	— caucasica. Groblaub., frischgr. Rasen bild. V-VI 0.40
Massen. Sie gehören zu den besten Steingarten-	— glabra. Frischgrüne, kleine rundliche Belaubung,
pflanzen. 10−20 cm V1-VIII — alpestre serpyllifolium ⊥ Bildet dichte Teppiche.	weiße Blüten V-VI 0.40 gracilis. Mit zierl. Belaub. u. weiß. Blütch. V-VI 0.40
Blüten goldgelb. 5 cm 0.50	Heuchera Purpurglöckschen Savifranzassa 0 0.40
— apenninum roseum (polifol.roseum). Schöne kupfrig-	Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae O- \(\Delta \) \(\text{-} \) arizonica. Frischgrüne, gezackte Blätter, Blütchen weiß.
rosa Blüten 0.40	25 cm. Selten! VI_VII 0.70
— — carmineum (rhod. carmin). Silbergraue Belaub.,	rubescens. Zierliche alpine Art mit weißen Blitten-
Blüten leuchtend rosenrot	glock then u. rotl. Blutenstengeln 25 cm V.VII 0.70
 chamaecistus (vulgare). Goldgelbe, einfache Blüten 0.40 hyssopifolium. Scharlachzinnoberrot, einfach 0.40 	Hieracium, Habichtskraut, Compositae O ∞ \triangle
hybr. album oculatum. Einfach, weiß mit gelb. Auge 0.40	- aurantiacum. Tieforange Blüten. 30 cm. VII-IX 0.40 bombycinum. Weißwollig behaart und gelbblühend.
— — pl. Weiß, gefülltblühend 0.40	50 cm V_VIII 0.50
— Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte 0.40	— dentatum (marmoratum). Kräftig wachsend weiß-
- aurantiacum plenum. Orangefarben, gefüllt 0.40	filzig, gelbe Bluten. 40 cm. VI.VII 0.40
— — Ben Dearg. Großblumig, karminrot 050 — — Ben Lui. Großblumig, dunkelkarmin 0.50	- intybaceum. Graugrüne, stark behaarte Belaubung
Ben More. Siehe Neuheiten 0.80	und goldgelbe Blüten. 20 cm VI-VII 0.40 — lanatum. Weißwollig behaart mit gelben Blüten.
— Ben Nevis. Siche Neuheiten 0.80	50 cm VI-VII 0 40
— Ben Venue. Siehe Neuheiten 0.80	racemosum (crinitum). Goldgelbe Blitten 10 cm 0.30
— Blutströpfchen. Siehe Neuheiten 0.50 — Bronce. Bronzefarben, einfachblühend 0.40	- rubrum. Leuchtend orangerot. 20 cm. VI-VIII 0.40
— coccineum pl. Dunkelrot, gefüllt 0.40	- villosum. Zottig behaarte Blätter, gelbe Blüten.
Die Braut. Sehr großblumig, weiß 0.40	Homogyne, Alpenlattich, Compositae () – () ≅
- Fire flame. Leuchtend karminrötlich mit orange,	- alpina. Immergrüne, lederartige Belaubung und trüb-
nach der Mitte zu in gelb übergehend, großblumig 0.50	rote Blütenköpfchen. 10 cm VII-VIII 0.00
— Gelbe Perle. Gelb gefüllt blühend 0.40 — Golden Queen, Großblumig, einfach, goldgelb . 0.40	norminum, Drachenmaul, Labiatae () — () \
— Golden Queen. Großblumig, einfach, goldgelb . 0.40 — Goldlachs. Siehe Neuheiten 0.80	pyrenaicum. Mattgrüne, große Blattrosetten, aus denen sich die mit blaulila Lippenblüten besetzten
— Lachskönigin. Leuchtend lachsrosa, einfach 0.40	Stiele erheben. 15–20 cm V-VI 0.40
— — Rosa Königin. Großblumig, einfach, rosa 0.40	rubrum. Rötlich blühende Abart, mit etwas größeren
- Sunbeam. Einfach großblumig, leuchtend gelb . 0.40	Blumen. 15-20 cm
— Watergate Orange. Siche Neuheiten 0.60 	Houstonia, Tausendsternchen, Rubiaceae () - A A
Belaubung und gelben Blüten 0.50	- coerula alba. Weißblühend. 10 cm V-VI 0.50 - superba. Leucht. dunkelbl. Blüt. 10 cm. V-VI 0.50
oelandicum & Einfach gelb, niedrigstes von allen, 5 cm 0.50	- superba. Leucht. dunkelbl. Blüt. 10cm. V-VI 0.50 - serpyllifolia. Mit kleinen runden Blättchen und einer
Helichrysum, Strohblume, Compositae ○ ∞ △	Fulle klein., lichtblauer Blümch. 10 cm. V-VI 0.40
— bellidioides. Kriechende Strohblume mit klein. weißen	Hutchinsia, Gemskresse, Cruciferae O - O A
Blüten. 10 cm VII-VIII 0.50 Heliosperma. Siehe Silene.	alpina. Krause, zierliche Pflanze, die zahlreiche Dolden
Helleborus, Christrose, Ranunculaceae () - • X -	kleiner weißer Blütchen bringt. 10 cm. V-VI 0.40 - Auerswaldii. Zierlicher als die vorhergehende, groß-
foetidus. Laub lederartig dunkelgrün, d. größt. Kälte-	blumig weiß. 5 cm V-VI 0.40
graden trotzend. Blüt.grünlichgelb. 30cm II-III 0.60	Hypericum, Hartheu, Guttiferae O-1 A Kleine rund-
Hybriden. Vereinigen die schönsten Farbentone in	liche Busche mit meist nadelartigem Laubwerk und
sich : rot, rosa, weiß, punktiert, geadert usw., groß-	wildrosenartigen, gelben Blüten während des ganzen
blütig. 30 cm	Sommers VI-VIII
niger. Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendend	- calycinum. Großblumig, goldgelb, ähnlich einer Wild- rose, immergrünes, breites, lederartiges Laub. 30 cm 0.60
weiße Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten	— cons (emperitonum). Dunkelgrüne, erikaartige Be-
schon im Freien erscheinen. 30 cm XII-III 1	laubung mit gelben Sternblüten. 10 cm 0.50
— macranthus. Die schönste und großblumigste aller	Degenii. Silbergraue rundliche Blätter, mittelgroße.
Christrosen für den Weihnachtsflor . XII-III 1.20 I	gelbe Blumen. 30 cm 0.40

Hypericum (Fortsetzung)	Iris (Fortsetzung) 1 St. R.M.
fragile. Nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb. 15 cm 0.40	— serbica. Ahnlich pumila, mit großen lichtgelben
nummulariifolium. Reizende Art mit rötlich austreibenden Blättchen und goldgelben Blüten. 15 cm 0.70	Blüten. 20 cm
olympicum. Nadelförmiges Blattwerk und schalen-	Selten
förmige, goldgelbe Blüten. 15 cm 0.40 — polyphyllum. Reizende, kleine, gelbblüh. Art. 10 cm 0.40	lris pumila ○ △ : Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris
grandiflorum. Siehe Neuheiten 0.70	von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. 15 cm
repens. Niederlieg., kleine Zweige, gelbblühend. 10 cm 0.50	— — atropurpurea. Dunkelviolettpurpur 0.40
reptans. Kriechende Form mit goldgelben Blüten. 5 cm 0.50 rhodopaeum. Ein aus dem südlichen Macedonien	— — atroviolacea. Tiefviolett
stammendes Zwerghartheu mit großen, goldgelben	— — coerulea. Himmelblau
Blütensternen. Große silbergraue Polster bildend. 0.70 Hypsella longiflora. Siehe Neuheiten 0.80	— cuprea. Kupfrig mit gelber Zeichnung 0.40
Hyssopus. Siehe mittelhohe Stauden.	— — nova candida. Rahmweiß 0.40 — — sulphurea. Schwefelgelb 0.40
Iberis, Schleifenblume, Cruciferae ○-() △: : Immer-	— — velutina. Dunkelsamtblau 0,40
grüne Gewächse mit kleinem, lederartigen Blatt- werk und schneeweißen Rosettenblüten in großer	lris pumila hybrida ○ △ : Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germVarietäten entstanden. Sie
Menge. Sie gehören zu den schönsten Einfaß-bezw.	blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila
Steingartenstauden IV-V	und haben einen süßen Wohlgeruch . IV-V
corifolia. Großblättrig, dunkelgrün. Blumen weiß, nicht verblauend. 30 cm 0.40	— — — citrea. Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronen- gelb mit leuchtend goldgelbem Bart. 30 cm 0.40
Perfection. Kompakte, gleichmäßige Büsche bil-	— — cyanea. Tiefultramarinblau. 30 cm 0.40
dend. Großblumig weiß. 20 cm 0.40 saxafilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten	— — Darmstadt. Siehe Neuheiten 0.60 — — Die Fee. Dom reinhellveildenblau, Hänge-
weiß, oft purpur überlaufen. 20 cm 0.60	blätter dunkelveilchenblau, 30 cm 0.40
sempervirens. 30 cm hohe Staude mit weißen Blüten 0.40 — nana. Zwergform von I. sempervirens, der sie	— — Die Braut. Dom reinweiß, Hängeblätter an- fangs mattrahmfarben, später weiß. 30 cm 0.50
sonst in allen Teilen gleicht 0.50	— — eburnea. Obere Blumenblätter reinweiß, untere
— Climax. Mit besond. großen weißen Blüten. 20 cm 0.40 — Elfenreigen. Große, weiße Blüten umstehen den	weiß mit creme Schattierung. 30 cm 0.40
kräftig. Stiel in überaus groß. Anzahl. Die massige,	— — excelsa. Blüte von ganz reiner, reich ocker- gelber Farbe. 30 cm
dunkelgrüne Belaubung gibt der Pflanze nach der	— — floribunda. Domblätt. cremegelb, Hängeblätter
Blütezeit eine besonders gute Wirkung. 20 cm 0.60 Schneeflocke. Große reinweiße Blütendold. 20 cm 0.40	etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert. 30 cm 0.40 — florida. Äußerst, reichblühend, zitronengelbe
- Weißer Zwerg. Dicht gedrungener Wuchs. Im	Farbe mit feinen Adern. 30 cm 0.40
Frühling bedeckt mit schneeweißen Blüten und im Sommer dichte saftiggrüne Belaubung. 10 cm 0.40	— — formosa. Obere Blumenblätter dunkelveilden- blau, die unteren penseeviolett. 30 cm 0.50
Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae O A	— — Jean Siret. Leuchtend gelb, außerordentlich
grandiflora. Dekorative, gefiederte Belaubung und große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit gol-	reichblühend und sehr gut remontierend. 30 cm. 0.60 — — Leander. Die Iris germanica-großen Blumen
denem Schlund. 20—30 cm VI-VII 0.50	sind reingoldgelb, sehr reichblühend. 30 cm 0.50
- brevipes. Starkwüchsiger als vorige und noch	— — Orange Queen. Große, orangegelbe Bliit. 20cm 0.60
intensiver rosenrote Blüten. 30–40 cm. VI-VII 0.50 hybr. Bees Pink. Siehe Neuheiten 1.—	Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten von Iris germanica-Größe. 30 cm 0.50
Siehe auch mittelhohe Stauden.	— — Souv. de Lt. Chavignac. Violett mit bronze-
Inula, Zwergalant, Compositae ○ △ — acaulis. Stengellose große gelbe Blüten. 5 cm.	farbigem Schein, sehr gut remontierend 0.60 Jankaea. Siehe Ramondia.
Selten VII-VIII 1.—	Jasione, Sandglöckchen, Campanulaceae ○ ∞ △
ensifolia. Kugelrunde Büsche bildend, mit klargelben	- humilis. Reizendes Felsenpflänzchen mit blauen Kugel-
Strahlenblüten. 20 cm VII-VIII 0.40 rhizocephala. Eigenartige Blattrosetten mit am Boden	blumen. 15 cm VII-VIII 0.80 — perennis. Länglich - lanzettliche Blätter und blaue
aufsitzend. gelben Blum. 20 cm. Selten. VII-VIII 1.—	Blüten in dichten Köpfchen. 30 cm . VII-VIII 0.50
Iris, Zwerg-Schwertlilie, Iridaceae ○ △ Verschiedene Arten:	Lamium, Goldnessel, Labialae → — galeobdolon luteum. Immergrünes, leicht geflecktes
Caespitosa. Hübsche, seltene, chinesische Zwergsorte	Laub, Blüten goldgelb. 20 cm V-VI 0.40
mit violetten Blumen. 15 cm V-V1 0.70	— florentinum. Stark weißgefleckte Belaubung, die sich im Winter noch rotbraun färbt. Die schönste
Cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten V-VI 1.—	Schattenpflanze für große Flächen V-VI 0.40
- Forresti. Mit grasartiger Belaubung und goldgelben	— maculatum argenteum. Eiförmige, weißgefl. Belaub.
Blüten in großer Fülle. 20 cm VI-VIII 0.80 gracilipes. Miniaturausg. v. Iris Kaempferi. Schmale,	und hübsche, rote Lippenblüten. 20 cm V-VI 0.40 Lathyrus , Frühlingswaldwicke, Leguminosae
grasartige Belaubung und hübsche, blaue Blumen	- vernus. Mit leuchtend karminroten wickenartigen
mit gelben Kämmen. 20–30 cm. Selten. V-VI 2.— lacustris. Kleine lichtblaue Blüten. 15 cm V-VI 1.—	Blüten. 30 cm
mellitis. Schöne Zwergiris, blaublüh. 20 cm. V-VI 0.80	— alpestris. Weißlichrosa. 30 cm III-V 0.50
Patula. Achnlich Iris pumila. Sie sind sehr reichblühend	— — aureus. Goldgelb. 30 cm III-V 0.60
- Baron Götz von Okocim. Zartmagentarosa . 1.—	Leontopodium, Edelweiß, Compositae ○ △
Jenny, Hellviolettblau	alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße
Kazimir Missona. Tiefdunkellila Valery Germanis. Leuchtend blau	Sternblüten. 10-20 cm VII-VIII 0.40

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung 1 St.	Manushin A. I. J.
Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung 1 St. RM Leontopodium (Fortsetzung)	Marrubium, Andorn, Labiatae ○ △
— callocephalum. Chinesische Art mit besonders großen	bung. Blüten weiß. 30 cm VI-VII 0.50
Blumen	Suprificanti Officer Welke Delaubling Welke Linnan Litter
- japonicum. Im Wuchs u. Ausschen verschied. v. obigen 0.50	050 VI-VII 050
- sibiricum. Mit größeren Sternblüt. 20 cm VII-VIII 0.50	Marricaria, leppichkamille (omposito o o o
- transylvanicum. Besond. großblum. Art. VII-VIII 0.60 Leptinella. Siehe Cotula.	Caucasica. Ariechende Art mit niedlichan
Lewisia, Bitterwurz, Portulacaceae ○— △	Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaubung. Auf steilen, sonnigen Böschungen und in sandigen
- cotyledon. Saxifragaähnliche, silberweiße Rosetten,	and the start start Masentlachen am dancel of
rosa Blüten im Sommer, sehr eigenartig. 20 cm.	diese schnellwachsende immergning lait
Selten VII-VIII 1.— Leana. Stielrunde bläulichgrüne Belaubung, rosa	- oreades. Ähnlich voriger, jedoch noch feinere Belaubung und kleinere Belau-
Blüten. 20 cm VII-VIII 1.20	Michiele Dillien a cm VI VIII A 70
Linaria, Leinkraut, Scrophulariaceae ○- △	Waizenschillnd Scrophulariacoa
Meist kriechende Pslänzchen mit teils ober- teils	
unterirdischen Ausläufern und kleinen, löwenmaul-	of the property of the second
ähnlichen Blüten in großer Masse. Lieben frischen Boden. 15–20 cm VI-VIII	Röhrenblütchen. 5 cm. Selten V-VI 0.50 Mentha, Zwergminze, Labiatae O-D A
- acutangula. Die zierlichste von allen, mit winzigen	Rasige Kleinhlaffenige D.1 (1911)
Blättchen und lila Blütchen. 3 cm 0.50	Mertensia, Lungenwurz Borresi
— alpina. Kleine, nadelförm. Blättchen u. blaue Blüten in großer Zahl. 5 cm	Mertensia, Lungenwurz, Borraginaceae ○-① △ echioides (primuloides). Mit kobaltblauen Blüten.
rosea. Wie vorige, jedoch rosa Blüten. 5 cm 0.50	20 cm VI-VIII 0.50
- cymbalaria. Heidelberger Schloßkräutchen, kriechend.	The control of the co
Wuchs, kleine efeuartige Blättch., blaue Lippenbl. 0.40	dinablaue Blütentrauben. 20 cm . VII-IX 0.50
alba. Weiße Form. 5 cm	Micromeria, Scheinbohnenkraut, Labiatae ○ △ — croatica, Lilarote Blüten, 10 cm
von violetter Farbe. 10 cm	— microphylla. Zierliche Belaubung. 10 cm VII-VIII 0.50 Mimulus, Gauklerblume. Scrophylla. 10 cm VII-VIII 0.60
- hepaticaefolia. Kräftig wachsende Art, weiß marmo-	
rierte Blätter, weiße Blüten. 5 cm 0.50 — nevadensis. Weißblühend. 15 cm. Selten 0.60	Frischgrün belaubte Stauden mit sehr zierenden, löwenmaulähnlichen Blüten während des ganzen
- pallida. Bleichviolette Blüten, eine der schönsten. 5 cm 0.40	Sommers. 20-30 cm VI-VIII
— alba. Großblumig, weißblühend. 5 cm 0.50	
— pilosa. Hübscher, kriechender Zwerg. Feine blaue Blütchen mit gelber Mitte. 5 cm 0.50	- Burnetii, Leuchtend kurf
repens alba. Ähnlich Pancicii, mit weiß. Blüten. 30 cm 0.50	- Feuerfalter Großbl net it 6:
— villosa. Behaart, violettblühend. Selten. 10 cm 0.60	— Leopard. Gelb mit schwarzbrauner Zeichnung . 0.40 — Netzfalter. Siehe Neuheiten
Linum, Lein, Linaceae ○ ∞ △ Niedl. Büsche mit nadel-	— Netzfalter. Siehe Neuheiten
artiger oder rundlicher Belaubung und kopfartige, gedrängte Blütenstände. 20—30 cm . VII-VIII	- Postillon Siehe Neut in braunroter Zeichn. 0.50
— alpinum. Bildet schöne niedere Polster, leuchtend blau 0.50	- Schmetterling. Siehe Neuheiten
- Capitatum. Koptartig gedrängte Blütenstände gelber	
Blumen	— luteus. Sehr reichblijhend and in 0.50
- orientale. Grob rundliche Blätter und goldgelbe Blü- ten. Sehr selten	
- salsoloides. Nadelartige Blättchen, große weiße Blüt. 0.60	arvonhyllacon o oc A
tenuitolium. Mit feinem Laubwerk u. blauen Blüten 0.50	Thank III, Ulcht, Polstern dunk-1
Siehe auch halbhohe Stauden.	nadelart. Blättchen u. weißen Blütchen VII-VIII — aizoides. Dunkelgrüne Teppiche bild., weißblüh. 5 cm 0.40 — graminifolia. Grasartige Beleuk
Lithospermum, Steinsame, Borraginaceae ○ △ — fruticosum (prostratum). Kleiner kriechender Strauch,	
mit lanzettlicher Belaubung u. dunkelblauen Blüten.	
20 cm VII-VIII 0.70	— laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten. 15 cm 0.40 — linifolia. Scharfnadelige Balenk. 15 cm 0.40
— Heavenly Blue. Hellblaue große Blüte. 20 cm 0.70 — purpureo-coeruleum. Starkwachsende Art. dunkel-	- Rosanii. Dichte, dunkeleriine Polet is Plin 15 cm 0.40
blaue Blüten. 30 cm V-VII 0.60	() deeppildend
Lotus, Hornklee, Leguminosae O A &	
- corniculatus fl. pl. Gefülltblühende Abart des krie-	- verna, Schöne, grijne Poleten I il. weißblüh. 10 cm 0.40
chenden, gelben Hornklees. 20 cm VII-VIII 0.40	gordintolulielitie Form III a C 1, 14
Lychnis alpina. Siehe Viscaria alpina.	A A A
Lysimachia, Goldmünzkraut, Primulaceae ○-() ≅ △ — nemorum. Kriechende Art, Blätter eiförmig, Blüten	Ports. Immergrune, rundovale general Divisi
dottergelb. 5 cm V-VIII 0.40	State of the Dillichen III on IV VIII
- nummularia. Kriechend, Blätter stumpfrundlich. Blü-	Mitella, Bischofskappe, Saxifragaceae ○-() △ — caulescens. Kriechende Pflanze mit rundl. Blättern und aufrechten Trouben bli
ten groß, goldgelb. 5 cm V-VII 0.30 — aurea. Goldbuntblättrige Form. 5 cm. V-VIII 0.50	Tauben Kleiner goldigi. Div.
— phyllocephala. Siehe Neuheiten	- diphylla Efenart Risu
Maianthemum, Schattenblümchen, Liliaceae 🕽 – • 🛆	- Friday Literation Light Liver 1"
- bifolium. Mit kriechenden Rhizomen und herzeiför-	Moehringia, Moosmiere, Caryophyllaceae O-D \(\triangle \) — muscosa. Die zahlreichen, weißen Blütchen stehen in schönem Kontrast zu der b. H. iii
migen Blättchen, kleine, weiße, duftende Blüten in	schönem Kontrast zu der hellgrünen moosarrigen



Dianthus spiculifolius



Primula Juliae

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	1 St.	Opuntia, Feigenkaktus, Cactaceae ○ ∞ △ ∧	1 St.
Moltkia, Borraginaceae ○ △	5000	Aus den Hochgebirgen Nord- u. Zentral-Amerikas	RM
 Doerfleri, Alpine mit knoll. Wurzelstock u. leuchtend blauen Blütenbüschel. Außerordentl. reichblühend 		stammend, sind sie wegen ihrer großen Bedürfnis- losigkeit u. ihrer bizarren Formen für Böschungen,	
und sehr hart. 20 cm VI-VII	1.50	Felspartien u. Trockenmauern ein sehr schätzbares	
 petraea. Halbholzige Pflanze mit himmelblauen Blüten in traubigen Köpfen. 15—20 cm V-VI 	1.20	Material. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Sämtliche Opuntien eignen sich auch	
Morina. Siehe mittelhohe Stauden.		vorzuglich als Topt- und Schalenpflanzen.	
Mühlenbeckia. Siehe unter Felsensträucher.		10-30 cm VI-VII Wir liefern ein feines Sortiment mehrgliedriger	
Myosotis, Vergifsmeinnicht, Borraginaceae ○ △		Pflanzen von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl	
 alpina superba. Leuchtend blaue Blüten. 10 cm olympica. Niedliche, kleine Büsche bildend, himmel- 	0.40	zu RM 68.—, 25 Stück zum 100 Stück-Preis.	
blaue Blumen. 10 cm V-VII	0.40	 arborescens. Siehe Neu- und Seltenheiten arenaria Engelm. Zierliche Art, rundl. kurze Glieder, 	3.—
 palustris Graf Waldersee ○ \(\text{\ti}\text{\texi}\text{\text{\texitex{\text{\texi}\text{\text{\texi}}}}}}}}}}}}}}} \encorminimegion}}}}}	0.40	Didtell gelb	1.—
- Perlevon Ronnenberg. Große dunkelhimmelblaue		difference Offit, Siehe Neitherten	72
Blüten, kräftig., straffer Wuchs. 40 cm. V-IX Thüringen. Siehe Neuheiten	0.40	brachiathra. Gelbe Blüten, walzenförmige Glieder brachyclada rosea. Blumen karminrosa, kleingliedrig	000
Rehsteineri (caespitosa). Zwergiges, dichtrasiges		— camanchica. Starkwachs., großgliedrig, gelbe Blumen — albispina. Weiß bestachelt, gelbblühend.	$\alpha \alpha \alpha$
Pflänzchen mit himmelbl. Blüten. 2 cm V-VII — rupicola. Kugelrunde Büsche und herrlich dunkelultra-	0.70	Tarou carricosidiffica, trafba Riitan	000
marinblaue Blumen. 10 cm V-VI	0.40	— longispina. Hellgelbe Blüten — major. Blüten gelb, Staubfäden fleischfarben — minor. Zierliche Form	
Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ △ :::			
grandiflora. Herzförmige Belaubung und lilarote Blüten. 30 cm VI-IX	0.40	— orbicularis. Blüten glänzendgelb — pallida. Hellgelb mit grünlichem Schein — rubra. Brännlichnete Bl	$\alpha \alpha \alpha$
— — Souvenir d'André Chaudron. Abart der Nepeta			
grandiflora mit überaus groß. Blum. v. schöner, blau Farbe. Sehr guter Dauerblüher. 35 cm - VI-IX	0.40	— corrugata. Gelbe Blitten rundliche Clieb	0.90
- hybr. Six Hills Giant. Siehe Neuheiten	0.60		
- kokanica. Rundliche, graubehaarte Blättchen und lila Blüten. 25 cm VII-VIII	0.50	— caespitosa, Blitten hellgelb	0.90
- Mussinii. Den ganzen Sommer blühende Staude mit	t		
silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen Sehr empfehlenswert. 20 cm VI-X	0.30	- Howevii, Siche Neuheiten	1.50
— superba. Mit dunkelblau. Blüt. 20 cm V-VII — nervosa. Siehe Neuheiten	0.30	Control of the contro	
Nierembergia, Weißbecher, Solanaceae O A	0.00	— — arcansana. Mit Stacheln dicht hand	0.90
- rivularis. Frischgrüne Belaubung mit großen, weißer	1	- Gerbe Billien	000
Trichterblüten. 15 cm VI-IX	0.60	— macrorrhiza. Blitten gally graft Cl' 1	0.90
Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae ○ △ — caespitosa (marginata). Mit großen, weißen Blüten			
20 cm VII-IX	0.60	- pachyclada. Oyale, kleine Glieder pass Dl	0.90
 linearis. Siehe Neuheiten missouriensis. Von kriechendem Wuchs mit prachtvoll. 	. 0.70	i di di delle i i i i i i i i i i i i i i i i i i	000
außerordentlich großen, schwefelgelben Blumen	١.	— polyacantha. Gelbe Blüten, stark hestadalte Ci. 1	0.90
20 cm VII-IX — Nuttallii. Zierliche, schmalblättrige Art mit goldgelbe	0.40 n	1 Stark Wullstoe, Weibbects dealte A	000
Blüten. 20 cm. Selten! VII IX	0.80	- erythrostema. Weiß bestachelt, Blüten gelb, Staub-	000
— pumila (pusilla). Rosettenbildend; in kleinen, gelbe Rispen blühend. 20 cm VI-VII	o.40	JOHOCCHIIG, MARK Decta double 121"/	0 0 0
Omphalodes, Gedenkemein, Borraginaceae) - • 1		- Watsonii, Blitten orange	0.90
- cappadocica. Blüten prädtig blau, einem riesige	n 0.60		
immergr. Vergißmeinnicht ähnl. 20 cm IV-V — lusitanica (nitida). Mit großen, lanzettlichen Blätter		— — brevispina. Blüten hellkarmin — — flavispina. Blüten karmin — — pisciformis. Blüten hellkarmin	
und leuchtend blauen Blüten. 20 cm. IV-V — verna. Kriechend Staude mit eiförmigen Blättern un	0.60	— pisciformis. Blüten hellkarmin — pallida. Blüten hellgelb — salmonea. Länglicheimunde Clieben pur	
vergißmeinnichtart., blauen Blüt. 10 cm IV-VI	0.40		
— alba. Reinweiß blühende Abart der vorigen. 10 cm	0.40	- rutila. Gelbblühend, rundlich länglich Cli 1	0.90
Ononis, Hauhechel, Leguminosae ○ △	0.10		
- spinosa. Halbstrauchige, stachelige Pflanze mit prächti		— major, Blüten gelb	0.90
rosaroten Schmetterlingsblüt. 30-40 cm VII-IX Onosma, Lotwurz, Borraginaceae ○ ○ △ VI-VIII	0.50		
— albo roseum. Mit weißlichrosa Blüten. 20—30 cm	. 0.80	- xanthostemma gracilis Blitten helli	0.90
- cassium. Rauhborstige, steife, graugrüne Steppenpl	1.		
mit nickenden, weißen Blüten. 20–30 cm helveticum. Gelbblühend. 20–30 cm	. 0.80	— orbicularis. Siehe Neuheiten	. 0.90
- sericeum. Silbergraue Belaubung, gelbe Blüten .	. 0.80	1 Joseph Diuten Losakarmin	0 0 0
— stellulatum. Große gelbe Blüten. 20-30 cm	. 0.00	— rubra. Blüten leuchtend rot	0.90

	1 01
Origanum, Majoran, Labiatae ○ ∞ △ 2.81.	Pentastemon Roezlii, Aufrechtwachsende Art mit schar-
officinarum compactum. Würzige Pflanze mit rundl.	lachkarminroten Blüten. 30 cm VI-VII 0.80
	Phlox, Teppichphlox, Polemoniaceae ○ △ : 🕮 😐
_	
Orobus. Siehe Lathyrus.	Meist kriech. Stauden mit nadelförmig. od. kleiner,
— lathyroides. Siehe Vicia.	länglichrundlicher, fast immergr. Belaub. u. stern-
Othonopsis, Fettkreuzkraut, Compositae O O A	förmig. Blüten, unter denen das Laubwerk im Früh-
— cheirifolia. Dickfleisch., graugrüne Belaub. mit herrlich	jahr verschwindet. Sollten in keinem Garten fehlen.
goldlackartigen, gelben Blumen. 30 cm VII-VIII 0.80	— adsurgens. Siche Neuheiten
	- amoena. Von kräftigem Wuchs mit schmaler, lanzettl.
Oxalis, Sauerklee, Oxalidaceae 🕽 – 🔍 🕰	Belaubung u. leuchtend karminroten Blüten. 20 cm 0.40
acefosella. Dreizahlige kleeartige Blätter und weiße	— Douglasii hybrida. Bildet feinbelaubte, dichte runde
Blüten. 10 cm V-VI 0.30	Polster, die auch im Winter grün bleiben. Die röt-
- rosea. Sehr schön, rosablühend. 10 cm V-VI 0.50	lichlila Blüten erscheinen in großen Massen und
Oxytropis, Fahnenwicke, Leguminosae O ∞ \triangle	erinnern stark an Aubrictien. 5 cm . IV-V 0.50
	— hybr. Cecil Davis. Siehe Neuheiten 0.80
- argentea. Samtigsilberweiße Blättchen, rote Blüten.	
10 cm VI-VIII 0.50	— ovata. Kleine, eiförmige Blätter und rosarote Blüten.
— campestris. Gesiederte Blätter u. hellgelbe Schmetter-	10 cm V-VI 0.50
lingsblüten. 10 cm VI-VII 0.50	— saxafilis. Leuchtend rosa Blüten. 5 cm. V-VI 0.50
montana. Dichtwüchsig, blaugrün belaubt, purpurne	- stellaria. Unter den Teppichphloxen die schnellwach-
Blüten. 10 cm VI-VIII 0.50	sendste Sorte mit großen, hellschieferblauen
Pachysandra, Ysander, Euphorbiaceae ()—	Blüten. 15 cm IV-VI 0.40
- terminalis. Immergriine, lederartige, dunkelgriine Be-	— subulata (setacea) atropurpurea. Polsterbildend,
laubung; Blüten weiß. 20 cm V-VI 0.50	purpurfarbene Blüten. 15 cm IV-V 0.40
- fol. var. Weißbunte Art. 20 cm VI-VII 0.70	— Brightness. Dunkelrosa, Mitte karmin. 15 cm 0.40
Papaver, Zwergmohn, Papaveraceae ○ △	— — Camlaensis. Die großen, dunkelrosa Blüten er-
alpinum. Alpenpflanze mit kleinen Blüten, in Farben	scheinen in großen Mengen. 15 cm IV-V 1
wie nudicaule. 10 cm VI-VII 0.40	— — Daisy Hill. Karminpurpur. 15 cm IV-V 0.50
- nudicaule. Sibirischer Mohn. Eine sehr beliebte	– Fairy. Blaßlila, purpurne Mitte, spätbl. 1V-V 0.50
Pflanze mit mittelgroßen, schalenförmigen Blumen	— G. F. Wilson. Schieferblaue Blüten, ungemein reich-
auf drahtartigen, festen Stielen, sehr reichblühend	blühend. 15 cm IV-V 0.40
in den Farben: weiß, gelb, orangerot. Sehr wert-	— Leuchtstern. Leuchtend lachsrosa, kleine Blüten in
voll für Steingärten. 30 cm IV-IX 0.40	reicher Fülle auf dichten Polstern IV-V 0.60
- nudialpinum. Ein Bastard von P. alpinum u nudicaule	— — Lilakönigin. Reichblühend, dichte Polster mit hell-
mit zerschlitzter Belaubung und großen Blumen.	lila, dunkler geaugten Blüten. 10 cm . IV-V 0.50
Feines Farbspiel. 30 cm IV-IX 0.40	— Maischnee. Sehr reichblüh. u. großblumig, schnee-
- rupifragum. Seidenborstige Belaubung und ziegel-	weiß, frischgrüne Polster bildend. 10 cm IV-V 0.50
rote Blumen. 30 cm VI-VIII 0.50	— — Morgenstern. Mit zahlreichen weißen, im Zentrum
Paronychia, Mauerraute, Cariophyllaceae ○ ⊕ △	rot gesternten Blumen. 15 cm IV-V 0.60
argentea. Silberwollige, kleine rundliche Blättchen	— Moerheimii. Schr kompakter Wuchs. Aufrecht-
und weiße Blüten. 5 cm V-VI 0.40	wachsende Blütenstiele mit großen leuchtend kar-
- kapela. Kleine, rundliche, blaugrüne Belaubung und	minroten Blumen. 15 cm 1V-V 0.50
silberköpfige Blüten. 5 cm V-V1 0.40	— Nelsonii. Bläulichweiß mit lila Auge IV-V 0.50
Patrinia, Goldbaldrian, Valerianaceae () \triangle	— nivalis. Schneeweiße Blüten. 10 cm. IV-V 0.40
- triloba. Handförmig geteilte Blätter und duftende	— Ronsdorfer Schöne. Leuchtendes lachsrosa, die
goldgelbe Blütenrispen. 25 cm VI-VII 0.60	Mitte haltend zwischen Brightness und Vivid.
Pelargonium Endlicherianum. Siehe Neuheiten 1.50	Kräftig und gesund wachsend. 10 cm. 1V-V 0.60
Petasites, Winterheliotrop, Compositae	— rosea. Starker Wachser von feiner, karminrosa
fragrans. Rundliche, frischgrüne Belaub. u. nach Vanille	Färbung. 15 cm IV-V 0.40
duftende purpurrosa Blüten. 30 cm . I-II 0.70	
	— Rotkäppchen, Siehe Neuheiten 0.80
Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae O A	— Samson. Große, tiefrosa Blumen, deren Mitte
Teils aufrechte, teils kriechende Büsche bildende	karminrot ist. 15 cm IV-V 0.80
Stauden mit großen, rispenständigen Lippenblüten.	— Schneewittchen. Reizend, polsterbildend, frisch- grüne Belaubung und kleine schneeweiße Blüten,
arizonicus. Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne	
Belaubung. 25 cm VI-VIII 0.50	unter denen das Laub vollständig verschwindet.
Confertus. Herrliche Felsenpflanze mit großen, violetten	10 cm
Blütenrispen. 30 cm VI-VII 0.50	— Sensation. Leuchtend rosarote Blumen 1V-V 0.50
Davidsonii. Hübsche, kriechende Art aus Nordamerika	— Sternteppich. Überschüttet mit sternförmigen, lila-
mit purpurblauen Blüten. 15 cm V-VI 0.80	blauen Blüten. 15 cm IV-V 0.50
glaucus. Ovalrundliche, dunkelgrüne Belaubung und	— Sprite. Karminrot m. dunkl. Auge. 15 cm IV-V 0.40
violettpurpurne Blüten. 30 cm VI-VII 0.50	- Vivid. Leuchtend weinrot, eine herrliche Farbe.
- stenosepalus. Blätter tiefgrün, polsterartig. Blüte	15 cm IV-V 0.90
purpurrot, geadert. 30 cm V-VI 0.50	Phlox, Frühjahrs-Zwergphlox, Polemoniaceae O A
Hallii. Siehe Neuheiten	Aufrechte, kleine Büsche bildend. Große Blüten-
heterophyllus. Lavendelblau, rosa getuscht. 30 cm 0.50	dolden auf festen Stielen V-VI
Jamesii. Nadelartige Blättchen, große purpurrosa	— divaricata canadensis. Reinlilablaue Blütendolden
Blütenrispen. 10 cm VI-VII 0.60	auf ca. 20 cm hohen Stielen
Menziesii. Kriech., purpurrosa Blüt. 10 cm VI-VII 0.70	— Küppelstein. Leuchtend violettdunkelblau. 20 cm. 0.50
— Scouleri. Halbstraudige Art, lila Lippenblüten.	— — Laphamii. Starkwüchsig, violettblau, 30 cm 0.50
30 cm	— Müngsten. Verbesserte Phl. Laphamii Var., pracht-
pubescens. Prädtige Pflanze mit großen weißlila	voll leuchtend blau. 20 cm
Blütenglocken. 30 cm VI-VII 0.40	- Schaberg. Große Blüten von zartwasserblauer
pygmaeus. Zwergform von voriger. Sehr schöne u.	Färbung, gut sich abhebend von den Farben aller
interessante Steinstaude, lila Blüt. 15 cm VI-VII 0.50	anderen Varietäten. 30 cm 0.60



Ausschnitt aus einem Staudengarten



Teilansicht eines Steingartens



Zwergkoniferen im Steingarten



Berberis Wilsonae im Steingarten



Crucianella stylosa



Edraianthus pumilio



Campanula Portenschlagiana



Ramondia myconii



Aubrietia tauricola



Aster dumosus hybr. in Sorten



Cotyledon spinosa

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Primula, Primulaceae () ≅ △ Sie gehören zu 1.S.
Phlox divaricata (Fortsetzung)	dem scholisten Schlauck unserer (tarten ()bno Mol
- Schloß Burg. Farbe ähnlich der vorigen, aber mit	ist ein Garten undenkbar. Alle lichen einen hume
dunkelviolettem Auge. 20 cm 0.50	sen, leuditen Doden. In Anbetracht das das an
- Schneeteppich. Mit reinweiß. Blütenständ., 20 cm 0.50	und für sich schon sehr große Sortiment jährlich durch Neueinführungen und Neuzüchtungen noch
— Violet Queen. Mit prächt., violetten Blumen. 20 cm 0.50 pilosa. Schmale behaarte Blättchen und leuchtend rosa	theitert wird, haben wir unsere Primel in 6 Al
Blütenrispen von lang anhaltendem Flor. 30 cm . 0.40	remarken gegliedert, was die Auswahl wasantlid
- Altenberg. Malvenrosa, eigenartig schön. 30 cm 0.50	orienterii Wird.
— Brillant. Leuchtend dunkelkarminrosa Färbung; von	1. Alpenprimel. Sie gehören zu den edelsten Gebilden
großer Wirkung. 30 cm	der Alpenslora. Es sind hier, mit wenigen Ausnahmen, nur typische Arten angeboten.
Phyteuma, Teufelskralle, Campanulaceae O-D A	— acaulls. Gelbhliib Poletonnii 1 10
— orbiculare. Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 cm V-V1 0.50	I di di de la coma di
Pirola, Wintergrün, Pirolaceae → △	Trubstile, Weiße Abart mit galham A
— rotundifolia. Maiglöckchenartige, weiße Blüten, rund-	plena. Weiß gof::lle 5 III-V 0.40
liche lederartige Blätter. 20 cm VII-VIII 0.50	
Plantago, Silberwegerich, Plantaginaceae O O A	
— argentea. Lange, seidensilberige Belaubung. Ähren weißlich. 20 cm V-VI 0.60	
nivalis. Weißfilzige Rosetten, sehr eigenartig.	— — coerulea. Schön reinblaue Sorte von hellem Porzellanblau bis zum dunkelsten Enzianblau.
25 cm V-VI 0.60	
Plumbago. Siehe Ceratostigma.	Di Germin Inlande
Poa alpina. Siche Ziergräser.	Saum. 10 cm - lilacina. Kurz gestielte 12 C 1
Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae ○ △	
- reptans. Kriechend, dunkelgrüne Belaubung und blaß-	5 cm
blaue Blüten. 25 cm V-VII 0.50	— sanguinea plena. Rot gefüllt. 5 cm. IV-V 0.80 — sulphurea plena. Coll. 5 cm IV-V 0.80
- superbum. Mitdunkelviol. Blüt. 25cm. V-VII 0.50	— sulphurea plena. Gelb gefüllt. 5 cm IV-V 0.80 — auricula. Edite Alpenaurit 111-V 0.80
Polygala chamaebuxus. Siehe Zwerggehölze.	köstlichem Wohlgeruch 10 15
Polygonum, Alpenknöterich, Polygonaceae O- A	— Clusiana. Derbe, kleine Blätter und
— affine. Rasenbild., Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa, 15 cm, sehr schöne Felsenpflanze. VIII-X 0.40	ten. 10 cm
- superbum. Kräftiger wachsende Form und größere	
intensiver gefärbte Blumen. 20 cm VIII-X 0.50	ten. 20 cm
— — sphaerostachyum, Die dichten, kurzen Blütenähren	farbene Blitchen 10
sind von leuchtend karminroter Farbe. Sehr selten.	
30 cm VII-VIII 1.20	starkwüchsigste aller harten Primeln mit sehr gro- ßer Blattrosette. Die hohen Plije
vaccinifolium. Heidelbeerblättriger Knöterich mit schö-	ßer Blattrosette. Die hohen Blütenstengel tragen große Büschel stark dufter de
nen rosaroten Blütenrispen. 20 cm VIII-X 0.60	Blumen, 40 cm
Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae O A Niedrige, teils polsterbildende Psianzen mit kleinen erdbeerartigen	frondosa Einer kräftig wachsenden Mehlprimel der
Blättern und Blüten	Alpen und Moore ähnlich, mit zahlreichen Dolden kleiner rosa Blütchen 10 er
alba. Kräftig wachsend, mit großen, weißen Blumen.	- leucophylla. Achalich Production V-VI 0.50
20 cm V-VI 0.40	weißfilzigen Blättern. 10 cm IV-V 0.50
— alchemilloides. Fünf- bis siebenteilige, silbergraue Blättchen und weiße Blüten. 10 cm V-VI 0.80	marginata. Achnlich einer kleinen Aurikel mit gesägtem Blattwerk und dunkellila get in Nieden bestägtem
	10 cm
- ambigua. Kriech., Blätter graubehaart, Blüt. goldgelb 0.40	- microdantha alpicola Mit all III-IV 0.80
argentea calabra. Silbergraue Blätter mit hellgelben	innen bemehlten Blüten. 20 cm VI-VII 0.80
Blüten. 20 cm V-VIII 0.40	
- chrysocraspeda aurea. Die niedrigen Polster sind	blauen, aurikelartigen großen Blumen. VI-VII 1.— minima. Zierliche Art mit
dicht bedeckt mit leuchtend gelben, in der Mitte	minima. Zierliche Art mit kleinen rosa Blütchen. 3 cm officinalis. Schlüsselkluma.
etwas dunkleren Blüten. 10 cm V-VII 0.40	
— aurantiaca. Siehe Neuheiten	gelben Kelchen. 20 cm
- Hopwoodiana. Hellgelb m. braunrot. 30 cm VI-VII 0.50 insignis. Siehe Neuheiten	leuchtend karminrosa Blitte win allen mit herrlichen,
— nitida. Silberglänzende Laubteppiche, pfirsichrosa Blü-	einer glänzend sastiggrijner Di
ten. 10 cm. Selten VII-VIII 0.50	20 cm
— alba. Mit weißen Blüten. 10 cm VII-VIII 0.50	purpurpan Bliff 20
— pedata, Frischgrüne Belaub., goldgelbe Blüten. 30 cm 0.50	- sibirica. Schmale, unbestäubt. Die · VI-VII 0.70
— pyrenaica. Kleine, aufstrebende Büsche bildend, Blätter dreizählig, Blumen goldgelb Sehr reich-	Stielen vartlile Blow 20
blühend. 15-20 cm VI-VII 0.50	
- Tonguei. Gelb mit rötlichem Grund. 20 cm VII-VIII 0.60	Blumen. 30 cm
tridentata. Dreiteilige Blätter, weiße Blüten. 10 cm. 0.50	— Späthiana. Eine Kreuzung zwischen Primula Juliae und Primula Sibthorpii mit leuchtend lilaroten Pl

Primula (E	Primula denticulata (Fontsetauna)
(Fortsetzung) RM	R.M.
— spectabilis. Schön leuchtend lilarot. 10 cm V-VI 0.70	— Rosamunde, Reinpurpurrosa 0.50 — cashmeriana, Blätter auf der Unterseite m. gelbem
Workei Stark gegühnte Beleuhare Ularete Plüter	Staub bedeckt, tiefviolettblaue Blumen 0.40
- Wockei. Stark gezähnte Belaubung, lilarote Blüten- dolden. 10 cm	——— alba. Reinweiße Form
2. Etagenprimel) ≅ △ Sie sind durchweg chinesischen	— — "Rubin". Blütenbälle tiefrubinrot 0.60
oder japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange	Mooreana. Leuchtend blauviolett, großblumig 0.70
lanzettliche Blätter und blühen in Etagen. An	5. Japanische Primel () ≅ △ Diese prachtvollen Va-
feuchten Plätzen gedeihen sie auch in sonniger	rietäten gehören ihrer großen Farbenpracht und
Lage noch sehr gut. 30-40 cm VI-VII	Reichblütigkeit wegen, zu den schönsten all. Primeln.
Beesiana. Bringt im Frühsommer eine Masse leuch-	Die gestielten, herzförm., weich behaarten Blätter ziehen im Herbst ein, so daß ein Zusammenpflanzen
tender, sammetpurpurner Blumen an straffen	mit Farnen oder sonstigen, belaubten Schatten-
Stengeln	stauden zweckmäßig ist. 20–30 cm . V-VII
sich alle Schattierungen bis zum dunkelsten orange,	— Sieboldii Beauty of Sala. Leuchtend rosarot, sehr
karmin und purpur, vom zartesten lachsrosa bis	großblumig 0.60
dunkellachskarmin	— Daphnis. Lebhaft rot mit weißem Auge 0.60
Bulleyana. Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach	— Gartendirektor Steffen. Großblumig, leucht. rosa 0.60
und zartnankinggelb 0.50	— — Miss Nelly Barnard. Gefranste, leucht. rote Blumen 0.60 — — Queen of the White. Reinweiß, sehr großblumig 0.60
Burmanica. Karmin mit orange Auge 0.60	- Robert Herold. Rosaviolett, großes, weißes Auge 0.60
Cockburniana. Schwachwüchsige Art mit graziösen kupferorangefarbenen Blüten 0.50	- hybriden. Mischung feinster Farben 0.50
japonica. Herrliches Farbspiel von rot bis rosa u. weiß 0.50	— lichiangensis. Kräft. behaart m. violettrot. Blütendold. 0.70
pulverulenta. Ähnlich Pr. japonica mit leucht. roten	— Veitchii. Gestielte, herzförmige, weich behaarte Blätter
Blumen auf stark weißmehlig bepuderten Stengeln 0.50	und leuchtend purpurrosa Blütendolden 0.60
Red Hugh. Leuchtend scharlachrote Blumen 0.60	— Ville de Nancy. Rosarote, an den Rändern ge- schlitzte Blüten 0.60
Silva Taroucana. Kupferigrot 0.60	— Lothringen. Leuchtend rosarote Dolden 0.60
3. Kissenprimel () ≅ △ Sie entstammen meist einer	6. Großblumige Gartenprimel → ≅ : Sie sind
Kreuzung von Primula Juliae mit unserer groß-	meistens Züchtungen von unserem Wiesenhimmels-
blumigen Gartenprimel. Das besonders frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem	schlüssel und eignen sich sowohl zum Bepflanzen
Blumenkissen verschwindet, macht diese Art be-	ganzer Beete und Kanten als auch zum Schnitt.
sonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie	20—30 cm IV-V — auricula hybr. Siehe pubescens.
am leichtesten. 10-20 cm III-IV	— elatior aurea grandifl. "Vierländer Primel". Leuch-
pruhoniciana (Helenae). Herrlicher Bastard von	tend dottergelb, sehr großblumig 0.40
Primula Juliae und Primula acaulis mit großen	— — carpathica. Unserer gewöhnlichen Wiesenprimel
- Arno von Oheimb. Samtig dunkelpurpur 0.40	ähnlich, jedoch bedeutend reicher blühend 0.40
- Blaukissen. Von hellveilchenblauer Farbe 0.50	- coerulea. Großblumig, hell oder duukelblau 0.50
- L. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80	— gigantea Hybriden. Prachtprimeln, deren Einzel- blumen oft über 4 cm Durchmesser haben, in den
- Edelstein. Leuchtend purpur	Farben weiß, gelb und rot aller Schattierungen . 0.40
- Frühlingszauber. Lilarot	— Goldelse. Tiefdottergelbe Blütenfarbe mit orange-
— Gartenglück. Karminrot mit gelber Mitte 0.50 Juwel. Leuchtend rötlich magenta 0.50	farbener Mitte, sehr großblumig 0.50
- Lebensfreude. Karminrosa mit hellviolett 0.50	- Weißer Schwan. Langgestielte, große, weiße Blum. 0.40
- Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50	pubescens (auricula hybriden). Gartenaurikel.
— Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die	Altbeliebte Gartenpflanze, deren duftende Blüten im reichsten Farbenspiel in hübsch. Dolden stehen 0.40
leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten	Pterocephalus, Alpenskabiose, Dipsacaceae ○ △
Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50	- Parnassii. Kriechende Pflanze mit grauer Belaubung u.
— Miss Mac Gilavry. Licht lilarosa 0.50	prächt., rosafarb. Skabiosenblüt. 20 cm VII-IX 0.50
— Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig 0.50 — Purple Splendour. Siehe Neuheiten 0.80	Pulmonaria, Lungenkraut, Borraginaceae ○-● ≅ △
- Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50	Große, länglich-ovale Blätter und große Blüten-
- Rubin. Siehe Neuheiten 0.60	dolden im zeitigsten Frühjahr. Hervorragende Schattenpflanze, die in feuchten Lagen auch in der
— Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten 0.50	Sonne gedeiht III-IV
— Schneekissen. Von reinweißer Farbe 0.50	- angustifolia azurea. Eine der frühesten von allen
— Schlesierkind. Leuchtend violett, sehr reichblühend 0.50 — Wanda. Fast reinblau, sehr schön 0.50	Stauden mit großen, tiefenzianblauen Blum. 30 cm 0.50
- Juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen	- avernensis. Gedrungen wachsende, schmalblättrige
feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend u.	Art mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50
von langer Blütezeit 0.40	 — alba. Schneeweiß blühende Abart d. vorig. 25 cm 0.50 — officinalis. Heimische Art mit rotvioletten Blüt. 30 cm 0.40
- Gloria. Siehe Neuheiten 0.70	- rubra. Leuchtend mennigrote Blüten. Schönes Gegen-
4. Kugelprimel () △ ≅ Sehr widerstandsfähige Arten	stück zu P. angustifolia. 30 cm 0.40
mit langen, spatelförmigen, abgerundeten Blättern	— saccharata. Blätter dunkelgrün mit unregelmäßigen,
u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. Auch zum langsam. Treib. gut geeignet. 20-30 cm III-V	großen silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm. 0.40
denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40	- argentea picta. Die derben Blätter sind mit be-
— alba. Weißblühende Art 0.50	sonders großen, weißen Flecken gezeichnet. 30 cm 0.50 — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch
- delicata. Reinhellrosa, sehr reichblühend 0.50	Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50
— Juno. Leuchtend hellila Blütenkugeln, 8-10 cm	Pyrethrum, Zwergmarguerite, Compositae O \(\triangle \)
im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen 0.60	— densum. Weißfilzige, samtartige Blättchen, weiße



Physalis Franchetii



Helleborus niger macranthus

AP 12 112h de 61- des Follosterres (9)	
Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Santolina (Fortsetzung)
Pyrethrum (Fortsetzung)	— tomentosa. Dichte silbergraue Belaubung, gelbe Blü-
— sericeum. Wollig silbrige Blattbüschel, weiße Blüten.	tenköpfe. 30 cm
20 cm V-V1 0.80	Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae ○ △
— Tschihatschewii, Siehe Matricaria.	— Boisseri, Schöne rote Blütenp. 20 cm. Selten VI-VII 1.—
Ramondia, Ramondie, Gesneriaceae () – ● △ ≅ — Heldreichii. Silberweißfilzige Laubrosette, Blüten vier-	— caespitosa. Dichte Polster linealer Blättchen, Blüte
lappig, hellilablau. 10 cm VI-VII 2.—	lebhaftrosa. 10 cm VI-VII 0.60
— myconi (pyrenaica). Aus den breiten, flachen Rosetten	— lutea. Dichte, lebhaftgrüne Polster und strohgelbe
dunkelgrüner, braunbehaarter Blätter erscheinen	Blüten. 5 cm VI-VII 0.60
die prächtigen, dunkelvioletten, großen Blumen.	— ocymoides. Kräftig wachsende kriechende Pflanze mit
Eine der schönsten Alpenpslanzen für feuchte	einer Fülle v. karminroten Blüt. 10 cm VI-VII 0.40 — alba. Weißblumig. 10 cm VI-VII 0.50
schattige Felsen. 10 cm VI-VII 1.—	- alba. Weißblumig. 10 cm VI-VII 0.50 - splendens. Mit leucht. rot. Blüt. 10 cm VI-VII 0.50
— — alba. Abart m. edl., reinw. Blüt. 10 cm VI-VII 1.50 — — rosea. Blüt. v. ganz zartrosa Farbe. 10 cm VI-VII 1.50	— pulvinaris. Schöne, rote, dichte Zwergpolster.
	10 cm VI-VII 1.—
Ranunculus, Zwerghahnenfuß, Ranunculaceae O A	- Wiemanniana. Rosabl. Zwergsorte. 10 cm VI-VII 1
Teils grasartige, teils kleine handförmige, einge- schnittene od. geschlitzte Belaubung u. anemonen-	Satureia, Bohnenkraut, Bergminze, Labiatae 🔾 🛆
artige Blüten. Liebt feuchte sonnige oder halb-	- alpina (Calamintha). Die lockere Polster bildende
schattige Lage. 10–30 cm V-VI	Pflanze bringt eine Fülle kleiner, blauer Lippen-
- alpestris. Herrliche Alpine mit frischgrüner Belaubung	blütchen. 10 cm V-VIII 0.40
und weißen, anemonenartigen Blüten. 10 cm 0.80	— alba. Wie vorige, jedoch weißbl. 15 cm V-VIII 0.60 — grandiflora. Purpurrosa Blüt. in lockeren Ständen.
— amplexicaulis. Schöne Art mit prachtvollen, großen,	10 cm V-VIII 0.50
blendendweißen Blumen, in denen die goldgelben	— amoena. Schöne, niedliche Büsche bildend. Blüten
Staubfäden schön hervortreten. 25 cm 0.70	lilarot. 15 cm V-VIII 0.50
— Arendsii. Siehe Neuheiten	- Baumgartenii. Besonders feine Art mit großen weißen
gargameus. Gerrauste Blatten, goldgebe Blatt. 10 cm c.00 gramineus. Aus schmallanzettlicher, grasartiger Be-	Blüten. 20 cm VI-VIII 0.80
laubung erscheinen verzweigte Blütenstiele mit	— intermedia. Zierlicher im Wuchs wie S. montana.
ziemlich großen, goldgelben Blumen. 30 cm 0.50	20 cm VI-VIII 0.40
- millefoliatus. Stark gekrauste Blättch., gelbe Blüt. 10 cm 0.60	— montana. Halbstrauchig aromatische Pflanze mit einer Fülle weißer od. zartlila Lippenbl. 30 cm VI-VIII 0.40
- psilostachys (nyssanus). Handförmig eingeschnittene	- pygmaea. Niedr. Art, m. lila Blütch. 10 cm VI-VIII 0.40
Blätter und große, leuchtend hellgelbe Blumen . 0.50	— atroviolacea. Niedere Form mit dunkelvioletten
Raoulia, Schafsteppich, Compositae O O A A	Blüten. 20 cm VI-VIII 0.50
— australis. Kleiner Rasenbildner mit moosartig-dichter, silbriggrauer Belaubung; verlangt sonnigen Stand-	Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae ○-① △ : 🛭 🖰
ort. 3 cm VII-VIII 0.70	Die Saxifragen gehören unbedingt zu den Edel-
Roscoea, Ingwerorchidee, Zingiberaceae ○ △	steinen unserer Felsenpflanzen. Was hier die Natur
- alpina. Eine Zwergform vom Himalaya stammend mit	geschaffen hat, gehört zu den wunderbarsten Ge-
rosaroten Blüten. 20 cm. Sehr selten! VII-VIII 1.50	bilden der alpinen Pflanzenwelt. Blüten in allen
— cautleoides August Beauty. Siehe Neuheiten 2.—	Formen und Farben vom zeitigsten Frühling bis in den Hochsommer hinein. Aber auch ohne diese
- purpurea. Irisartige Staude mit sleischigknolligem	wirken die Pflanzen das ganze Jahr über durch die
Wurzelstock, lineal-lanzettlicher Belaubung, und	Vielgestaltigkeit in der Blatt- und Rosettenbildung
orchideenartigen,rosapurpurnen Helmblüten. 30 cm. Sehr selten! VII-VIII 1.50	und sind auch so noch eine besondere Zierde für
Ruta, Raute, Rutaceae ○ △	den Garten. Wer sie auf unseren Kulturbeeten
— palavina. Blätter dreizählig sitzend, schöne goldgelbe	sieht, wird sozusagen von ihnen zum Anpslanzen
Blütendolden. 20 cm VI-VII 0.70	aufgefordert. In Anbetracht der vielen Formen und
— graveolens. Siehe mittelhohe Stauden.	Arten, haben wir unser großes Sortiment in 4 Ab- teilungen gegliedert.
Sagina, Sternmoos, Cariophyllaceae O-() 🕰	1. Moosartige Saxifragen () ⊕ : A Lieben entweder
- subulata. Moosartige, feine Bodendeckungspflanze, die	einen absonnigen oder halbschattigen Standort und
als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet und	eignen sich auch zum Begrünen ganzer Flächen
mit unzähligen, weißen Sternblütchen besetzt ist.	u. für Einfassungen. An genügend feuchten Stellen
3 cm VI-VII 0.25 — aurea. Goldgelbblättrige Form der vorigen.	gedeihen sie aber auch in voller Sonne. V-VI
3 cm VI-VII 0.35	— bronchialis (Stelleriana). Ziemlich spätblühend, weiß 0.40 — Camposii, Großblumig, weiß, 30 cm
Sanguinaria, Blutwurz, Papaveraceae (▶—● △	— Camposii. Großblumig, weiß. 30 cm
- canadensis major. Die ziemlich großen, wurzelstän-	— ceratophylla. Siehe S. trifurcata.
digen Blätter sind herz-nierenförmig, blaugrün; die	- cuneata. Starkgeschlitztes Laubwerk, weiße Blüten 0.40
anemonenartigen Blumen weiß. 30 cm IV-V 1.50	— caespitosa lutescens (decipiens). Mit gelben Blü-
Santolina, Heiligenblume, Compositae ○—∞ △:	ten. 20 cm
Bilden rundliche, immergrüne Büsche mit zypressen-	— Sternbergii. Kleinblumig, weiß. 20 cm 0.40
ähnlicher aromatischer Belaubung und runden Blitenkönsen 20—30 cm VII-VIII	— villosa. Etwas wollige Blätter, weiße Blüten. 10 cm 0.40 — hybr Astrild Siehe Neuheiten
Blütenköpfen. 20—30 cm VII-VIII — caespitosa. Aschgrau belaubte, selt. Zwergsorte. 20 cm 0.80	— hybr. Astrild. Siehe Neuheiten 0.80 — — Bees Pink. Siehe Neuheiten 0.80
- chamaecyparissus. Immergrüne, silbergraue Belaub.	— — Blütenteppich. Bildet dichte Polster, die den
und gelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.50	Eindruck eines blumigen Teppichs machen, leuch-
— lindavica. Mit sattgelben Blumen, 30 cm 0.60	tend karminrosa. 10 cm 0.40
pinnata: Feingesiederte, grüne Belaubung, schwesel-	— — grandiflora alba. Große, edle Blumen von
gelbe Blütenköpfe. 30 cm	reinweißer Färbung. 20 cm
— alba. Weiße Blumen. 30 cm	— — Juwel. Farbe wie "splendens", aber um etwa

Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Saxifraga (Fortsetzung) 1St.
axifraga caespitosa hybr. (Fortsetzung)	— cotyledon hortensis (pyramidalis). Bildet große,
— — magnifica. Kräftig und robust wachsend, sehr	bis 25 cm Durchmesser haltende Rosetten. Weiß
reichblühend, von schöner, frischer hellrosa Fär-	geränderte Blätter, pyramidale Blütenrispen von
bung. 20 cm	weißer Farbe. 30 cm 0.50
Purpurmantel. Große Blumen von einer ganz	vera. Mit mehr rundlichen Blättern wie die vor-
eigenartig schönen karminrosa Färbung mit pur-	stehende Form. 20 cm
purnem Schein. 20 cm 0.40	- crustata. Dichte Rosetten weißkrustiger Blätter. Weiße
– – Rosakönigin. Diese späteste von allen moos-	Blütenrispen. 20 cm 0.50
artigen Saxifragasorten fällt durch kräftigen Wuchs	- Engleri. Weißberandete Blättchen, weiße Blüten 0.50
und klare, leuchtend rosa Farbe auf. 20 cm 0.50	- Grisebachii. Seltene Art aus Macedonien. Silbrig be-
rosea superba. Reichblühend, frisch karmin-	reifte Blattrosetten, rosa Blüten. 20 cm 1.—
rosa Blumen. 20 cm 0.40	- Hostii. Große silbergraue Rosetten, weißblühend. 30 cm 0.50
- — Schneeteppich. Die großen, edlen Blumen sind von reinweißer Farbe und sitzen auf den reichver-	— rhaetica. Rahmweiße Blüten. 20 cm 0.50 — lingulata (Portae). Kleine, krustige Rosetten, weiße
zweigten Stielen so dicht gedrängt, daß während	Blüten. 10 cm 0.50
der Blütezeit die Belaub. völlig verschwindet. 20 cm 0.40	- lantoscana. Schmallaubige, weiß gerandete Ro-
Schöne von Ronsdorf. Großblumig, dunkel-	setten, weiße Bluten, 30 cm
rosa. 20 cm	- longitolia. Rosetten schmallanzettlicher, weiß bereiften
— — Schwefelblüte. Zeichnet sich durch eine matt-	Blatter und langer, reichverzweigter Risne weißer
schwefelgelbe Blütenfarbe aus. 15 cm 0.40	Bluten. 30 cm
– – splendens. Reichverzweigt, dunkelkarminrot.	paradoxa. Sheerig uberkrustete Rosetten mit weifing
15 cm	Blutenrispen. 20 cm
— — Teppichkönigin. Zierliche Blumen frischrosa	pecilidid. Feine Rosettchen, Blättchen etark weiß
gefärbt, die niedrigste von allen caesp. Hybriden 0.50	berandet und gezahnt, weiße Blumen 10 cm
— Triumpf. Die Blütenfarbe ist ein leucht, dunkles karmin, das im Verblühen nicht hell wird. 15 cm 0.50	— spathulata. Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten
groenlandica. Dunkelgrüne Belaub. mit weiß. Blüten 0.40	weißlich. 25 cm
	- Zillillelell. Reizender Bastard mit kleinen Rosetts-
hypnoides angustifolia. Schmale, moosartige Belaubung. Blüten weiß. 15 cm	und weißen Rispen. 20 cm 0.60
- densa. Weißblühend, rasenbildend, eine der	
besten Arten. 3 cm 0.40	3. Polsterbildende Saxifragen O-() A Sie bilden
– muscosa. Feine moosartige Belaub., weiße Blüten 0.40	graugrüne bis silbergraue, starke, feste Polster und
— — pulchella. Niedliche Form. Frischgrüne Belaubung,	gehören zu den ersten Frühlingsboten. Ostlage, wo sie die Morgensonne genießen können, sagt ihnen am
weiße Blüten. 15 cm 0.40	meisten zu. Bei genüg. Bodenfeuchtigkeit gedeihen
- pedatifida. Die unempfindlichste moosartige Saxi-	sie aber auch in voller Sonne. 5-10 cm. III-IV
fraga. Frischgrünes Laub, weiße Blüten in großer	apiculata Dichte Polatar III
Zahl. 20 cm 0.40	— apiculata. Dichte Polster kleiner, blaugrüner Blatt-
 Rhei. Leuchtend rosa Blüten. 10 cm superba. Größer als vorige, sehr schön. 20 cm 0.40 	rosetten mit schönen, hellgelben Blüten 0.50
trifurcata. Kräftig wachsend mit einer Fülle weißer	Borisii. Hellgelb
Blütchen. 20 cm	— Boydii. Hübsche gelbblühende Hybride 0.60 — alba. Weißblühende Abart der vorigen 0.60
2. Rosettenbildende, krustige Saxifragen 🔾 🛆 🎎	- Burseriana. Kleine, dichte, graugrüne Polster, große
Sie bilden dachwurzähnliche Rosetten und	blendendweiße Blumen
zeichnen sich durch ornamentales, meist silber-	major. In their retten etwas grober wise .!.
graues Laubwerk, sowie ziemlich große Blüten-	hergehende 0.60
stände aus. Sie vertragen, wenn erst einmal festge-	- Elisabellide. Pitt helischweitelgelben Rluman
wachsen, große Trockenheit V-VII	Telulialiai Cobaigi. Diente grangring Doloton
- aizoon. Silbergraue Rosetten, weiße Blüten. 20 cm 0.40	gelben blutchen
— — alpicola. Prächtige Rosetten, gelblichweiße Blü-	— Maaqii. Zahireiche, leuchtend gelbe Ri:
ten. 20 cm	Thybr. L. O. Cousen. Diente Polster mit and
 atropurpurea. Mit dunkelroten Blüten. 20 cm 0.50 balcana. Weißblühend. 20 cm 0.40 	gerben bluten
— elongata. Langgestreckte Blättch., weiß. Blüt. 20cm 0.40	
Clouded Daniel State of the Control	—— IVIrs. Leng. Hubscher Bastard mit mall. Div.
— erecta Aufrecht wachs, Form, Weiße Blut, 20 cm 0.50	— Wirs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich
— erecta. Aufrecht wachs. Form. Weiße Blüt. 20 cm 0.50 — lutea. Gelbblühend. 20 cm 0.50	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich — Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte
— lutea. Gelbblühend. 20 cm 0.50	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 — Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 — marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraus and Live
— lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 — Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 — marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 — Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 — marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster weiß 121
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 — Kolbii. Weißblühend. Zierlich
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.60 oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 alba. Großblumig, weiß
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüt. 0.60
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtond bei
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 — ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 — oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten 0.70 — superba. Großblumige dunkelset 1.1
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 — ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 — oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten 0.70 — superba. Großblumige, dunkelrote Abart 0.70 — pseudosancta. Hellgelbe Blüten
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 — ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 — oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten 0.70 — superba. Großblumige, dunkelrote Abart 0.70 — pseudosancta. Hellgelbe Blüten 0.60 — pungens. Kleine, stachelige Polster, hellgelbe Blüten 0.60
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 — ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 — oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten 0.70 — superba. Großblumige, dunkelrote Abart 0.70 — pseudosancta. Hellgelbe Blüten 0.60 — pungens. Kleine, stachelige Polster, hellgelbe Blüten 0.60 — Salomonii. Siehe S. Boydii alba
— lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich
 lutea. Gelbblühend. 20 cm	— Mrs. Leng. Hubscher Bastard mit gelben Blüten 0.60 Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60 Kotschyi. Gelbblühende Zwergsorte 0.60 marginata eumarginata (Boryi). Silbriggraue nadelige Polster, weiße Blütchen 0.60 — Rocheliana. Kleine feste Polster, weißblühend 0.60 ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80 oppositifolia. Ganz niedr., kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60 — alba. Großblumig, weiß 0.60 — latina. Reichblühende Form, mit purpurnen Blüten 0.70 — splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten 0.70 — superba. Großblumige, dunkelrote Abart 0.70 — pseudosancta. Hellgelbe Blüten 0.60 Salomonii. Siehe S. Boydii alba. sancta. Harte Sorte mit stachelig spitzen, dunkelgrünen Polstern u. leucht. gelben Blütensträußen 0.60

	Sodum album (Fortestrung) 1St.
4. Verschiedenblättrige Saxifragen () $\triangle : = 1 \text{ St. } \mathcal{RM}$	Seduli album (Portsetzung)
Sie bilden meist immergrüne, kräftige, lockere	— micranthum. Frischgrüne, sehr zierliche Blättehen,
Polster und bringen lockere Blütenstände. Bevor-	weiße Blüten. 5 cm
zugen halbschattigen Standort od. sonnige, feuchte	— murale, Mit dunkelroten Blättern u. rosa Blüten.
Lagen V-VI	10 cm
Saxifraga apennina. Immergrüne, lederartige Belaubung	anacampseros. Blaugrüne Blätter u. purpurne Blum. 20 cm
und rosaweiße Blüten. 25 cm 0.50	— anglicum. Sehr kleine, dickliche Blättchen und rosa
— cordifolia und crassifolia. Siehe unter Bergenia.	Blütchen. 5 cm 0.40
- Fortunei. Siebenlappige gezähnte, auf der Unterseite	- corsicum (dasyphyllum). Sehr niedliche, bläulichgrüne
schön rot gefärbte Blätter und schleierkrautartige	Zwergform. 5 cm 0.40
Blütenstände. 30 cm 0.60	- Forsterianum. Rötlichgraue Belaub., gelbe Blum. 20 cm 0.40
geum. Blätter scharf gezähnt und herzförmig, Blüten	- gracile. Niedliches Pflänzchen mit bläulichgrüner Be-
weiß, immergrün. 25 cm 0.50	laubung und weißen Blütchen. 5 cm 0.40
hirsuta. Rundliche, behaarte Blättchen, rosaweiße Blütchen, immergrün. 20 cm 0.50	- Hildebrandii. Sehr zierliche Polster bildend. 5 cm. 0.40
granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit weißgefüllten	— laconicum. Dicke, runde Blätter, weiße Blüten. 10 em 0.30
Blumen, ähnlich kleinen gefüllten Levkojen 0.50	— — minor. Sehr zierlich. 10 cm 0.40
— heucheriloba. Heucheraähnliche, rote Blüten, immer-	- lydium. Grüne Polster, im Winter rot. 5 cm 0.30
grün. 20 cm	— aureum. Laub gelbbläulich. 5 cm 0.40
— alba. Weißblühende Form. 20 cm 0.50	— glaucum. Blaugrüne Polster. 5 cm 0.30
rotundifolia. Herzförmig rundliche Blätter und weiße	- nicaeense (ochroleucum). Schlangenmoosähnliche
Blütenrispen. 30 cm 0.40	Belaubung, gelbe Blüten. 20 cm 0.30
— umbrosa. Immergrüne Blattrosetten mit weißen Blüten-	- reflexum. Blaugrüne, spitzpfriemliche Blätter u. gelbe
ständen. 25 cm	Blüten. 20 cm
— — aurea punctata. Mit gelb punktiert. Belaub. 20 cm 0.40	Trieben, dunkelgrüne Blattfarbe. 20 cm 0.30
— – – robusta. Eine in allen Teilen starkwüch-	— virescens. Saftiggrüne Belaub., gelbe Blüt. 15 cm 0.30
sigere Form, Blätter gelb punktiert. 30 cm 0.40	- rupestre. Ähnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig
— Elliott's var. Reizende Spielart des bekannten Por-	wachsend. 10 cm
zellan- oder Jesusblümchens mit kleinen leuchtend	- sarmentosum. Blaßgelbe Belaubung. 5 cm 0.40
rosa Blütchen. 20 cm	- saxangulare. Rasenbild., f. trockene Lagen, mit feiner,
	grüner Belaub., übersät mit hellgelben Blüt. 5 cm 0.25
Scabiosa, Zwergskabiose, Dipsacaceae O \(\triangle \)	- spurium. Rosablühend, im Schatten sowohl wie in der
— lucida. Zierliche Alpenpflanze mit dunkelgrünen Blatt- rosetten und lilablauen Blütchen. 15 cm VII-VIII 0.40	grellsten Sonne gut gedeihend. 10 cm 0.25
— graminifolia. Silbergraue, grasartige Belaubung und	— album. Weißblühend. 10 cm
hellblaue Blüten. 30 cm VII-VIII 0.50	— — superbum. Siehe Neuheiten 0.50
Parnassii. Siehe Pterocephalus.	roseum superbum. Großblumigste aller spurium
— silenifolia. Rundblättrige Blattpolster, blaue Blüten.	Sorten. Die Blüten sind reinrosa. 10 cm 0.50
20 cm. Selten VII-VIII 0.60	— — salmoneum. Blüten leucht, rot mit lachsfarbigem Schein. 10 cm
- vestina. Schmales Laub, blaue Blüt. 20 cm V1-VIII 0.70	— Schorbusser Blut. Mit prächtig dunkelblutroten
Schivereckia, Entenkresse, Cruciferae ○ △	Blüten. 10 cm 0.70
- podolica (Alyssum pod.). Zierliche, behaarte rosettige	— — splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Frucht-
Polster mit kleinen weißen, arabisartigen Blüten.	kapseln. 10 cm 0.30
15 cm V-VI 0.40	— — splendidissimum. Siehe Neuheiten , 0.50
Scutellaria, Schildkraut, Labiatae ○ △	— Stribny. Moosartige Belaubung, gelbe Blüten. 5 cm. 0.40
- alpina. Prächtige Zwerglabiate mit lilablauen Blüten-	- Sündermannii. Zwergige, blaugrüne Art mit weißen
ähren. 20 cm VII-VIII 0.40	Blüten. 5 cm
- alba. Weiße Form der vorigen. 20 cm VII-VIII 0.50	- turgidum. Kleine rotbraune Blättchen, weiße Blüten . 0.30
rosea. Mit schönen lilarosa Blüten. 20 cm 0.50	— Verlotti. Kleine, nadelförmige Blättchen, gelbe Blüten 0.40
— amana. Schr reichblühend, lilablau. 10 cm VII-VIII 0.50	2. Buschige Sedum, Fettblatt ○ ∞ : △
— orientalis alpina. Herrliche, viele Sommermonate blü-	Bilden meist rundliche Büsche mit gekerbten, dick-
hende Felsenpflanze von kriechendem Wuchs,silber- grauer Belaubung und gelben Lippenblüten, die in	fleischigen Blättchen, welche im zeitigen Herbst
großer Menge erscheinen. 15 cm VI-VIII 0.50	eine herrliche Herbstfärbung annehmen. Sehr
- pinnatifida. Stark gesiederte, wollige Belaubung.	reichblühend VI-VIII
Blüten hellgelb. 15 cm VI-VIII 0.60	— aizoon minor. Mit leuchtend gelben Blumen. 20 cm . 0.30
Sedum, Crassulaceae ○ ∞ △ : :	— cyaneum (Hayesii). Graugrüne Blattrosetten, ähnlich
wachsende, formenreiche, niedrig bleibende, dick-	Ewersii. 15 cm. Selten! 0.40
blättrige Pflanzen, die sämtlich große Trockenheit	— Ewersii. Rosa, sehr spätblühend. 10 cm 0.30
vertragen. Ihrer großen Anspruchslosigkeit wegen	— turkestanicum. Kräftiger als die Stammart, dunkel-
sind sie besonders für Trockenmauern wie ge-	rosa Blüten. 10 cm 0.40
schaffen. In Anbetracht unseres großen Sortiments	— ellacombianum. Halbkugelige, frischgrüne Büsche,
haben wir zwei Abteilungen geschaffen, um so	ovalspatelige Blätter, gelbblühend. 15 cm 0.30 — floriferum. Gezackte Blättchen u. goldgelbe Blüt. 20 cm 0.30
unserer Kundschaft die Auswahl zu erleichtern.	— praecox. 14 Tage früher blühend als vorige. 20 cm 0.30
1. Moosartige Sedum, Sonnenmoos O O A 4	— Hartmannii. Aufrechtwachsend, stumpfgraue Belaub.
Kriechende, meist nadelartige, feste Polster bildende	Blumen weiß. 15 cm
Fettpflanzen, die sich zum Begrünen ganzer Flächen	- hybridum. Echt. Herrliche sich im Winter knallrot
eignen, gleichzeitig aber auch die geborenen Trocken-	färbende Art mit goldgelben Blüten. 20 cm 0.40
mauerstauden sind V-VII — acre. Gelbblühender Mauerpfeffer. 5–15 cm 0.25	- kamtschaticum. Gelb, rundl., gekerbte Blättch. 20 cm 0.30
- elegans. Im Winter silberbunt. 5 cm 0.40	— fol. var. Buntblättrige Art. 20 cm 0.30
— album, Zierliche weißblühende Art. 20 cm 0.30	— Laggeri. Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden. 25 cm 0.40

NI 12 11 11 1 61 1 5 1 1 61 1 61 1	
Niedrig bleibende Stauden Fortsetzung	Sempervivum (Fortsetzung)
Sedum (Fortsetzung)	— capaonicense. Große dunkelbraungrüne Rosetten u.
- macrophyllum atropurpureum. Große, dickfleischige,	gelbe Blumen
dunkelrote Belaubung und gelbe Blüten. 30 cm . 0.40	ranckii (doloiiiiicuiii). Rosetten von trisch griinen
— Middendorffianum. Blätter lineal lanzettlich, bräunlich, Blüten gelb. 25 cm	Farbe, Blumen rötlich 0.30
— diffusum. Lichtgelbe Blüten und grüne, schmale	— glaucum. Blaugrüne Rosetten, hellrote Blüten 0.30 — hybr. Alpha. Rosetten von hellbräunlicher Farbe mit
Blätter. 25 cm	weiß behaarter Mitte. Blüten rosa 0.40
tenuifolium. Ganz fein belaubt, Blum. orangegelb 0.30	- Deld. Kurze, straffe braune Blatter, von denen sich
- obtusifolium. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde	der weiße Flaum gut abhebt. Bliten dunkelrege 0.40
Blätter, sehr schön. 10 cm 0.40	Odiffild. Die Rosetten sind im Friihling von fact
— virens. Grüne Belaubung, gelbe Blüten. 10 cm . 0.40	schwarzbrauner rarbe, in der Mitte weiß :: 1
populifolium. Pappelblättrig, weißblühend. 20 cm . 0.40	sponnen. Bluten purpurrosa
— Sieboldii. Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten	Rounien. Siene Neuhellen
rot. Sehr spätblühend. 20 cm 0.40	melaliculii qiqailleulli. Siehe Neubaitan
 fol. varieg. Herrliche buntblättrige Form. 20 cm 0.50 spathulifolium. Höchst interessante dicksleischige rote 	— Reginae Amaliae. Großrosettig, Blätter saftiggrün
Belaubung, gelbblühend, 10 cm 0.50	mit braunen Spitzen. Blüten gelb 0.50 — ruthenicum. Rosetten weichgrün; die großen Blumen
— virens. Hellsaftiggrüne Belaub., gelbe Blüten. 10 cm 0.50	von leucht, grungelber Parke m wall C/ 1 cm 1 0 70
Selaginella, Mooskraut, Lycopodiaceae () - ● ⊕ ≃	10000 dill. Die gewoniniene, auf 1 Jachern vonless
Die harten Selaginellen sind auch im Winter frisch-	Alt mit großen, dunkelgrunen Rosetton 1
grüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächs-	Totell Dillien
haus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben	Dicolor, Ruschell Zwellarbig rot und L
feuchten, humosen Boden und halbschattige Lagen.	Pyronaconii. Litwas Money wie die Co
- Douglasii. Bräunlich grün, mit zierlich. Blütenährchen.	oraumen gerarbten Rosetten
3-5 cm VII-VIII 0.40	Toodstatti. Ofoste Rosetten intermination
helvetica. Mit längeren Zweigen u. größeren Blüten-	
ährchen. 3–5 cm VII-VIII 0.40	
Sempervivum, Dachwurz, Hauslauch, Crassulaceae	triste. Rötlichbraune Belaubung, dunkelrosa Blüten . 0.40 Senecio, Zwergkreuzkraut, Compositae ○ △
O \otimes \wedge	— abrotanifolius. Große, dunkelgrüne, fein gefiederte
Anspruchslose Fettpflanzen mit dickblättrigen	
Rosetten von hell- und graugrüner, silbergrauer,	adollationas, reingened, hellgrine Relation
brauner und rötlicher Farbe. Aus ihnen erheben	
sich die Stiele mit flachen gelben oder roten Blüten.	Carpainteds. Grune Polster, orangerote D1.
10-20 cm VII-VIII	
Kleinrosettige Sorten.	Siegirean. Tem genederte, ascharona Di
- arachnoideum. Mit weißen Fäden übersponnene,	
bräunlichgrüne Rosetten. Blüten rosa 0.30	monorisis. Schi len genederte Blatten
— minor. Zwergausgabe obiger 0.30 — tomentosum. Rosetten schneeweiß übersponnen . 0.30	bigen Blütenköpfen. 30 cm · · · · VI-VII 0.60 Seseli, Steppenkraut, Umbelliferae O
- arenarium. Saftig grün, mit gelben Blüten 0.30	— caespitosum. Blaugraue, fein zerschlitzte Blätter mit
- bryoides. Kleine, zierliche Rosetten. Sehr selten 0.70	
- Doellianum. Spinnwebartig behaart, grün mit bräun-	Sesleria. Siehe unter Ziergräser.
lichem Schein. Blüten leuchtend rosa 0.30	Shortia, Schortie, Diapensiaceae
- fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen und dadurch	- galdellolla. Seltene Staude mit ledenant:
im ganzen hellbraun wirkend, Blüten rosa 0.30	
globiferum. Kleine, kugelige grüne Rosett., gelbe Blüt. 0.30	
Laggeri. Hellbraun mit weiß übersponnener Mitte und	— euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blitter : 111
roten Blüten	I tour thousand responding the
penicillatum. Halbkugel., grüne Rosett., purpurne Blüt. 0.30	
Pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.30	
- pumilum (anomalum). Kleine, grüne Rosetten mit	- acaulis. Bildet dichte moosart. Polster, kleine, leuchtend rosar. Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. IV-VIII 0.50
bräunlichem Schein, Blüten hellrosa 0.30	— alba. Weißblühende Art IV-VIII 0.50
— soboliferum. Flachkugelige, hellgrüne Rosetten 0.30	Ziernule, templaffrige E
spinulifolium. Kleine, rosa Rosetten, rote Blüten 0.30	Total Didend, heli Osenfol
Mittelgroß- und großrosettige Sorten.	I Stroctaff Oldfielite Form
- alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten,	grandinoid. Lockerer Whiche
Spitzen braun	
atropurpureum. Große violettrote Rosett., gelbe Blüt. 0.40	1 Teraibiditella, Dillmen gianti d
atroviolassum, Salar grafia Resetten 0.30	
- atroviolaceum. Sehr große Rosetten von herrlich braunvioletter Farbe. Blüten braunrot 0.40	in pil Hubsule, getullte Abart dan .
— blandum (rubicundum). Eigenartig schöne, bräunlich	
glänzende Rosetten mit grünen Blattspitzen und	Trialling pictid. Triederliegende Riad.
-Rändern, Blüte rötlich 0.40	
— giganteum. Große Rosett., Spitzen rot, Blum. gelb 0.40	von nelkenähnlicher Form. 15 cm VI-VIII 0.60 - rosea. Einfachblühend, großblumig, zartrosa.
— Boissieri. Grünlaubig, mit roten Blüten 0.30	15 cm VI-VIII 0.70
- Borisii. Siehe Neuheiten	dictite I disterchen und weiß. Div.
- Braunii. Braunblättrige Rosetten, rotblühend 0.30	
— calcareum (californicum hort). Blätter dunkelgrün	de de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra dela contra del la contra del la contra del la contra del la contra
mit schwarzen Spitzen. Blüten rötlich 0.30	10 cm VI-VII 0.60

Silene (Fortsetzung)	Synthyris, Frühlingsschelle, Scrophulariaceae () - ○ △ 1 St.
— rhomodantha. Kleine, lanzettliche Blättchen, weiße	— renitormis. An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen,
Blütenpolster. 10 cm VI-VII 0.50 — saxifraga. Schöne weißliche Blütenkissen.	kerbzähnigen Blättern u. violetten Ahrentrauben. 15 cm IV-V 0.70
20 cm VII-VIII 0.50	Tanacetum, Compositae ○ △
- Schaffa. Lockere rasenbildende Art mit leuchtend rosa-	— argenteum. Niedere, silberblättrige Büsche und gelbe
farbenen Blumen. 10 cm VII-VIII 0.40 Thomassinii. Lockere Rasen mit weiß. Blütchen. 10 cm 0.60	Blüten. 20 cm. Selten V-VI 0.80 Teucrium, Gamander, Labiałae O
Sisyrinchium, Binsenlilie, Iridaceae ○-① △	— chamaedrys O: Il: Niedriges immergrünes Sträuchlein
— anceps. Binsenlilie. Niedliche kleine Iridee mit gras-	mit rosa Lippenbl. im Sommer. Schöne Einfassungs-
ähnlicher Belaubung und dunkelvioletten Blütchen. 20 cm V-VI 0.40	pflanze. Bester Buchsbaumersatz. 20 cm VII-VIII 0.25 — cinereum ○ △ Weißlichgrau, kurz behaart, nadelart.
- bermudianum. Eine herrliche, den ganzen Sommer	Blättchen, weiße Blüten 10 cm VIII-IX 0.60
blühende amerikanische Zwergbinsenlilie mit leuch-	Thlaspi, Täschelkraut, Cruciferae O - 1 A
tend blauen Blüten und grasartiger Belaubung. 25 cm VI-VIII 0.50	— alpinum. Niedere Polster bildend, weiße Rispen. 20 cm V-VI 0.50
- californicum. Ähnlich der vorigen, mit goldgelben	- montanum. Dichte Träubehen weißer Kreuzblüten.
Blüten. 20 cm VI-VIII 0.70 — chiloense. Grasartige Belaubung und gelbe Blüten.	8—10 cm V-VI 0.40 Thymus, Thymian, Labiatae ○ △ ⊕ Ganz niedrige, krie-
20 cm VI-VIII 0.70	chende Polster oder kleine, rundliche Büsche bil-
— convolutum. Mit hellgelben Blüten. 20 cm VI-VIII 0.70	dende Gewächse mit sehr zierlichem, aromatisch
Soldanella, Alpenglöckchen, Primulaceae (▶–●△≅ Höchst interessante Alpenpflanze mit lederartigen,	duftenden Laubwerk, das während der Blütezeit unter den zahlreichen Blüten fast verschwindet.
immergrünen, rundlichen Blättchen und zierlich ge-	Die kriechenden Arten eignen sich auch sehr gut
franste, nickende Blütenglöck chen. Verlangt moorig.	zum Bepflanzen ganzer Flächen VI-VIII — angustifolius. Schmallanzettliche Blättchen, rosa Blüt-
Boden und feuchte Lage. 5—10 cm . IV-V — alpina. Büschel kleiner, rundlich nierenförm. Blätter,	chen. 10 cm
aus denen sich gleich nach der Schneeschmelze	— azoricus. Moosgriine Belaubung, rosa Bliiten. 5 cm. 0.50
zahlreiche Blütenstiele mit Dolden zierlich ge- franster, hängender, lila Glöckehen erheben 0.60	— citriodorus argent. Silver-Queen. Weißbunte Art mit Zitronenduft. 20 cm
— minima. Ganz kleines Pflänzchen mit blauen Blütchen 0.60	— — aureis fol. var. Ähnlich T. citr. Silver Queen, je-
montana. In allen Teilen derber und größer wie die	doch mit goldbunter Belaubung und herrlichem Zitronenduft. 20 cm
vorhergehende und in Gärten leichter gedeihend . 0.70 — pindicola. Die großen, herzförmigen Blätter sind	— dalmaticus. Mit dicht., kurzen, lila Blütentraub. 10 cm 0.40
oberseits dunkelgrün, unterseits weißfilzig behaart.	— Doerfleri, Grau behaarte dichte Polster, rosa Blüten 0.50
Die hängenden, stark gefransten Blütenglöckehen sind rosalila	— Golden Duwarski. Kleine, rundliche Büsche bildend, gelbbuntblättrige Belaub., weißlila Blütchen. 10 cm 0.50
— pusilla. Niedliches Pflänzchen, m. weiß. Blütenglöckeh. 0.60	— herba barona. Kräftigwachsende und stark duftende
Solidago, Zwerggoldraute, Compositae ○ △	Art mit lilarosa Blüten. 15 cm
— brachystachya. Niedliche Büsche bildend, gelbe Blütenrispen. 20 cm VII-IX 0.50	— hybr. Golden Dwarf. Goldgelbe Büsche bildend. 10 cm 0.50
— — robusta. Siehe Neuheiten	— Golden Fleece. Rundliche, goldgelbe Belaubung, Blüten lilaweiß. 10 cm
— multiradiata. Breitblättrige, nordamerikanische Art, mit goldgelben Rispen. 20 cm. Selten. VIII-IX 0.50	— lancicaulis. Starkwüchsige Art mit lilarot. Blüt. 10 cm 0.40
Spergula pilifera. Siche Sagina subulata.	— Marschallianus. Zierliche Ränkehen und schöne rote
Stachys, Ziest, Labiatae ○ △	Blütchen. 5 cm
— corsica ∧ \(\Omega\) Graugrüne rundliche Belaubung u. große,	— Neicoffii. Grau behaarte kräftige Ranken, rosablühend 0.50
hellilafarbige Lippenblütchen. 10 cm . VII-VIII 0.50 — discolor (nivea). Fingerl., aschgraue gesägte Blätter	 rotundifol. Purpurteppich. Siehe Neuheiten 0.60 serpyllum albus. Dichte, frischgrüne Polster mit rein-
u. rahmweiße Lippenblüt. 20 cm. Selten VI-VII 0.60	weißen Lippenblümchen. 5 cm 0.40
— lanata: : Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schön., weißwoll., lanzettl. Blätt. 30 cm VI-VII 0.30	— aureus var. Mit goldbunter Belaub., rosa Blüt. 5 cm 0.50
Statice, Zwergstrandflieder, Plumbaginaceae \bigcirc \triangle	— — carneus. Leuchtend rosa. 5 cm
- auriculaefolia. Niedrige Blattrosetten mit reichver-	Färbung. 5 cm
zweigten rosalila Blütenständen. 20 cm VII-IX 0.50 — globulariaefolia. Rund, spatelblättrig, lilablühend.	— lanuginosus. Hübsche, weißwollige, kriechende Art mit rosafarbenen Blüten. 5 cm 0.40
20 cm VII-IX 0.50	— — splendens. Leuchtend rote Blüten. 5 cm 0.40
— incana pygmaea. Niedere Art mit großen, weißen	— — Annie Hall. Dichte Polster mit zart fleischfarbig- rosa Blüten. 5 cm
Blütenschirmen. 20 cm VII-IX 0.40 Symphiandra, Steinglocke, Campanulaceae ○ △-	— zygus. Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten
— pendula. Langgestielte Wurzelblätter und große,	rosa. 10 cm
weiße, nickende Glockenblumen. 20 cm VII-VIII 0.70	Tiarella, Schaumblüte, Saxifragaceae () — ● △ — cordifolia. Steinbrechart mit herzförmigen Blättern
ymphytum, Beinheil, Borraginaceae ○ ≅ ()—●	und zierlichen, weißen Blüten in lockeren Rispen.
grandiflorum. Eine überaus wertvolle Schattenstaude, die leider bisher noch wenig bekannt sein dürfte.	20 cm IV-V 0.40 — americana. Rot und grün marmoriertes Blattwerk,
Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leichtig-	im Frühjahr besonders schön. 30 cm 0.40
keit den Boden durch den kriechenden Wuchs der Pflanze. Im Frühjahr erscheinen die gelblichweißen	Trachelium, Campanulaceae ○ △
Blüten in solcher Menge, daß sie das Laub voll-	rumelicum. Auf niedlichen Trieben, mit dunkelgrünen, glänzenden, ovalen Blättchen geschmückt, stehen
ständig überdecken u. als ein großer Blütenteppich	die hellblauen Röhrenblütchen in doldigen Köpfen.
erscheinen. 20 cm IV-V 0.40	10 cm , , , VII-VIII 0.80

Riverig bielbende Stauden Fortsetzung	veronica incana (Fortsetzung)
Trifolium, Glücksklee, Leguminosae 🔾 🕮	— rosea. Siehe Neuheiten
	— latifolia Königsblau. Rein enzianfarbene Blüten-
repens quadrifolium atropurpureum. Rein vier-	rienen 30 cm
blätteriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung.	rispen. 30 cm V-VI 0.40
Junge Pflanzen, in kleine Töpfe gebracht, lassen	— Die Perle. Leucht. amethystblau. 30 cm V-VII 0.60
sich sehr vorteilhaft als Glücksklee verkaufen.	- Shirley blue. Leuchtend blaue, wüchsige Form.
10 cm V-VI 0.40	20 cm V-VI 0.50
Trillium, Waldlilie, Liliaceae → → △	— Trenane. Kriechende Art mit goldgelber Belau-
- erectum. In Trachtu. Blütenreichtum wie Tr. grandifl.,	bung und blauen, blattwinkelständigen Blitten-
jedoch mit bräunlichroten Blüten. 30 cm.	traubchen. 15 cm V-VI
	— orientalis. Schöne blaue Blütenpolst, 10 cm, V. VIII
	- repens. Kriechende, rasenbildende Art mit weißen
— grandiflorum. Auf kräftigem Stiel sitzen endständig	Dillitonen o em
quirlig, drei breiteiförmig zugespitzte Blätter, aus	- rhodopea. Sehr schönes, dunkelgrünes, rundliches
deren Mitte sich die schöne, große, dreiteilige	Laubwerk Blumen woistlick 5
weiße Blume entwickelt. 30 cm V-VII 0.80	Laubwerk, Blumen weißlich. 5 cm VII-VIII 0.50
Trollius, Trollblume, Ranunculaceae ○ – ① △ ≅	- spicata alpina. Zwergform mit blauen Blütenrispen.
Siehe auch mittelhohe Stauden.	10 cm VII-IX 0.50
- pumilus. Niedliche Büsche bildend, mit geschlitztem	— Blauer Zwerg. Siehe Neuheiten
Laub und gelben Blumen. 30 cm V-VI 0.60	To chi hone Rusche dunte Il I
	Didtellispe, Dellell
Tunica, Felsennelke, Caryophyllaceae $\bigcirc \bigcirc \triangle \parallel$	lettlinkalross E:-1
- saxifraga. Zierliches, den ganzen Sommer blühendes	von tern glaubt man eine rosa Erika an ach
Felsenpflänzchen mit kleinen, rosaweißen Blütchen.	VII VIII O 10
30 cm V1-V111 0.30	
— — alba plena. Siehe Neuheiten 0.80	- teucrium. Mit blauen, blattwinkelständigen Blüten-
robusta fl. pl. Die Blüte ist bedeutend größer	
als die der Stammform und ist sehr gut gefüllt.	DIUSII did. Mili diinkelblauen Bl.: 4 10
Blütenfarbe zartrosa. Feines, nadelförmiges Laub.	dipd. Weighlubend 10-15
20 cm VI-VIII 0.60	— — coelestina Lichtblau. 10–15 cm V-VII 0.40
— superba plena. Siehe Neuheiten 0.80	——————————————————————————————————————
	- pallida Firanari 11: 1:1 0.40
Tussilago. Siehe mittelhohe Stauden.	— — pallida. Eigenartig bläulichweiß. V-VII 0.40
Umbilicus. Siehe Cotyledon.	Loudon blue. Siehe Neubart
Uvularia, Zäpfchenkraut, Liliaceae → - • △	I TOPOSTIS. ILLICUICINGE, MORERE ROSER LILL IN
— grandiflora. Herrliche, seltene Staude mit nickenden	I mit redditt amethystolauen Blut 15 am W WII
	diba. Diene Neuneiten
goldgelb., wachsartig. Blumen. 30 cm. V-VI 1.50	
Valeriana, Zwergbaldrian, Valerianaceae ○ △ ≅	I ddirectoragen Dintentranhan
- apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten.	30 cm
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50	30 cm
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und	30 cm V-VI 0.30 Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich blair
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80	30 cm V-VI 0.30 Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Frike äbel! 1
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 	30 cm
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 	30 cm
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 	30 cm
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blüten- 	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern ein
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldehen. 10 cm 0.50 	30 cm
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Veratrum. Siehe mittelhohe Stauden.	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii, Siehe Neuheiten
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Verafrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grohmusther il. 1.50
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Verafrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 ges
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Verafrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □ Lockere Rasen oder aufrecht wachsende, niedrige Büsche bildende Dauergewächse von großer	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Verafrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm. 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm. 0.60 buxifolia. Niedere Form mit huvertien.
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldchen. 10 cm 0.50 Verafrum. Siehe mittelhohe Stauden. Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae ○ △ : □ Lockere Rasen oder aufrecht wachsende, niedrige Büsche bildende Dauergewächse von großer	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung u. weißen Blüten. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau gelden!
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung u. weißen Blüten. 30 cm 0.60 glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60 glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm 0.60 — glauca. Von stablblauer Förd
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60 glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm 0.80 epacridea. Mit kleinen mustlich platen.
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60 glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm 0.80 epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm 0.70 Hectori. Mit zartrasa Blüten. 40 cm 0.80 Hectori. Mit zartrasa Blüten. 40 cm 0.70
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter VII-VIII Armstrongii. Siehe Neuheiten 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm 0.60 glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm 0.60 carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm 0.70 coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm 0.60 cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm 0.80 plauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm 0.80 epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm 0.70 Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm 0.60 loganoides. Ähnlich pachgenanten. 0.60
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm Coco Cocoloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm Coloensoides. Blüten hellblauer Färbung. 40 cm Coloensoides. Alphlich nachgenannter, von noch grazi- öserem Aussehen. 20 cm Cocoloensoides. Ähnlich nachgenannter, von noch grazi-
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm V-VI 0.50 — arizonica. Schöne Art mit leuchtend rosa Blüten und niedlicher Belaubung. 5 cm 0.80 — montana. Kräftige Blütenrispen mit groß., rosa Blumen 0.50 — rotundifolia. Mit schönen rosaweißen Blütenrispen . 0.40 — supina. Saftiggrüne Rasen, mit schönen rosa Blütendöldehen. 10 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blüten- rispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Fels- anlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere streng- sten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Be- laubung und lila Blüten. 30 cm Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm Coco Cocoloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Coloensoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressen- ähnliche Belaubung. 40 cm Coloensoides. Blüten hellblauer Färbung. 40 cm Coloensoides. Alphlich nachgenannter, von noch grazi- öserem Aussehen. 20 cm Cocoloensoides. Ähnlich nachgenannter, von noch grazi-
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung unweißen Blüten. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.60 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — 0.60 — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — 0.70 — lectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm — 0.60 — leganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — lycopodioides. Grob mossertisch. Weiten
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung und weißen Blüten. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — 0.80 — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — 0.70 — Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm — 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — 0.60 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau, 20 cm
 apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm Buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung. 30 cm Buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung. 30 cm Buxifolia. 20 cm Buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung. 30 cm Buxifolia. 20 cm Buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung. 30 cm Buxifolia Niedere Form niedere Form niedere Form niedere For
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter Armstrongii. Siehe Neuheiten Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm Buxifolia, Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm Glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm Glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm Coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm Cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm Glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm Glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm Glauca. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm Gloganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm Glycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm Gloganoides. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter. Armstrongii. Siehe Neuheiten. 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm. 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm. 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm. 0.60 — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm. 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm. 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm. 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm. 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm. 0.60 — plauca. Wit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm. 0.70 Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm. 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm. 0.60 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm. 0.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm. 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten 16.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten 16.60
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter. Armstrongii. Siehe Neuheiten. 1.50 Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm. 0.60 Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm. 0.60 buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm. 0.60 — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm. 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm. 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm. 0.60 — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm. 0.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm. 0.60 — plauca. Wit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm. 0.70 Hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm. 0.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm. 0.60 — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm. 0.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm. 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten 16.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg. Blüten 16.60
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — o.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — o.60 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — o.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — o.60 — glauca. Wit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — o.60 — hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm — o.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm — o.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm — o.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg., Blüt. weiß. 40 cm — o.60 — Iraversii. Blättchen 4 reihig. Blüten.
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung unweißen Blüten. 30 cm — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — 0.60 — glauca. Wit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — 0.70 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — 19copodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm — 0.60 — monficola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm — 0.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg., Blüt. weiß. 40 cm — 0.60 — Iraversii. Blättchen 4 reihig, Blüten weiß, sehr zart.
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung unweißen Blüten. 30 cm — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — 0.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — 0.70 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — oglauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — oso — epacridea. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — oso — oso — plauca. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Kit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — oso — plauca. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Mit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Kit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Kit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso — plauca. Kit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — oso —
— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm	Neu-Seeländ. Veronica / Sämtlich kleine, immergrüne Halbsträucher mit hübschen Erika ähnlichen Blütenrispen. Sie verlangen geschützten, sonnigen Standort und eignen sich sehr gut zur Bepflanzung von Felsanlagen. Gegen starken Frost mit Laub und etwas Tannenreis geschützt, überdauern sie unsere strengsten Winter — Armstrongii. Siehe Neuheiten — Bidwilliae lilacina. Mit grobmyrthenähnlicher Belaubung und lila Blüten. 30 cm — 0.60 — Buchananii. Schöne graublaue Belaubung. 30 cm — 0.60 — buxifolia. Niedere Form mit buxartiger Belaubung uweißen Blüten. 30 cm — glauca. Mit blauschimmernder Belaubung. 30 cm — o.60 — carnosula. Zwergausgabe von V. pinguifolia. 20 cm — o.60 — coloensoi. Gelblichgrüne, myrthenähnliche Blättchen und lila Blüten. 30 cm — cupressoides. Blüten hellblau, goldgelbe, cypressenähnliche Belaubung. 40 cm — o.60 — glauca. Von stahlblauer Färbung. 40 cm — o.60 — glauca. Wit kleinen, rundlichen Blättchen. 10 cm — o.60 — hectori. Mit zartrosa Blüten. 40 cm — o.60 — loganoides. Ähnlich nachgenannter, von noch graziöserem Aussehen. 20 cm — lycopodioides. Grob moosartiger Wuchs und Belaubung. Blüten blau. 20 cm — o.60 — monticola. Ähnlich pinguifolia. jedoch mit kleinerem Blattwerk. Blüten weißlichlila. 40 cm — o.60 — pinguifolia. Blättch. kaum 12 mm lg., Blüt. weiß. 40 cm — o.60 — Iraversii. Blättchen 4 reihig. Blüten.

Vicia, Wicke, Leguminosae (▶-♠ △ 1St.	Viola (Fortsetzung) 1 St. R.M.
- oroboides (lathyroides). Tiefdunkelblaue Blüten.	Verschiedene wertvolle Arten:
30 cm VI-VII 0.50 Vinca, Immergrün, Apocynaceae	— Bertolinii. Schöne blaublühende Polster bildend. 15 cm.
immergrüne Gewächs unserer Wälder und seine	Selten IV-V 0.70 — biflora. Stumpf nierenförmige Blätter u. sehr zierliche,
Abarten mit lederartiger Belaubung und bunten Blüten im zeitigen Frühjahr. Herrliche Boden-	kleine, goldgelbe Blüten. 3 cm V-VI 0.50
bedeckungspflanze für schattige Lagen, wächst aber	— floraviensis. Hybride aus V. cornuta und V. rotho- magensis mit weiß und blau gesprengelten Blüten.
bei genügender Feuchtigkeit ebensogut an sonnigem Standort V-VI	10 cm V-VIII 0.50
— minor. Blaublühend. 10 cm 0.30	— papilionacea (cucullata grandiflora). Pfingstveil- chen. Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten.
— Bowles var. Siehe Neuheiten 0.70 — coerulea pl. Blaublühend, gefüllt. 10 cm 0.70	20 em V-VI 0.30
— fl. alba. Weißblühend. 10 cm 0.40	— alba. Mit weißen Blumen. 20 cm V-VI 0.30 — purpurea. Prächtig purpurviolett, sehr großblumig.
— fol. aurea var. Goldbuntblättrig. 10 cm 0.40 — — argenteis. Silberbuntblättrig. 10 cm 0.40	20 em V-VI 0.40
— rotundifolia. Mit rundlichem Blattwerk. 10 em . 0.40	- Vilmorinii. Goldgelb blühend. 15 cm V-VI 0.50
— rubra. Rotblühend, einfach. 10 cm 0.40 — plena. Rotblühend, gefüllt. 10 cm 0.40	Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen, Violaceae •••••••••••••••••••••••••••••••••
— major. Großblättrig, dunkelgrün, sehr üppiger Wuchs,	Sämtliche angeführten Sorten eignen sich auch
großblumig blau. 20 cm 0.40 — acutiloba. Siehe Neuheiten	vorzüglich zum Treiben III-IV und VIII-IX — — Admiral Avellan. Purpurviolett, auf langen Stie-
— — aurea maculata. Gelbbuntblättrig, blaublüh. 20 cm 0.40	len. 20 cm
— fol. variegatis. Weißbuntblättrig, blaublühend, verlangt schwache Fichtenreiserdecke. 20 cm 0.40	— — Askania. Großblumig, dunkelblau, edle Blütenform. 20 cm
Viola cornuta, Hornveilchen, Violaceae ○: 1: △ X Rasen-	— — Deutsche Kaiserin. Blaugefüllt. 15 cm 0.60
artige, frischgrüne Büsche bildend m. groß. Veilchen- blumen während des ganzen Sommers. Sie verlangen	— — Donau. Große tief blaue Blüten auf 16-18 cm hohen Stielen
zum guten Gedeihen nahrhaften Boden V-1X	— — fl. alba. Weiß, großblumig. 15 cm 0.30
— — Altona. Farbe cremegelb, in Wuchs und Blüh- willigkeit wie die bekannte Sorte "Hansa" 0.40	schwarzblau. 20 cm
— — alba. Mit schneeweißen Blumen den ganzen Sommer	— Hedwig Bernock. Außerordentlich reichblühend, von tiefdunkelblauer Farbe
bedeckt. 15 cm	— — Kaiser Friedrich. Großblumiges Treibveilchen,
veilchenblauer Farbe, so daß sie als Ersatz für	hellblau. 20 cm
Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind 0.30 — Hansa. Auf 15 cm langen Stielen sitzen große, in-	blütig und leicht treibbar. 15 cm 0.30
tensiv blaue Blumen in reicher Fülle 0.30 — Irmgard Langer, Mit helleren Blüten, Sehr reich-	— La France. Große, violette, schön geformte Blumen auf kräftigen Stielen. 20 cm
blühend. 20 cm 0.40	— Noelie. Außerordentlich reichblühend, blau. 20 cm 0.30
— — Jackanapes. Siehe die Verbesserung "Spaßvogel" — — Johanna Langer. Ähnlich V. c. Gustav Wermig,	— Princesse de Galles. Großblumig, samtblau. 20 cm 0.30 — Riese von Botnang. Großblumig und langsticlig,
mit dunkelblauen Blumen, 15 cm 0.40	dunkelblau. 15 cm 0.30
— — Spaßvogel. Siehe Neuheiten	— Rose Perle. Herrlich leuchtendes Rosa, ein Kleinod unter den Frühlingsblumen. 15 cm 0.40
Wermigveildens. Der Wuchs ist viel kompakter	— rubra fl. pl. Gefülltes rotes. 15 cm — Schwabenmädchen. Vorzügliche Verbesserung
und die Farbe intensiver blau. 15 cm 0.30 Viola cornuta hybr. grandiflora O & Großblumiges	— — Schwabenmädchen. Vorzügliche Verbesserung von Königin Charlotte, mit längeren Stielen, Blu-
Hornveilchen V-IX	men doppelt so groß und tiefdunkelblau. 15 cm. 0.30 — sulphurea. Das erste gelbe, wohlriechende Veil-
— Ada. Riesenblum. Form mit violettblauen Blüten. 15 cm	chen, stark duftend. 15 cm
— — Agnes Kay. Großblumig, 6-7 cm Durchmesser,	— Triumpf. SieheNeuheiten
zarthellila. 15 cm	— alpina. Schmallanzettliche, grüne Blättehen und tief-
dankbar blühende Sorte mit dunkel veilchenblauen,	rosa Blüten. 10 cm IV-V 0.40
zahlreichen Blumen. 15 cm 0.40	Waldsteinia, Ungarwurz, Rosaceae 🕦 – 🐧 🛆
— — Ardwell Gem. Gelb mit schwarzer Zeichnung in der Mitte. 15 cm	— geoides. Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze mit immergrünem, lederartig. Laub. 30 cm IV-V 0.30
— — Lemon Queen. Zitronengelb. 15 cm 0.40	— frifolia. Mit dreizähligen Blättern und gelben Blüten.
— — Maggie Mott. Zartlila Blumen. 15 cm 0.40 — — Seagull. Große, schneeweiße Blumen. 15 cm . 0.40	Wulfenia, Kuhtritt, Scrophulariaceae D — ♠ △
— gracilis Clarence Elliot. Weißblüh. m. verwaschenem	— Baldaccii major. Großblumig, blaublühende, seltene
blauen Rand. 15 cm IV-VIII 0.40 — Alabaster. Siehe Neuheiten 0.60	Art. 20 cm
— — Juwel von Eisenach. Etwas größere Blumen wie die	— carinthiaca. Mit blauen Blütenrispen u. immergrüner, primelartiger Belaubung. 20 cm V-VI 0.60
Stammart, von gleicher samtig dunkelvioletter Farbe 0.40	— — alba. Weißblühende Art. 20 cm. Selten V-VI 1.—
— Lord Nelson. Außerordentlich früh- und reichblühend, Blumen tiefpurpurviolett. 15 cm 0,40	Zauschneria, Kolibriblume, Oenotheraceae O A
— — lutea. Varietät mit goldgelben Blumen. 15 cm 0.40	arizonica. Siehe Neuheiten
Strolch, Siehe Neuheiten 0.80	lachroten fuchsienartigen Blüten 30 cm VII-V 060

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Kein Garten ohne Farbenfreudigkeit, keine Farbenfreudigkeit ohne Stauden! Es gibt wohl auch keine Pflanzengruppe von so großer Vielgestaltigkeit und allgemeiner Verwendbarkeit. Dabei handelt es sich bei Stauden nicht etwa um Luxuspflanzen kostspieliger oder schwieriger Kultur, sondern um bescheidene Wesen von höchstem Persönlichkeitswert. Es bedarf nur einer einmaligen Anschaffung und allergeringstem Aufwand für Pflege, um sich jahrzehntelang an dem herrlichsten Blütenflor erfreuen zu können.

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir zu Beginn des Kataloges **Sortimente unserer Wahl** angeboten, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie dies unsere Kunden in jedem Jahre von neuem bestätigen. Weiter stellen wir Ihnen auch unsere jahrzehntelange Erfahrung zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne und unverbindlich über alle Fragen der Gartengestaltung, Sortenwahl usw.

Sämtliche Pflanzen werden mit Namenschildern geliefert.

Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae O \(\preceq\) 1 St. — longifolius. Schönes, gezähntes Blattwerk, Blüten purpurrosa, eine lange Ähre bildend. 60 cm VI-VIII 0.50	Actaea (Fortsetzung) — spicata. Weiße Blütenrispen, schwarze Beeren.
Achillea, Schafgarbe, Compositae ○ ∞ □ ¾	— rubra. Blüten weiß, Beeren rot. 60 cm. VII IV
Anspruchslose Dauerstauden mit kleiner lanzett- licher oder starkgefiederter, dunkelgrüner oder silbergrauer Belaubung u. prächtigen Blütendolden.	Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae O-D Bulleyana. Hübsche glockenblumenartige Staude aus China, die an stark verzweigten Stielen eine Masse
filipendulina Parkers Var. Flach gewölbte, leuchtend goldg. Dold., graugrüne Belaub. 100 cm VII-IX 0.50	- Farreri. Eiförmige, grob gezähnte Plitt
- holosericea. Siehe Neuheiten	— polymorpha. Zahlreiche, dunkelblaue, mittelgroße,
— millefol. Crimson Beauty. Große, dunkelpurpurrote Blütendolden die nicht verblassen. 50 cm VI-VIII 0.40	50 cm
 Kelwayi. Dunkelgrüne stark gefiederte Belaubung, Blütenfarbe dunkelrot u.konstant. 50 cm VI-VIII 0.40 ptarmica fl. pl. Boule de Neige. Nadelförmige, ge- 	— podagraria fol. var. Für trockene und feuchte Stellen, mit weiß marmorierten Blättern, 30 cm.
kerbte Belaubung, Blumen gefüllt, große weiße Sträuße blühend. 60 cm VII-X 0.40 — Perry's Weiße. Gutgefüllte aus breiten Petalen	Agrostemma coronaria. Siehe Lydnis.
bestehende schneeweiße Blumen. 80 cm VII-X 0.40 — sibirica Ebba Kjerulf. Ähnlich A. ptarmica mit großen,	Allium. Siehe niedere Stauden. Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidassas Communications
reinweißen, einfachen Blumen. 60 cm. VII-IX 0.40 taygetea. Siehe Neuheiten	- aurantiaca. Dichtbeblätterte Stengel, an denen dunkel- orangegelbe, trichterförmige Blumen erscheinen. 40 cm
Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae O— Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, ritterspornähnlicher Belaubung und großen Blütenrispen.	— ficifolia. Gut ausdauernde Malve mit geschlitzter Be-
- Fischeri, Tiefblaue Art. 80 cm VIII-IX 0.80 - var. Wilsonii, Lange Rispen hellblauer Blumen. Spätblühendste Sorte, 150 cm VIII-X 0.60	- rosea fl. pl. Gefülltblühende Malve. Bekannte,
 lycoct. pyrenaicum. Gelbblüh. Art. 80 cm VII-VIII 0.50 napellus. Blaue, bekannte Art. 120 cm . VII-IX 0.40 album. Mit weißen Blütenrispen. 120cm VII-VIII 0.50 	gefüllt. 200 cm VII-IX 040
— bicolor. Blau und weißfarbig. 150 cm VII-VIII 0.50 — carneum. Fleischfarbigrosa. 100 cm. VII-VIII 0.50	Amsonia, Amsonie, Apocynaceae O— 1 — latifolia. Einfache Triebe mit wechselständigen Blättern. Bläuliche Blum.i. endständ. Dold. 70 cm VI-VIII 0.60
 praecox. Dunkelblau. Frühblüh. 120cm VI-VIII 0.50 paniculatum nanum. Niedrig bleibende Varietät mit leucht. blauviolett. Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60 	Anaphalis, Peripfötchen Composite a
 rostratum coerul. Leuchtend blau. 120 cm VII-IX 0.50 Spark's Var. Dunkelste all. blauen. 150 cm VII-IX 0.50 Stoerkianum. Ähnlich A. napellus. Blumen violett. 	blumen. 40 cm VII-VIII 0.40
120 cm VII-VIII 0.50 — volubile. Riesige Rispen, dunkellavendelblau.	Anchusa, Ochsenzunge, Borraginaceae O-O D italica Dropmore. Anschnliche, buschige Staude mit zungenförmiger Belaubung, pyramidale Rispen,
150 cm VIII-IX 0.60 Actaea, Christophskraut, Ranunculaceae ○─① ≅ □	leuchtend enzianblau. 120 cm VI-VIII 0.40 — Opal. Mit schön., himmelbl. Blüt. 120 cm VI-VIII 0.50 — Morning Glory. Straffe, verzweigte Stiele m. großen
Robuste Schmuckstauden mit zwei- bis dreifach ge- fiedertem Blattwerk und prächtig weißen Blüten- ähren, ähnlich Cimicifuga, aber früchtebringend.	Blüten von reinstem Dunkelblau. 120 cm VI-VIII 0.50 — Picotée. Nied., hellbl. Art. 100 cm . VI-VIII 0.50 — myosotidiflora. Kaukasusvergifmeinnicht. Herz-
- alba. Echt. Mit scharf eingeschnitt. Blätt., Beeren weiß, auf verdickt., rot. Stiel. Selten. 100 cm VII-IX 1.50	förmige Blätter und tiefblaue, vergißmeinnicht- artige Blumen. 50 cm IV-V 0.50

Anemone, Japanische Herbst - Anemone, Ranuncu- 1St.	Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae O - D A Wert- 1 St.
laceae ○- □ □ X ∧ Vom zeitigen Herbst bis in den RM	volle harte elegante Staude mit doppelt dreizähliger RM
Frost hinein blühend. Die Blumen gleichen großen,	Belaubung und interessant geformten Blüten in
feingeformten Wildrosen mit goldgelben Staub-	schönen Farbtönen V-VI
	- chrysantha Calladh with and lan San 70 040
gefäßen. Im Winter 15 cm Laub- oder Torf-	- chrysantha. Goldgelb mit besond. langem Sporn. 70 cm 0.40
beschüttung nötig VIII-IX	— — alba. Reinweiß. 60 cm
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	— coerulea. Blüten innen reinweiß, außen blau. 70 cm 0.40
10 feinsten Sorten unserer Wahl zu RM 40	— — hybr. (haylodgensis). Hybriden in feinsten Tönen,
25 Stück zum 100 Preis.	sehr langstielig und langgespornt. 70 cm 0.40
	— rosea. Zartrosablühend. 70 cm 0.50
— japonica Brillant. Hellmagentarot. 50 cm 0.50	— formosa. Rote, aufrechtstehende gefüllte Blüten. 50 cm 0.40
— Bühler Kind. Siehe Neuheiten 0.80	- bybr atroviolacoa Dunk-Illana Plitana 70 - 0.40
— Honor. Jobert. Schneeweiß, bes. dauerhaft, 80 cm 0.50	— hybr. atroviolacea. Dunkelblaue Blüten. 70 cm 0.40
— hupehensis. Leuchtend malvenrosa, früh- und	— Crimson Star. Siehe Neuheiten 0.80
reichblühend, 70 cm	— Kupferkönigin. Mit kupferfarbigen Blüten. 60 cm 0.50
— — Herzblut. Siehe Neuheiten 2.—	— oxysepala. Weißlichgelb mit blau. 60 cm 0.50
	Skinneri. Langspornige Blumen. Rot mit gelb. 70 cm 0.40
praecox. Siehe Neuheiten	— vulgaris hybr. Großblumige Varietäten, feinstes Far-
superba. Kreuzung der Anemone hupehensis	benspiel. 60 cm 0.40
mit japonica, große Blüten, dunkelrosa. 80 cm 0.60	- fl pl Mit dichter filler Plitter 40 0.40
— — splendens. Leucht. rot u. äußerst reichbl. 80 cm 0.60	—— fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten. 40 cm 0.40
— — Klein Rottraut. Siehe Neuheiten	– nivea grandiflora. Reinweiße Blumen. 50 cm 0.40
— Königin Charlotte. Zartrosa, großblumig. 80 cm. 0.50	— — Siehe auch niedere Stauden.
- Kriemhild. Halbgefüllt v. weinrötl. Farbe. 80 cm 0.60	Aralia, Aralie, Araliaceae ○ ⊥
	— cachemirica. Sehr dekorative hohe Blattstaude mit
— Le nein Rose. Kompakte Form, rosa gefüllt. 40 cm 0.60	
— Loreley. Halbgefüllte, zartrosa Blumen. 50 cm. 0.50	weiß. Blüt. u. schwarz. Beeren. 100 cm VII-VIII 0.80
— — Luise Ühink (Schneekönigin). Schneeweiße, edel-	— californica. In allen Teilen robuster als vorige. Selten.
geformte, vielblättrige Blumen. 80 cm 0.60	120 cm VII-IX 1.—
— Margarete. Siche Neuheiten	Argemone, Stachelmohn, Papaveraceae ○ ∞ □
— — Max Vogel. Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt 0.60	- platyceras. Ähnlich einer Romneya coulteri. Blau-
— — Mont rose. Rosa gefüllt. 60 cm 0.50	
Prinz Hoinrich Confilming Junicalizate 60 and 0.60	grüne, papaverähnliche Belaubung. Fruchtkapsel
— Prinz Heinrich. Großblumig, dunkelrot. 60 cm . 0.60	und Stengel bestachelt. Sehr großblumig, weiß.
- Rich. Ahrens. Rahmweiß, mit lila Schein, groß-	40 cm VII-VIII 0.70
blumig. 80 cm	Arnica , Wohlverleih, Compositae ○ – ① □
— — Schwarzwälderin. Großbl., ganz zartrosa. 80 cm 0.60	— amplexicaulis. Schmalblättrige Belaubung, gelbe Blü-
- Stuttgardia. Lebhaft dunkelrosafarbig, mit großen,	ten in großer Zahl. 50 cm VI-VIII 0.50
edelgeformt., stark halbgefüllten Blüten, kompakter	
Wuchs. 80 cm	— longifolia. Siehe Neuheiten
- Weißer Riese. Sehr große, weiße Blumen auf	— Siehe auch niedere Stauden.
	Artemisia, Edelraute, Compositae ○ □ X ⊥
festen, hohen Stielen. 80 cm	- vulgaris alba (lactiflora). Schöne Staude mit stark
— Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm 0.50	gesiederter Belaubung u. milchweißen, sederartigen,
Anemone, verschiedene: ○ - ① □ ×	
— canadensis (pennsylvanica). Stark gefiederte Belau-	wohlriechenden Rispen. 150 cm., VIII-X 0.50
	Arum, Aronstab, Araceae () – ● ≅
bung, weiße A. nemorasa-ähnliche Blüten, spät-	— italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin
blühend, robuste Art. 40 cm V-VII 0.50	leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70
- Levillei. Reich verzweigte Blütenstiele, auf denen die	
großen weißen Blüten sitzen. 40 cm. VI-VII 0.60	Aruncus, Geifsbart, Rosaceae ○ - ① ⊥ ≅
- polyanthes. In Tracht wie A. rivularis. Blätter 5 bis	- silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gesiederte
	Belaubung u. federbuschartige weiße Blütenrispen.
7 lappig, Blumen bläulichweiß. 40 cm VI-VII 0.70	120 cm VII-VIII 0.50
— rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten, mit	— — Kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaubung und
blauen Staubfäden. 50 cm VI-VIII 0.50	weiße Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70
- silvestris. Reinweiß, ähnlich der Anemone japonica.	- sinensis. In Tracht wie A. silvester, jedoch 4 Wochen
40 cm V-V1 0.40	später blühend. 150 cm VIII-IX 0.70
- Frühlingszauber. Glockenförmige große Blume.	Asclepias, Seidenpflanze, Asclepiadaceae O 🗘 🗆
40 cm V-VI 0.60	— purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote
, — — fl. pleno. Dicht gefülltblühende Form.	Blütendolden. 70 cm VII-VIII 0.60
40 cm V-VI 0.60	
	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange-
- Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen.	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange- farbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0,70
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange- farbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ — () ⊥ Ӽ
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange- farbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0,70
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - → ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, voll-
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen
 — Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Ge-
 — Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher
 — Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen 	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert.
 — Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange- farbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ — ① ⊥ ¾ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, voll- ständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Ge- wächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
 — Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ¾	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ¾ — Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit doppelt fieder-	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - ① ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ¾ — Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit doppelt fiederteiligen Blättern und schönen margueritenartigen	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - () ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ¾ — Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit doppelt fieder- teiligen Blättern und schönen margueritenartigen goldgelben Blüten. 40 cm	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - () ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ○ □ ¾ — Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit doppelt fieder- teiligen Blättern und schönen margueritenartigen	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - () ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm VII-IX 0.80 — tomentosa. Ähnlich A. jap. hupehensis. Blumen lilarosa. 40 cm VII-IX 0.60 Anthemis, Kamille, Compositae ○ ○ □ ¾ — Kelwayi. Stark duftende Pflanze mit doppelt fieder- teiligen Blättern und schönen margueritenartigen goldgelben Blüten. 40 cm	— tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orange- farbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - () ⊥ ¾ — filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, voll- ständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Ge- wächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm
— Wiener Wald. Besonders große, weiße Blumen. 40 cm V-VI . 0.50 — vitifolia. Blätter 7 teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm VII-IX . 0.60 — Farreri. Einblättrige Anemone. Große rosa Blumen. 40 cm	 tuberosa. Große Doldentrauben leuchtend orangefarbiger Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70 Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ○ - () ⊥ ¾ filicinus. Eine aus dem Kaukasus eingeführte, vollständig winterharte Staude. Ihre frischgrünen Wedel erinnern sehr stark an die altbewährte Gewächshausart Asparagus plumosus und sind daher zur Schnittgrüngewinnung von allergrößtem Wert. 150 cm

Aster novi-belgii (Fortsetzung)	Astilbe Arendsii (Fortsetzung) 1 St. **RM**
- Perrys Pink Improved. Rein leuchtend rosa. 100 cm 0.40	— — Bergkristall. Lange schmale, gut verzweigte Blüten-
- Perrys Weiße. Sehr reichblühend, reinweiß. 100 cm 0.50	rispen von schneeweiß. Farbe; später als A. Diamant 0.50
— Pink Nymph. Siehe Neuheiten 0.80	— Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung er-
- Queen of Colwall. Halbgerüllte, richengroße,	heben sich die zierlich überhängenden, schneeweißen
malvenfarbige Blumen. 100 cm 0.50	Blütenrispen. 60 cm 0.60
— Rachel Ballard. Rosa, gefüllt, sehr reichblüh. 120cm 0.50	— — Diamant. Aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe 0.50
— Red Rover. Siehe Neuheiten 0.70	— Else Schluck. Dichte, gut verzweigte Rispen in
— Rosalinde. Leuchtend rosarot. 80 cm 0.40	leuchtend karminroter Farbe. 70 cm 0.60
Royal blue. Tiefblaue Blumen, die im Aufblühen	— — Erna Dick. Schlanke fedrige Rispen von zartlila
gefüllt erscheinen. 120 cm 0.50	Färbung mit lachs Schein. 80 cm 0.60
- Sam Banham. Aufrechtwachs., weiße Blum. 120 cm 0.40	— — Fanal. Siehe Neuheiten 0.80
Saturn. Lockere Rispen, hellila, unempfindl. Blumen 0.40	— Frieda Klapp. Aufrecht. Wuchs, karminpurp. 60 cm 0.60
- Schön Rottraut. Kleinblum., leucht. rosarot. 50 cm 0.40	- Gertrud Brix. Mit leuchtenden, dunkelkarmin-
- Snowdrift. Große, schneeweiße, halbgefüllte Blum. 0.50	purpurnen Blüten. 70 cm 0.60
— Stuttgarter Dunkelblaue. Großblumig, dunkelblau 0.40	— — Gloria. Die niederen Büsche bringen dichte, federige
— Thora Perry. Zartlavendelrosa, gefüllte Blumen in	Blütenrispen. Farbe leuchtend dunkelrosa. 40 cm 0.50
dichten Sträußen. 120 cm 0.50 — Weiße Climax. Riesenblumig, reinweiß. 150 cm 0.40	— Gloria purpurea. Mit dunkelroter Belaubung und
Aster novae-angliae. Blätter u. Stengel stark behaart.	leuchtend roten Blüten, 40 cm 0.60
Sehr großblumig und reichblühend IX-XI	— Granat. Farbe leuchtend dunkelkarmin. 90 cm 0.60
- Barr's Pink. Große, leuchtend dunkelrosa Blüten in	— Grete Bücher. Leucht. dunkles lachskarmin. 70 cm 0.60
riesigen Büscheln. 150 cm 0.50	— Grete Püngel. Kräftiger Wuchs, gesunde Belaubung. Blüten hellrosa. 70 cm
— — Constance. Große, dunkelviolette Blumen. 150 cm 0.50	— Gunther. Pyramidale Rispen leucht. hellreinrosa 0.40
— — Kate Blomfield. Große, dunkelkarminrote Blumen	— Hanna Stodt. Leuchtend karminrosa. 60 cm 0.60
mit bronzefarbener Mitte. 150 cm 0.60	— Hyazinth. Straffe dichte Rispen von leuchtender
— Lill Fardell. Festgetragenes Blütendach von leuch-	lilarosa Färbung. 80 cm
tend frischrosa Farbe. 180 cm 0.40	— — Ilse Haack. Schöne pyramidale Rispen von schneeig-
— Mrs. J. F. Raynor. Dunkelkarminrot. 180 cm 0.40	weißer Farbe. 90 cm 0.60
- Rycroff Pink. Blumen leuchtend rosarot. 150 cm. 0.50	— — Irene Rottsieper. Zierliche, reichverzweigte Rispen,
Ireasure. Auffallend dunkelviolettblaue Blumen . 0.40	reinlachsrosa, 60 cm 0,60
- W. Bowman. Mit großen violettblauen Blumen . 0.40	— — Kriemhilde. Hellachsrosa. 100 cm 0.50
Kleinblumige Herbstaster-Sorten IX-XI	— — Lachskönigin. Lachsrosa. 60 cm 0.50
Aster cordifolius. Die eleganten dünnen Zweige bedecken	— — Lilli Goos. Große, locker pyramidal gebaute Rispen
sich dicht mit kleinen hellila Blüten. 100 cm 0.40	von leuchtend dunkellachskarmin Färbung. 80 cm 0.60
- elegans. Vornehme, graziöse Sorte, mit lichtlila	— Lydia Hagemann. Große, lachsrosa Rispen. 80 cm 0.60
Blüten. 120 cm	— Opal. Breite, federige Rispen von schöner licht-
— Ideal. 100 cm hoch, äußerst zierlicher Wuchs, dicht besetzt mit kleinen lila Blüten 0.50	lila Farbe, 50 cm
— major. Robuste, großblumige Form. 120 cm 0.40	- Rubin, Kräftige Rispen, dunkelkarmin, 90 cm., 0.50
— Vergißmeinnicht. Vergißmeinnichtblaue Blüten in	- Walkure. Von frischer hellrosa Farbe mit lachs-
großer Fülle. 100 cm 0.50	farbenem Schein. 50 cm
— Datschii Findelkind. Die spätest blühende, reinweiße	— Weiße Gloria. Ein Gegenstück der beliebten Gloria. Reinrahmweiß. 40 cm
Aster. 100 cm	
— Finale. Karminrosa, sehr spätblühend. 100 cm 0.40	Treib-Astilben, die sich aber ebensogut als Freiland-
— ericoides Caterham Gem. Übersät mit schneeweißen	pflanzen für seuchte od. halbschattige Lagen eignen.
Blüten. 100 cm 0.40	40-50 cm VI-VII
- Erlkönig. Ähnlich der vorigen, mit etwas lila ange-	Astilbe japonica hybrida Bonn. Von schön gedrungenem
hauchten Blüten. Ebenso reichblütig. 120 cm 0.40	Wuchs. Die gut geformten Rispen sind von leucht.
- Golden Spay. Kleinblumig, gelblichweiß. 120 cm 0.50	dunkelkarminrosa Färbung mit lachs Schein 0.60
- Schneefanne. Die kleinen an Aster Datschii er-	- Bremen. Feingesiederte Belaub., zierliche, volle
innernden weiß. Blüt. erscheinen in solchen Massen,	Blütenrispen, leucht. dunkellachskarmin Färbung. 0.60
daß sämtliches Laubwerk darunter verschwindet 0.40 — Shortii. Mit lilablauen Sternblüten übersät. 100 cm 0.50	Deutschland. Gesunde Belaubung, kräftige,
Aster, verschiedene:	besond. schön geformte Blütenrispen von blendend
— dumosus Hybriden. Siehe Neuheiten.	weißer Farbe 0.60
— linariifolius. Siche Neuheiten	Emden. Dichte Rispen, große Einzelblüten,
- puniceus pulcher. Hohe, straffe Aster mit üppigen,	herrlich lilarosa
lilienweißen Blumen. 180 cm IX-XI 0.50	Europa. Die herrlichen, dichtfedrigen Rispen
- Robinsonii. Siehe Neuheiten 1.50	von pyramidaler Form haben reine, hellrosa Farbe 0.60
- umbellatus. Hellgrüne weidenähnliche Belaub, riesige	— — Köln. Über kompaktem Laubbusch erheben sich
weiße Blütendolden. 200 cm VIII-IX 0.50	gedrungene, dichte Rispen von leuchtend dunkel-
— roseus. Rosablühende Form der vorigen.	scharlachkarmin Farbe 0.60
200 cm VIII-IX 0.70	— — Rheinland. In Wuchs u. Rispen unübertroffen,
Astilbe, Prachtspiere, Saxifragaceae O-0 \(\sigma \sigma \)	herrlich leuchtend rosakarmin 0.60
Eine der schönsten und wertvollsten Stauden.	Verschiedenartige Astilben.
Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen,	The state of the s
äußerst dekorativen Blütenrispen, sollte sie in	Astilbe Davidii. Große Rispen mit zierlichen Blüten von lilapurpurrosa Färbung. 150 cm VII-VIII 0.60
keinem Garten fehlen. Verlangt feuchten Boden oder Halbschatten. Wir liefern ein feines Sortiment	- koraeensis. Siehe Neuheiten
von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 40.— VII-VIII	and the state of t
Astilbe Arendsii Anita Pfeifer. Aufrechte breite Rispen,	— Iaquetti. Kleine unterirdische Ausläufer treibend. Die aufrechten fedrigen Blütenstiele sind von leuchtend
leuchtend lachsrosa, 70 cm., 0.60	lila Farbe, 60 cm. VII-VIII 0.60

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Campanula (Fortsetzung)
Astilbe Taquetti (Fortsetzung)	0.4
— superba. Siehe Neuheiten 0.70	— glomerata dahurica. Herrlich dunkelviolette Blüten
Thunbergii delicata. Große dunkelgrüne Belaubung,	in end- u. seitenständigen dichtgedrängten Knäueln. 40 cm VI-VII 0.50
schöne zartrosa gebogene Blütenrispen in großer	— — superba. Straufiglockenblume. Mit großen, run-
Zahl. 120 cm VII-VIII 0.50	den Blutensträußen von festerer Haltung, schönerer
— elegans. Blüten weiß, 120 cm VII-VIII 0.50	Form u. dunklerer Färbung wie glomerata dahurica
— — carnea. Schöne hellrosa Blütenfarbe. 120 cm VII-VIII 0.50	40 cm VI VII 060
- rosea. Große, elegante, dunkelrosa Rispen.	— grandis (latiloba). Die hellblauen, großen, sternför-
120 cm VII-VIII 0.60	migen Blüten sitzen dichtgedrängt an langen Ähren. 70 cm VI-VII 0.50
— — Moerheimii. Lange nach unten gebog. Blütenrispe	—— alba. Weißblühende Form 70 cm VI VII 050
von schöner rahmweißer Farbe. 120 cm VII-VIII 0.50	- Idelliford, Verzw., milchweiße Risp, 60 cm, VII VIII 050
Astilbe simplicifolia. Besonders auffallende Art mit	Cocidied. Dittenrispen mit zartblauen Blumen
zierlicher Belaubung und sehr graziösen Blüten-	1 00 cm
rispen. 40 cm VIII-IX	- lamona macramina. Grobe spitzeilängliche bebeart.
- alba. Zierliche, überhängende, weiße Rispen 0.60	Defaultung und große hellblaue (flockenblumen en
— afrorosea. Siehe Neuheiten 0.70 — carnea. Fleischfarbigrosa 0.60	langen Rispen. 100 cm VI-VII 0.50 — alba. Weißblühende Form der vorigen.
— — delicata. Aufr., reichverzw. Rispen, Farbe zartrosa 0.60	100 cm
- elegans. Reich verzweigte, zierlich überhängende	persicional Phreichblattrige Stands mit land
Rispen von leuchtend rosa Farbe in großer Fülle . 0.60	Ulduch Diumen an langen Rienon 50 377 3777
- erecta. Lodere Rispen von dunkelrosa Farbe 0.60	A CACHITATIIII. Office Neitheiten
praecox. Siehe Neuheiten	Dackinduser (alba grangiti.). Mit colon
 rosea. Besonders zierlich, frischrosa salmonea. Fedrige Rispen, leuchtend lachsrosa 0.60 	blendendweißen Blüten. 80 cm VI-VIII 0.50 Blaukehlchen. Große, leuchtend blaue, gefüllte
Astilbe hybr. crispa. Siehe niedrige Stauden.	Diumen. 70 cm
Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae ○-① ≅ X	Colonida. Die Reimblatter sind blumenblatte.
— carniolica rosea. Im Wuchs Astrantia major ähnlich,	adageonder and wie die Norolle leuchtend bland
aber edlere Blütenstände, deren Hüllblätt. von einer	Joen VI VIII 000
leuchtend. altrosa Färbung sind. 50 cm VI-VIII 0.50	alba. Weißblühende Form der vorigen.
— major. Sterndolde mit rosa geaderten Blütenhüllblätt-	- Die Fee. Einfache, hellilafarbene Blütenglocken.
den. 40 cm VI-VIII 0.40 — rosea. Mit lilarosa Sternblüten. 40 cm VI-VIII 0.50	OU CHI
Baptisia, Wilder Indigo, Leguminosae ○ ⊥ □	— Widerneimii. Weiße, halbgefüllte, halthare Blitte
- australis. Lupinenähnliche Staude mit großen indigo-	aut lesten ou cm VI_VIII 060
blauen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60	Der vorigen ahnlich im Habitua klaus
Bergenia. Siehe niedere Stauden.	gefüllt. 50 cm VI-VIII 0.60
Betonica. Siehe Stachys.	- Pride of Exmouth. Großglockig, bellblau gefüllt. 40 cm
Bocconia. Siehe Macleaya.	Circuit Deduty, Herrich blane Risconnic L.
Boltonia. Siehe Aster umbellatus.	
Buphthalmum, Ochsenauge, Compositae ○□ X	I mgerlange behaarte Blatter Hannan I.
- salicifolium. Fingerlange lanzettliche Blätter u. breite	Managoria de Glocken. 30 cm VI-VII 0.70
goldgelbe Strahlenblüten. 50 cm VI-VIII 0.50 — speciosissimum (Telekia). Blätter breit, länglich	Cardamine, Wiesenschaumkraut, Cruciferae ○-① ≅
herzförmig, große, gelbe, seinstrahlige Blumen.	profession pro Schone Rispen dicht gefüllten - 111
180 cm VII-VIII 0.60	
Calimeris, Vogelaster, Compositae ○ □ X	— yedoensis. Starkwachsende Art mit einfachen, weißen Blumen. 40 cm
— integritolia. Herbstastern - ähnliche weiße Blumen.	Centaurea Korphimo Cara III
100 cm VI-VIII 0.50	Centaurea, Kornblume, Compositae O A Buschige Stauden für jeden Gartenboden. Wegen ihrer Halt-
Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ ≅	Oather Ocsoliders ziim Schniff good
— leptosepala. Rundliche Belaubung und weiße Blüten. 30 cm. Selten IV-V 0.80	— dedibala. Graugrune, geliederte Relaubur
- palustris flore pleno. Gefülltblühende Sumpfdotter-	
blume. 30 cm IV-V 0.50	Jiccipciul, Siene Neuborton
monstr. pl. Noch großblumiger wie die vorige und	dicken, steifen Stielen 90 cm
stärker gefüllt. 30 cm IV-V 0.60	Juliane Duimale, grantiana Divi
— semiplena. Besonders große, halbgefüllte, gelbe Blumen, sehr reichblühend. 40 cm IV-V 0.60	
polypetala. Schr starkwüchsige, besond. großblättrige	diba. Reinweir, großblumig 40 am W Will
u.großblumige, einfachblüh. Art. 40 cm. V-VI 0.60	Kaiser Willelli. Rein kornhlumen fanl:
Calystegia, Bärwinde, Convolvulaceae O	TO CHI
- hederacea fl. pl. Rankgewächs mit rosafarbenen,	rosea. Großblumige, rosenrote Varietät.
windenartig., gefüllt. Blumen. 200 cm. VI-IX 0.50	Tubid. Große rote Dluten. 40 cm W WW.
Campanula,	Sulphured. Lartgelbe Schnitthlyma
Glockenblume, Campanulaceae O - D X	40 cm
Vorzügliche Gruppen-, Rabatten- u. Schnittstauden. (Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährigen dieser	Parallal Madyasus-Karaalima D 111111
Art, z. B. C. medium, C. pyramidalis).	filzigen Blättern, 40 cm
- alliariaefolia. Herzförmige Belaubung und trichter-	- ruthenica. Auf kräftigen Stielen erhaber i 1 11-VIII 0,60
glockige, rahmweiße Blüten. 40 cm. VI-VIII 0.50	
	0.60

Centranthus, Sporenblume, Valerianaceae O = X 1St.	Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) 1 St.
ruber. Die altbeliebte Sporenblume, welche für trockene, sonnige Lage fast unentbehrlich ist, karminrosa	— Idi. Goldbronzefarben. 60 cm. Früh 0.50
Blütenrispen. 60 cm VI-IX 0.40	— Mahnkes Rote. Weinrote, halbgefüllte Blumen. 50 cm. Mittel
— — albus. Große Sträuße feiner weißer Blüten. 60 cm VI-IX 0.40	— Mannheimer Markt. Reinweiße Blum. 100 cm. Spät 0.50
— coccineus. Gleich der vorigen, mit karminroten	— — Nebelrose. Derbe, uralte silberrosa Sorte von
Blüten. 60 cm VI-IX 0.50	eigenartiger Form. 100 cm. Spät 0.50 — Normandie. Edle, rosa Blumen. 80 cm. Mittel . 0.50
Cephalaria, Riesenskabiose Dipsacaceae O L X	— Novembersonne. Großbl., goldgelb. 80 m. Spät 0.50
— tatarica. Skabiosenartige, große, langstielige, zart- schwefelgelbe Blumen. 200 cm VI-VII 0.50	— Petit Louis. Zwergsorte, großblumig, weinrot.
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbaginaceae ○-() ⊥ □	40 cm. Mittel
— hybr. Griffithii. Ähnl. der nachstehenden mit behaarten	— Pride of Ceston. Purpurrot. 70 cm. Mittel 0.50
Blättchen und hellblauen Blüten. 40 cm VIII-X 0.70 — Willmottiae. Schöne neuere Art, deren leuchtend	— Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm 0.50 — Rosenball. Frischrosafarb. Blumen. 100 cm. Spät 0.50
ultramarinblaue Blütendolden von Spätsommer bis	— Ruby King. Samtig rotbraun. 80 cm. Mittel 0.50
Herbst erscheinen. 40 cm VIII-X 1.—	— — Spätgold. Stumpfgoldgelbe Blütenmass. 80 cm. Spät 0.50
Chelone, Schildblume, Scrophulariaceae ○—() □ — barbata. Siehe Pentastemon barbatus.	 Spätherbstfeuer. Rotbr., sehr spätblühend. 50 cm 0.50 Source d'or. Orangefarb. mit Goldschattier. Mittel 0.50
— obliqua (glabra). Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön	— Touring-Club. Goldgelb m. kupferf. Schattier. Spät 0.50
und eigenartig. 50 cm VIII-X 0.50	— Weiße Nebelrose. Das beste, späte, weiße Garten- drysanthemum. 80 cm
— alba. Gleich der vorigen, mit weißen Blüten. 50 cm VIII-X 0.50	
Chrysaboltonia pulcherrima. Siehe Neuheiten 0.70	Chrysanthemum leucanthemum, Frühblühende Marguerite, Compositae ○ □ ¾ In diese Klasse
Chrysanthemum indicum, japanische Winteraster,	fallen die frühest blühenden Sorten. Die weiß. Stern-
Compositae O - X Die volkstümlichste Staude	blüten erreichen bis 10 cm Durchmesser. V-VI
unserer Gärten. Äußerst dankbare Schnitt- und Gruppenstaude	— Breslau. Blüte sehr groß; die Füllung derselben ist so gut, daß nur eine kleine gelbe Mittelscheibe
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	sichtbar ist. 50 cm
20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.— Pomponsorten:	— Edelstein. Blüten dichtgefüllt, gleichen einem weiß gefüllten Pyrethrum. 40 cm
- Kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe	Lockenkopf. Riesenform der Sorte Breslau, mit
— Altgold. Goldbronzefarben 40 cm. Früh 0.50	eigenartig gekrausten Blumenblättern. 50 cm 0.60 — Matador. Von schöner Bauart und kräftigstem
— Anastasia. Dunkelkarmin, beim Aufblühen heller 0.50 — Dr. Febbé. Hellbraun. 50 cm. Mittel 0.50	Wachstum. 40 cm
— Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm. Mittel 0.50	— Rentpayer. Riesengroße, straffstielige Blum. 40 cm 0.50
— Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh	Chrysanthemum maximum,
- Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät 0.50	Spätblühende Marguerite, Compositae O 🗆 🗴 Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dank-
- Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50	Barrier and the state of the st
Poss Dauerhlüher 7	bareres, als diese großblumigen weißen langstiel.
— Rosa Dauerblüher, Zartrosa, 40 cm. Spät 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten-
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind VII-IX
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabatten- stauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen.
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende:	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — etl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reich-
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumen-
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die
— Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät . 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät . 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel . 0.50 — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50 — Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen
Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät . 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. GelberSport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät . 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät . 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel . 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50 Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät . 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Far6e im Erblühen zartschwefelgelb ist. 60 cm 0.60
 Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät . 0.50 Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 Crimson Diana. Kugelige Form, braun mit gold. 	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.70 — Ophelia. Die großen Blumen haben eine doppelte Reihe von Blumenblättern, deren Far6e im Erblühen zartschwefelgelb ist. 60 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen
- Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 - Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 - Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 - Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 - Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 - White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 - Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 - Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten - A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät . 0.50 - Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät . 0.50 - Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 - Heiderose. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50 - Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50 - Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 - Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät . 0.50 - Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät . 0.50 - Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 - Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 - Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 - Crimson Diana. Kugelige Form, braun mit gold. 60 cm. Früh 0.50 - Edelstein. Edle, reinweiße Blumen. 50 cm. Mittel 0.50	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Rosa Dauerblüher, Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 — Einfachblühende: — Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern — Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 — Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 — Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 — Crimson Diana. Kugelige Form, braun mit gold. 60 cm. Früh 0.50 — Edelstein. Edle, reinweiße Blumen. 50 cm. Mittel 0.50 — Flamme. Dahlienförmig, scharlachbronze. 80 cm.	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm
— Rosa Dauerblüher, Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. GelberSport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 — Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern — Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 — Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 — Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 — Crimson Diana. Kugelige Form, braun mit gold. 60 cm. Früh 0.50 — Edelstein. Edle, reinweiße Blumen. 50 cm. Mittel 0.50 — Flamme. Dahlienförmig, scharlachbronze. 80 cm. Mittel	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm 0.50 — fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten 1.50 — Gruppenstolz. Sehr große, edelgeformte Blumen. Sehr reichblühend. 50 cm 0.60 — Harry Sanders. Breite Randblüten mit großer goldgelber Scheibe. 60 cm 0.50 — Hildegard von Grüter. Sehr großblumig, reichund langblühend. 70 cm 0.40 — Juwel. Die doppelreihig angeordneten Randblumenblätter sowie die kleine Mittelscheibe heben die Sorte besonders hervor. 60 cm 0.60 — Marian Collier. Sehr großblumig, die dreireihigen Blumenblätter sind stark gefranst. 70 cm 0.80 — Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf starken, festen Stielen. 80 cm 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.60 — Non plus ultra. Siehe Neuheiten 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phänomen. Edelgeformte Riesenblum. auf straffen Stielen. 70 cm 0.60 — Phyllis Smith. Englische, großblumige Züchtung mit stark geschlitzten Blumen. 40 cm 0.80 — Progress. Großblumige, festgebaute Art. 60 cm . 0.40 — Sanssouci. Großblumige, weiße, festgebaute Sorte.
— Rosa Dauerblüher, Zartrosa. 40 cm. Spät 0.50 — Schnee-Elfe. Weiß mit gelbem Schein. 80 cm. Spät 0.50 — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm. Spät 0.50 — Toulouse. Rotbraun. 50 cm. Mittel 0.50 — Verbesserte Miß Selly. Edler, silberrosa Dauerbl. 0.50 — White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh 0.50 — Zwergsonne. Gelber Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50 — Einfachblühende: Erinnern an bunte Margueriten — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm. Spät 0.50 — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät 0.50 — Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50 — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm. Mittel 0.50 — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel 0.50 — Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät 0.50 Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblumige Gewächshauszüchtungen erinnern — Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50 — Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50 — Champ d'or. Edle, leucht. gelbe Blum. 70 cm. Mittel 0.50 — Crimson Diana. Kugelige Form, braun mit gold. 60 cm. Früh 0.50 — Edelstein. Edle, reinweiße Blumen. 50 cm. Mittel 0.50 — Flamme. Dahlienförmig, scharlachbronze. 80 cm. Mittel	Margueriten, die aberauch als Gruppen-u. Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind . VII-IX — Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. Durchaus windfest. 70 cm

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Delphinium cultorum,	1 St.
Chrysanthemum, verschiedene: ○□ X	Rittersporn, Ranunculaceae O 🗆 X Eine he	RM
koreanum. Über saftiggrüner Belaubung erscheinen die einfachen, weißen Blumen, die sich im Verblühen	liebte Rabatten- und Schnittstaude. Die Blätter	
bläulich färben. 60 cm 1X-X 0.70	sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf hohen Stielen	
— hybr. in Sorten. Siehe Neuheiten 2.50 — uliginosum (Pyrethrum). Große weiße, herbstblühende	und sind ein großartiges Schnitt- und Dekorations-	
Marguerite. 150 cm VIII-IX 0.50	material. Das nachstehend aufgeführte Sortiment enthält das Beste und Schönste, was es hierin gibt.	
stellatum. Niedere Form der vorigen. 100 cm 0,60	VII-IX	
Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ○-①□ x ≅ Prächtige ornamentale Staude mit gesiedertem Blatt-	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten zu RM 60.— 25 Stück zum % Preis.	
werk und kerzenartigen Blütenrispen. Ihrer späten	7.2.010	
Blüte wegen sollten sie in keinem Garten fehlen. Verlangen in sonniger Lage feuchten Boden.	— Artis. Schr großblumig, dunkelblau mit weißem Auge. 150 cm.	0.00
- acerina. Mit besonders glänzendem Laub, Blüte	Davaria. Einfach tief bayrischblau, weiße Mitte	
weiß. 60 cm VIII-X 0.60 — compacta. Siehe Neuheiten 0.80	- Baldershage. Halbgefüllt, leuchtend blau, mit	0.70
— cordifolia (dahurica). Schlanke, kerzenartige, creme-	wengen Auge. 150 cm	1.—
weiße Blütenähren. 100 cm VII-IX 0.70 — japonica. Frischgrüne Belaubung und kerzenartige	Berghimmel. Siehe Neuheiten Blue Boy. Sehr großblumig, leuchtend blau. 150 cm	1
weiße Blütenstände. 80 cm VIII-X 0.60	Cambrid. Hellotrop-rarbe, schaffiert mit venegie	
- simplex. Lange, überhängende Blütenähren. 100 cm VIII-IX 0.60	nischem blau. 150 cm	1.—
— Armleuchter. Siehe Neuheiten 1.—	orati, range Mispen, 190 cm	1
- serotina. Blüht 14 Tage später als die Stammform. 100 cm VIII-X 0.70	 Dein blaues Wunder. Siehe Neuheiten Die Blonde. Große halbgefüllte Einzelblüten, 	4.—
— racemosa. Sehr zierl. Rispen, weiß. 120 cm VII-VIII 0.70	deren außerer Diutenkreis in lehhalt kohalthaman	
Clematis, Staudenklematis, Ranunculaceae O-D	aloe in gutem Nontrast zu dem inneren reinnere	
— Davidiana. Hyazinthenblättrige, wohlriechende Art mit hellblauen Blüten. 80 cm VII-VIII 0.80	farbigen steht. 150 cm	
integrifolia. Bringt schöne seste blaue Sternblüten.	Tittle. 150 cm	0.80
40 cm VI-VII 0.60 — recta. Mit schönen weißen Blüten in dichten großen	- Dusky Monarch. Halbgefüllt, dunkelviolett mit	1
Dolden. 100 cm VII-VIII 0.60	Citzidilidili. Siene Neuheiten	3
Convallaria majalis. Siehe niedere Stauden.	— Fliederspeer. Siehe Neuheiten. — Fön. Siehe Neuheiten. — F.W. Smiths, C. Caller.	2.—
— polygonatum. Siehe Polygonatum.	1. VV. Sillins. Geruilt Enzianblau mit weifem Auge	
Coreopsis, Mädchenauge, Compositae ○ □ X — grandiflora. Dankbar blühende Staude, langstielige,	- Fr. Nagels. Kompakter Wuchs, dunkelviolettblau	1.—
schalenförm., goldgelbe Blumen. 50 cm. VII-X 0.40	mit weißem Auge, gefullt, 150 cm	0.80
lanceolata oculata. Der vorigen gleich an Reichblütig- keit und Wuchs, ausgezeichnet durch einen braun-	— Gletscherwasser. Siehe Neuheiten — Größenwahn. Siehe Neuheiten	7
roten Ring. 60 cm VII-IX 0.50	lavellalla. Siehe Neuheiten	3.— 1 —
— Golden Queen. Durchaus winterharte Art. Blumen goldgelb. 50 cm VII-X 0.50	- Immelsauge. Die schr schlanken Rispen sind mit	Α.
Perrys var. Feste drahtartige Blumenstiele, Blumen	großen, dichtgefüllten Rosettenblüten eng besetzt.	1 50
tiefgoldgelb, halbgefüllt. 50 cm VII-X 0.60 tripteris. Bläulich bereifte Stengel, Blätter dreiteilig	Tochsommer. Schr spätblühende Sorte kräftig	
gelappt, zahlreiche hellgelbe, dicke Blumenköpfe.	arramarmorau, im innern karminviolett 150 cm	0.80
180 cm VII-IX 0.60 — verticillata. Reichverzweigte, festgestielte, hellgelbe	— Hohenstaufen. Blumen reinindigoblau mit violett.	1
Strahlenblüten, über zierlich schmalblättrig. Laub-	N. Lilloll. Reinhellblau. Mitte amethyetfankin	
werk. Eine der besten Stauden überhaupt. 60 cm VII-X 0.50	halbgefüllt. 150 cm	
— grandiflora. Siehe Neuheiten 0.80	redditender Weißer Mitte. 150 cm	1.—
Crambe, Riesenschleierkraut, Cruciferae ○ ⊥	 — Kirchenfenster. Siehe Neuheiten — Königin Wilhelmina. Leucht. himmelblau, einfach. 	3
— cordifolia. Große herzförmige Blätter, unzählige kleine	100 cm	0.60
weiße Blütchen bilden eine riesige, luftige Blüten- wolke. 150 cm VI-VII 0.70	- Leuchtturm. Siehe Neuheiten - Lord Landsdowne. Einfache Blumen von reindunkalblagen.	2.—
Crinum, Freiland - Amaryllis, Amaryllidaceae ○- ① ⊥ X	dunkelolauer rarbe, reinweikes Auge 150	1
Powellii. Mit großen lilienartigen rosa Blumen auf	DidUKITIONE. Zarthian 11 c	
starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt von imposanter Wirkung. 60 cm VII-VIII 1.—	Schattierung und schwarzer Mitte. 150 cm Morgenstrahl. Siehe Neuheiten Mrs. Townley Parker, H.	1.50
— — album. Weißblühende Art. 60 em VII-VIII 1.—	insi lowincy idikel. Himmalbla	
Cypripedium. Siehe unter niederen Stauden.	Auge, sehr großblumig, einfach. 180 cm	0.80
Datisca, Scheinhanf, Datiscaceae ○ ⊥	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0.70
cannabina. Buschige Dekorationsstaude mit hanfar- tiger Belaubung und rispentraubigen gelblichen	. Taamioni, Diene Tellnellen	3.—
Blüten. 200 cm VII-VIII 0.80	— Nora Ferguson. Wundervoll zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung. 140 cm	
		0.00

Delphinium cultorum (Fortsetzung) 1 St.	Delphinium Belladonna-Hybriden (Fortsetzung) 1St.
— Pannonia. Halbgefüllt, kobaltblau mit weißem	- Tankred. Marineblaue Blumenblätter, rotviolett
Auge. 150 cm	getuscht, cremefarbene Hülle, sehr großblumig und
— Prinz Gustav. Halbgefüllt, violettblau, riesige Rispen. 150 cm	reichblühend. 120 cm
— Purpurritter. Siehe Neuheiten 1.50	blauen Blüten. 100 cm 0.70
— — Queen Mauve. Blumen zartviolett mit salvia-	Widukind, Reinblau m. cremefarbig. Mitte. 120 cm 0.60
blauem Schein. 150 cm	Delphinium, verschiedene: ○□ ¾ VI-VIII
— Rev. E. Lascelles. Großblumig, violettblau, großes	atropurpureum. Der frühblühendste aller Rittersporn-
Auge blau und weiß. 120 cm	arten. Große Blumen, leuchtend purpurviolett mit schwarzer Mitte. 80 cm
- Rosenenzian. Siehe Neuheiten 2	— Phoenix. Dunkelviolette Rispen. Sehr reichblühend 1.—
— Rosenlust. Halbgef., hellblau mit rosa Schein. 150 cm 0.60	— Parzival. Schlanke, dunkelblaue Rispen. 60 cm . 1.50
— Rossel. Klarkobaltblau, mit reinweißer Mitte. 120 cm 0.60	— Siegfried. Kompakte, hellviolette Rispen. 60 cm . 1.—
— Schwabenstreich. Sehr frühblühend, große Einzel-	— Tannhäuser. Tiefviolette Rispen. 60 cm 1.—
blüten, zartlila, außen blaßblau. 150 cm 0.60 — Staatspräsident. Großrispig, rein lila, hintere	— Zwergriffer. Tiefviolette Blumen mit brauner Mitte 2.— — grandiflorum chinense. Stark geschlitzte Belaub. mit
Blumenblätter himmelblau. 150 cm 1.—	unzählichen, leuchtend blauen Blüten. 50 cm 0.40
— Stuttgardia. Große Blütenrispen von einf. himmel-	— — cinerarea. Cinerarienblütig, sehr reichblühende
blauer Farbe und weißer Mitte. 150 cm 0.80	Form, leuchtend blau. 50 cm 0.50
— Sven Ridder. Dunkelpurpurblau, mit einem großen	— — Iom Ihumb. Siehe niedere Stauden 0.40
Kranze weißer und blauer Staubfäden. 120 cm . 0.80 – The Alake. Halbgefüllt, außen blauviolett, innen	— nudicaule. Siehe niedere Stauden 0.60
rötlichviolett. 200 cm	— sulphureum (Zalil). Knollenbildende Art mit großen schwefelgelben Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.80
- Triumph. Violettblaum. sehr groß. weiß. Auge. 150cm 0.80	Dicentra (Dielytra), Tränendes Herz, Papaveraceae
— Iropennacht. Siehe Neuheiten	O-0 X
— — Überwinder. Siehe Neuheiten 2.— — — Van Veens Triumph. Schöne halbgefüllte Blumen,	— spectabilis. Beliebte Frühlingsstaude m. schöngeformt.
ctwa 7 cm Durchmess., prächtig zartrosalila. 150 cm 0.80	Laub und gespornten rosa Blüten in graziösen
- Vergifsmeinnicht. Leuchtend lieblich hellvergiß-	Ahren. 60 cm V-VI 0.60
meinnichtblau, halbgefüllt. 150 cm 0.60	Dictamnus, Diptam, Rutaceae ○—
— Wilhelm Storr. Himmelbl mit rosa, großbl. 150 cm 0.60	die folgenden Sorten. 70 cm V-VII 0.70
— Würftembergia. Tiefveilchenviolett mit weißer Mitte, sehr großblumig. 150 cm	— fraxinella. Schöne frischgrüne, eschenblätterige Staude
— Zuster Lughten. Blüten gefüllt, edle Form, Farbe	mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisches,
dunkelblau. 150 cm	explosives Öl entströmt. 60 cm V-VII 0.70
— — Zuidersee. Großblumig, lilablau, halbgefüllt mit	— albus. Mit weißen Blüten. 60 cm V-VII 0.70 Digitalis, Fingerhut, Scrophulariaceae O— □
schwarzer Mitte. 180 cm 0.60	— ambigua. Blüt. hellgelb bräunl. gead. 80 cm VI-VII 0.50
- Hybridum. Aus Samen gezogener Rittersporn, ein feinstes Farbenspiel 0.40	- terruginea. Große wintergrüne Blattrosetten, gelbe
Delphinium Belladonna-Hybriden ○□ X ⊥ Der nur	Blütenrispen. Zweijährig, sät sich aber an Ort
mittelhohe Wuchs, das außerordentlich reiche Re-	und Stelle selber aus, so daß sie mehrjährig wirkt. 50 cm VI-VII 0.40
montieren u. die schlanken zierlichen Rispen machen	— purpurea gloxiniaeflora. Die Blütenfarbe variiert
sie besonders wertvoll VII-IX	vom reinsten weiß bis dunkelrot. Die Blumen sind
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und
20 Sorten unserer Wahl zu RM 48.—	Punkten geziert. 100 cm VI-VII 0.40
Ab 25 Stück zum ⁰ /o Preis.	Diplostephium amygdalinum. Siehe Aster umbellatus.
— Arnold Böcklin. Klar gentianenblau mit weißer	Doronicum, Gemswurz, Compositae ○-() □ X — caucasicum. Wertvoller Frühlingsblüher für jeden
Mitte. Eine vorzüglich leuchtende Farbe, reich und anhaltend blühend. 150 cm	Boden. Blumen goldgelb. 30 cm IV-V 0.40
— — Andenken an Aug. Koenemann. Leucht. lasur-	— magnificum. Blüte goldgelb, margueriten ähnl. 40 cm 0.40
kobaltblau, die Seitenblätter an den Spitzen rosa	- Clusii. Großblumig, wie plantagineum excelsum, aber
gefärbt, Mitte weiß, sehr großblumig. 120 cm 0.70	in gleichmäß. Höhe blüh., goldgelb. 50 cm IV-V 0.40 — cordifolium (Columnae). Blüht früh, wie caucasieum,
— Bayard. Hellasurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben. 150 cm 0.60	aber mit schöneren und größeren gelben Blüten,
— Berlichingen. Sehr frühblüh., dunkelviolettblau.	die alle in einer Höhe stehen. 40 cm. V-VI 0.40
150 cm	- Mrs. Masson. Besonders großblumig, goldgelb.
- Capri. Edelgeformte Blüten in reich verzweigten	Außerordentlich reichblühend. 40 cm. V-VI 0.50
Rispen, einfach, hellblau. 120 cm 0.70	— plantagineum excelsum. Schlanke Blütenstiele, große, edelgeformte, leichtgewellte, gelbe Scheibenblumen.
— Dan Leno. Hellkobaltblau m. weiß. Mitte. 100 cm 0.60	80 cm V-VI 0.40
— Lamartine. Einfach leuchtend dunkelblau. 100 cm 0.70	compactum. Niedere, geschlossene, gleich-
— Moerheimii. Reichverzweigte Rispen von rein- weißer Farbe mit gelblichem Auge. 120 cm 0.50	mäßige Büsche bildend. Gelbblühend. 50 cm 0.60
— Mrs. Thomson. Lange Rispen, leuchtend blau mit	Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae O A D
weißer Mitte. 100 cm 0.50	— Forresti. Blätter dreispaltig mit linealen Zipfeln. Blu-
— Persimmon. Dem allbeliebten Delphinium Bella-	men quirlig dicht, violettblau. 40 cm. VII-IX 0.60 — Ruyschianum. Blätter schmallanzettlich, Blüten leuch-
donna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt	tend blau, 40 cm VI-VII 0.40
so große hellblaue Blumen u. entsprechend starkem	— japonicum. In Tracht ähnlich der vorgenannten,
Wuchs aus. 150 cm 0.70 - Sky blue Lamartine. Prächtig himmelblau mit	jedoch mit noch größeren, leuchtend blauen Blumen.
dunklem Schein. 100 cm	60 cm VI-VII 0.50

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiaceae ○ ∞ □ △ 1 St.
Echinops, Kugeldistel, Compositae $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bot X$	— epithymoides (polychroma). Wunderhübsche Art mit
Aufrechte, ornamentale Staude mit meist graugrün-	leuchtend gelben Blütensträußen. 40 cm V-VII 0.50 — Siehe auch niedere Stauden.
stacheliger Belaubung und runden Blütenköpfen. — bannaficus. Hellblaue Kugeldistel. 150 cm VIII-IX 0.50	Filipendula (Spiraea) Spierstaude,
— humilis. Sehr schöne, intensiv dunkelblaue Kugel- blumen. Niedrigste Sorte. 100 cm VIII-IX 0.60	Rosaceae O-D ≅ ⊥ □ Üppig wachsende Pflanzen
- niveus. Silberweiße Kugelblüten. 150 cm VIII-IX 0.50	mit dekorativer Belaubung und federigen Blüten- rispen VII-VIII
— ritro. Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel.	— camtschafica gigantea. Die weißen Blumen erscheinen
150 cm VIII-IX 0.50 Epilobium, Weidenröschen, Oenotheraceae ○- ◆ □ ≃	in großen flachen Dolden, sehr dekorativ. 180 cm 0.60 — rosea. Rosafarbige, prächtige Art. 200 cm 0.60
- Dodonaei. Rosmarinblättrige Staude mit lilapurpurnen	— hexapetala fl. pl. (Spiraea filip. fl. pl.). Mit feiner
Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.60 Eremurus, Lilienschweif, Liliaceae O Außer-	Belaubung und dichtgefüllten, blendendweißen Blüten in lockeren Sträußen. 40 cm
ordentlich starkwachsende, prächtige Solitärstaude,	- palmata. Blüten leuchtend karminrot in hübschen
mit großen Blumen an langen Rispen V-VI — Bungei. Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender	Doldentrauben. 120 cm 0.70 — alba. Große, weiße Rispen. 120 cm 0.50
Wirkung. 100 cm	— elegans. Mit zartrosa Blüten, 120 cm 050
— Elwesii. Kräftige Blütenstiele mit zartrosa Blumen. 180 cm	— rubra (lobata). Schöne, leuchtend rosarote Blütenrispen. 40 cm
— himalaicus. Mit weißen Blüten. 150 cm 4.—	— Venusta, Mit hellrosa Blütensträußen, 100 cm 050
— robustus. Schönste rosablühende Sorte. 200 cm 4.— — Shelfordii. Kupferig- bis bräunlichrosa Blütenrispen.	L'Innocense. Weiße Blüten mit rosaroten Staubfäden. 150 cm 0.60
120 cm	— — magnifica. Mit prächtig rosenroten Blitten-
Erica. Siehe unter Heidekräuter.	sträußen. 120 cm
Erigeron, Berufkraut, Compositae ○□ X Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnlichen	— fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten von blendendweißer Farbe und stark auffallender Wirkung. 80 cm 0.50
Strahlenblüten VI-IX	Funkia. Siehe Hosta.
— hybr. Asa Gray. Schöne aprikosenfarb. Blüten. 30 cm 0.50 — — Hundsstern. Siehe Neuheiten 1.—	Gaillardia, Kokardenblume, Compositae O X
— — Lasur. Großblumig, dunkellila. 40 cm 0.50	Augerordentlich reichblühende Stande mit stark
— Merstham Glory. Siehe Neuheiten 0.80 — Mrs. E. M. Beale. Siehe Neuheiten 0.80	behaarter Belaubung und großen margueritenähn- lichen Blumen in feinstem Farbenspiel. VI-X
— Quakeress. Edle, große, mattrosalila Blüten. 50 cm 0.50 — Sommerneuschnee. Siehe Neuheiten 0.60	— aristata Brunhilde. Sehr großblumig, weinrot mit hell-
— mucronatus Moerheimii. Siehe Neuheiten 0.80	gelb. 40 cm
- speciosus roseus. Siehe Neuheiten 0.70 - Ronsdorf. Siehe Neuheiten 0.60	— Compacia. Niedrig bleibende Form, Blitten gelb
— — semiplenus. Lavendelblau, halbgefüllt. 50 cm . 0.50	mit rot. 30 cm
— superbus grandiflorus. Großblumige, dunkelblaue Varietät mit gelber Scheibe. 50 cm 0.50	— Rossdorfer Hybriden. Kirschrot mit hellgelbem
— Wuppertal, Siehe Neuheiten 0.70	Dentium, sent apartes l'arbenspiel, 50 cm 040
Erodium. Siehe niedere Stauden.	— The Prince. Siehe Neuheiten
Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae O O D X Eignen sich besonders für leichten, auch steinigen Boden	auf starken Stielen. 50 cm 0.50
und sind sehr anspruchslos. Der stachelige Kelch	Galega, Geißraute, Leguminosae O-
und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen VII-X	— officinalis Hartlandii. Lang blühende wickenähnliche Staude mit weiß und lila Schmetterlingsblüten.
— alpinum superbum. Herrlich stahlblau gefärbte Blü-	120 cm VI-VIII 0.50
tenköpfe an langen Stielen. 60 cm 0.60 — hybr. Juwel. Blüht 3 Wochen früher als alle anderen	Gentiana, Enzian, Gentianaceae O-O \approx \pi v
Sorten, Hüllblätter, Stiele und Köpfe dunkelstahl-	— asclepiadea. Dunkelblauer Knäuel-Enzian mit schmallanzettlicher Belaubung. 50 cm VII-VIII 0.70
blau. 60 cm	- dibd. Weiße Form der vorigen, 50 cm VII-VIII 0.70
Varietät, prächt. violette Farbe d. Blütenst. 60 cm 0.00	— lutea. Goldenzian. Aufrechte Risp., goldgelb blühend. Belaubung lederig bläulidigrün. 150 cm VII-VIII 0.80
— Oliverianum superbum. Sehr großblumige, intensive Blaufärbung. 70 cm	- Siehe auch niedere Stauden.
— planum. Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen. 120 cm 0.40	Geranium. Siehe unter niedere Stauden.
— argenteum. Silberweiße Blütenköpfchen. 120 cm 0.40 — Blauer Zwerg. Sehr niedrig, leuchtend blau. 80 cm 0.50	Geum, Nelkenwurz, Rosaceae O - D Sehr empfehlenswerte Stauden mit immergrünen Blattrosetten
yuccaefolium. Siehe Neuheiten	und zahlreichen großen, erdbeerartigen Blijten-
— Siehe auch niedere Stauden. Eupatorium, Dost, Compositae ○─● ≅	ständen. In größerer Zahl angepflanzt sind sie von sehr auffallender Wirkung.
- ageratoides. Hübsche Staudenart mit großen Dolden	- Borisii. Im Wuchs viel Ahnlichkeit mit Geum coggingum
reinweißer Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum. 100 cm VII-X 0.50	Die Blüten sind jedoch von viel leuchtenderer, orangescharlach Farbe u. erscheinen ununterbrochen
- cannabinum fl. pl. Purpurrosa, halbgefüllt. 150 cm. 0.50	wanrend mehrerer Monate, 40 cm V VIII 06
— Fraseri. Ähnlich ageratoides, Wuchs u. Blüten jedoch graziöser, cremweiß blühend. 100 cm VIII-IX 0.50	grüne Belaubung, 40 cm
- purpureum, Robuste Staude mit quirligen Blattern u.	— Childense Mrs. Dradshaw. Groke refullte Blitter
großen, weinroten Blütendold. 120 cm VII-VIII 0.60	leuchtend scharlachroter Farbe. 40 cm. VI-VII 0.5






Lilium regale



Phlox paniculata Württembergia



Trollius hybr. Earliest of All

VII-IX

Heliopsis scabra (Fortsetzung) 1 St.	Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae O- 🕽 🗆 💥 1 St.
— — major. Schöne edelgeformte Blumen von orange-	Ein Liebling jedes Staudenkenners. Die glocken- förmigen Blütchen vereinigen sich massenhaft an
gelber Farbe. 150 cm VIII-X 0.40 — zinniaeflora. Die Pflanze erreicht nur eine geringe	zierlichen Rispen. Sehr anmutige Pflanze im Stau-
Höhe. Farbe leuchtend goldgelb, fast ganz gefüllt-	dengarten VI-VIII
blühend. Besond. haltb. Schnittbl. 60 cm VII-IX 0.50	Wir liefern ein feines Sortiment 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—
Helleborus. Siehe niedere Stauden.	25 Stück zum ⁰ /o Preis.
Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ ≅— □ ⋈ Unverwüstliche, dauerhafte Schmuckstaude. Über	— brizoides gracillima. Feinverzweigte Blütenrispen von zartrosa Färbung. 40 cm
den schilfartigen, meist überhängenden Blättern	— Poesie. Zahlreiche kleine, fleischfarbigrosa Blüten.
stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen,	40 cm
liliengleichen Blüten in gelben und orangefarbenen Farbtönen.	 hybr. convallaria nivea. Schneeweiße Blüten, in Form und Größe an Maiglöckchen erinnernd. 40 cm 0.50
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	— — Edge Hall. Kräftigrosa Blumen auf straffen
20 Sorten zu RM 40 Ab 25 Stück Hundertpreis.	Stielen. 50 cm
— aurantiaca. Starkwüchsige Art mit orangefarbenen	roter Farbe. 40 cm
Blumen. 50 cm VII-VIII 0.60 — citrina. Echt. Im Habitus ganz verschieden von den	— Feuerrispe. Großbl., feuerrot weithin leucht. 40 cm 0.60
andern, hellzitronengelb, 8–10 Wochen lang blühd.,	 Frühlicht. Zartrosa, früh- und reichblühend. 40 cm 0.50 Girandole. Abart der vorigen mit frischkarmin-
vornehmste Art. 70 cm VII-IX 0.80	rosa Blüten. 40 cm
— hybr. Baronii. Sehr große, zitronengelbe wohl- riechende Blumen mit großen, schmalen Blumen-	— Kleeberger, Herrl. zinnoberrot, groß, Glöckch. 40 cm 0.60
blättern. 100 cm VII-IX 0.80	— Panorama. Marmoriertes Laubwerk, karmoisin- farbige Blüten. 40 cm
— Dumortieri (rutilans). Blumen chromgelb. 40 cm V-VI 0.50	— — Titania. Rosenrote, enorm starkwüchs. Züchtg. 50 cm 0.60
flava. Gelbe, herrl. duftende Sorte. 40 cm VI-VII 0.40	— multiflora robusta. Schr reichblühend, Blume kräftig rosa. 40 cm
— fulva (Kwanso). Sehr starkwiichsig. Orangegelb, ohne	- sanguinea splendens. Leuchtend rote Blüten auf
Geruch. 70 cm VII-VIII 0.50 — fl. pl. Japanische Taglilienart von feiner orange-	festen straffen Stielen. 30 cm
roter Farbe, stark gefüllt. 100 cm VII-VIII 0.60	tiarelloides. Zahlreiche hellrosa Blütenrispen auf hell- grünen Blattrosetten. 40 cm V-VI 0.50
— fol. var. Mit weiß gestreiften Blättern. 70 cm VII-VIII 0.70	— — alba. Während der Blütezeit mit einer Menge rein-
— graminea (minor). Grasartig feine Belaubung, hell-	weißer Blumen übersät. 40 cm V-VI 0.50
gelbe Blüten. 40 cm VII-VIII 0.50	Hibiscus. Siehe Sumpfstauden. Hosta, Herzlilie (Funkie), Liliaceae ○≅ - ● : ::
hybr. Apricot. Schön aprikosenfarbig, frühblühend.	Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Deko-
— — Aureola. Orangefarben, außen bräunlich.	rationspflanzen. Sie bilden Büsche mit schöner Be-
50 cm VII-VIII 0.50 — Gold Dust. Dunkelgelb, sehr reichblühend.	laubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blattstaude, auch an
50 cm VI-VIII 0.40	Bassins u. Ufern sehr geeignet. 40-60 em VII-VIII
— Margaret Perry. Siehe Neuheiten. 1.20	 Fortunei. Breitblättrig, graugrün, Blumen weißlichlila 0.60 glaucescens. Breitblättr., graublau. Blumen hellila 0.60
- Orange Man. Orangegelb, großblumig. 70 cm V-VII 0.40	robusta. Stahlblaue, breite, große Blätter von
— — Souvereign. Hellorangegelbe, große, schöngeformte	schöner Wirkung, violette Blüten 0.60 — jap. lancifolia. Schmale Blätter, blaublühend 0.50
Blumen. 80 cm VI-VII 0.50 — Mülleri. Großblumig, zitronengelb, reichblühend.	— — angustifolia. Besonders schmale, hellgrüne Be-
80 cm VII-VIII 0.60	laubung, Blumen violett
- Nilbio. Große flachtrichterförmige Blumen von	— — marginata. Kleine weißgeränderte Blätter, Blüte hellila
herrlicher rotorange Färbung. 100 cm VII-VIII 0.60 — Queen of May. Früh- und reichblühend, orange-	— — minor alba. Kleinblättrige, sehr reichblühende
gelb. 50 cm V-VII 0.60	Art, weißblühend
 Viscountess Byng. Siehe Neuheiten. luteola. Der Blütenstand trägt nacheinander 6-9 große, 	Form. Blumen violett
zitronengelbe Blumen. 70 cm VI-VII 0.40	— — robusta. Blätter stark weiß gestreift bis ganz
- major. Besonders großblumig und reichblühend.	weiß, violettblaue Blüten, gute Treibsorte 0.50 — ovała (coerulea). Große dunkelgrüne Blätter, klein-
70 cm VI-VIII 0.50 — pallens. Blumen mehr sternförmig, hellgelb.	blumig
50 cm VI-VII 0.50	— alba marginata. Blätter weiß gerandet, blaublüh. 0.60 — aurea. Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün,
— Middendorffii (Regeliana). Große Blüten von tief- orangegelber Farbe, eine der schönsten.	hellblaue Blüten. Sehr gute, neuere Treibsorte . 0.50
40 cm VI-VIII 0.50	— — superba. Großbl., lila, lilienart., Blätter dunkelgrün 0.60
— ochroleuca. Mattgelb, großbl. 70 cm VII-VIII 0.50	— Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaublühend . 0.60 — subcordata grdfl. Blum.weiß, wohlriech., Laub hellgrün 0.60
Thunbergii. Große reinschwefelgelbe Blumen.	Hyssopus, Ysop, Labiatae O A
Heracleum, Herkulesstaude, Umbelliferae ○ ⊥	— officinalis. Schmalblättrig, aromatisch duftender Klein-
- villosum (giganteum). Sehr wirkungsvoll durch ihre	strauch mit leucht. blau. Blüten. 30 cm VI-VIII 0.50 — alba. Weißblühende Abart der vorigen. 30 cm . 0.50
großen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weißen Blütendolden. 2 m VII-VIII 0.70	Incarvillea, Freilandgloxinie, Bignoniaceae 🔾 🗆 🗶
Hesperis, Nachtviole, Cruciferae O X	— Delavayi. Knollenartige Staude mit großen, gesiederten
— matronalis alba plena. Levkojenähnliche Staude,	Blättern und trompetenartigen, rosaroten Blumen. 50 cm V-VII 0.50
weiß, gefüllth wohlriechend 50 cm V-VII 0.50	— Sighe and middle Stade





Centaurea pulcherrima



Liatris spicata



Physostegia virginiana



Chrysaboltonia pulcherrima



Coreopsis lanceolata oculata



Lysimachia clethroides



Papaver orientale gracile Perkeo




Eryngium yuccaefolium

14	
Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1St.	Iris germanica (Fortsetzung)
Inula, Alant, Compositae ○ □ ⊥	— Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten
glandulosa. Auf kräftigen Stielen herrliche große,	sitzen an 120 cm stark verzweigten Blütenstielen 0.50
orangegelbe Strahlenblüten. 40 cm . VI-VII 0.50 laciniata. Blüten fein geschlitzt, wodurch dieselben	— Fürstin Lonyay. 120 cm hohe, violettlilafarbene
ein äußerst zierl. Aussehen erhalten . VI-VII 0.60	Domblätter und weinrote Hängeblätter, am Grund
- macrocephala. Dekorative hochwachsende Staude mit	stark weiß genetzt. 100 cm. Mittelfrüh 0.50
reichverzweigten Blütenständen und großen hell-	gelb gerandete Hängeblätter, hervorrag. Gruppen-
gelben Strahlenblumen. 150 cm VII-VIII 0.60	sorte. 60 cm. Mittelfrüh
— Royleana. Prächtige seltene Staude aus dem Himalaya, mit großen gelben Blütenscheib. 70 cm VII-VIII 0.80	— — Gajus. Dom der Blume reinlichtgelb, untere Blätter
— salicifolia. Siehe Buphthalmum.	gelb mit scharfen roten Linien netzartig geadert.
Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○□ X	60 cm. Früh
Iris pumila und pumila hybrida. Siehe niedrig blei-	— Gandvik. Dom lavendelblau, Hängeblätt. veildenblau mit lavendelblauem Rand. 60 cm. Spät 0.80
bende Stauden.	— Goldvließ. Dom klargoldgelb, Hängeblätter rot-
Iris interregna. Eine Klasse, die den Flor zwischen Iris	braun mit scharfem, goldgelben Rand. 50 cm 0.60
pumila u. Iris germanica ausfüllt. 50 cm V — Frithjof. Domblätter klarhellavendelblau, Hänge-	— Grace Sturtevant. Siehe Neuheiten 2.—
blätter samtigveilchenblau 0.40	- Grachus. Zartgelb mit rot, netzartig geadert, nied-
— — Gerda. Domblätter lichteremegelb, die Hängeblätt.	rig, eine der reichblühendsten. 60 cm. Früh 0.40 Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila Anflug,
ctwas dunkler mit goldgelber Aderung 0.40	Hängeblätter violettblau, mit breitem, cremefar-
- Halfdan. Einfarbig hellcremegelb 0.40	benen Rand. 60 cm. Mittelfrüh
— Helge. Lichtzitronengelb mit perlmutterfarbenen	— Her Majesty. Edle Blumen von reiner rosalila Fär-
Stempelblättern	bung. 60 cm. Mitteltrüh
- Walhalla. Obere Domblätter lilalavendelblau,	- Iduna. Dom zarthellgelb, Hängeblätter veilchen-
Hängeblätter samtigweinrot 0.40	blau, hellgelb gerandet. 60 cm. Früh 0.60 — Ilsan. Lichtlilarosa gefärbter Dom, dunkelweinrote
Iris germanica, Deutsche Schwertlilie. Wegen ihrer	Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh 0.50
dekorativen schwertförmigen Blätter und schön ge-	— Wald. Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weiß-
bauten farbenprächtigen Blüten, ihrer Anspruchs-	geaderten Hängeblättern. 60 cm. Mittelfrüh 0.80
losigkeit an Boden u. Standort, zählen die Schwert- lilien zu den beliebtest. Gartenpflanzen V-VI	wein. Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett.
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück	80 cm. Mittelfrüh
in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 36.—	gesunden Wuchs, Die mittelgroßen, wohlgeformten
25 Stück zum ⁰ /0 Preis.	Blumen sind von reindunkelgoldgelber Farbe. 60 cm 0.60
- Aareshorst. Dom blafarben, in dunkeloliv über-	- Kastor. Einfarbig mattblau, sehr edel in der Form.
gehend. Hängeblätter violett. 80 cm. Früh 0.80	60 cm. Früh
— Aegir. Dom fast reinweiß, Hängeblätter lebhaft karminrot. 80 cm. Mittelfrüh 0.60	- Kupferhammer. Große, edle Blumen mit leuchtend
— Alfhem. Dom zartlavendelblau, gelblich gedeckt,	goldgelbem Dom und samtig dunkelbraunen Hänge- blättern, die leuchtend gelb gerandet sind. 60 cm 0.60
Hängeblätter violettblau. 70 cm. Spät 0.60	— La Beauté. Edle Blütenform von herrlich hell-
- Alberti. Dunkelblauviolett, schr großbl. 80 cm. Früh 0.40	himmelblauer Farbe, 50 cm. Früh 0.50
- Ambassadeur. Dom bronzeviolett, Hängeblätter	— Lenzschnee. Grundton weiß, Hängeblätter lichtlila
dunkelrotviolett. 80 cm. Spät	weich geadert. 60 cm. Spät 0.80
blätter gelblichweiß geadert. 60 cm. Mittelfrüh . 0.60	— Lohengrin. Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend großen Blüten, die catt-
- Asmund. Rötlichviolette Hängeblätter mit gold-	leyenrosa gefärbt sind. 100 cm. Mittelfrüh 0.40
gelbem Bart, lavendelblauer Dom. 80 cm. Mittel . 0.80	- Loreley. Ultramarinblau mit creme Aderung und
- Atropurpurea. Dunkelbl., fast schwarz. 70 cm. Früh 0.50	lichtgelb gerändert. 60 cm. Früh
— Aurea. Reinkarnariengelb. 50 cm. Früh 0.40 — Balder. Der gelbolivefarbige, leicht bläulichen	— Li.A. Williamson. Dom lobelienblau, Hängeblätter
Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkel-	- Madame Chereau. Reinweiß mit zartlila gerän-
pflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel. Spät . 0.50	dert und geadert. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— Bele. Dom lilafarbig, Hängeblätter weinrot, stark	— Maori King. Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb
geadert. 50 cm. Mittelfrüh 0.60	untere dunkelschwarzbraun mit gelbem Rande.
— Brising. Purpurviolette Hängeblätter mit 7-8 mm	50 cm. Mittelfrüh
breitem weißen Rand und stark getigerte Aderung, helleremefarbener Dom. 60 cm. Mittelfrüh 0.80	— Mimung. Reinhellblau. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
- Bronzeschild. Niedriger Wuchs, Dom bräunlichgelb,	— Mithras. Domblätter lichtgelb; Hängeblätter: tief- und klarweinrotviolett. 60 cm. Mittelfrüh 0.40
Hängeblätter samtigbraun. 60 cm. Spät 0.60	1 — Wirs. Alan Gray. Prachtig zartrosa, zuweilen im
— Céleste. Himmelblau. 50 cm. Früh 0.40	Sommer ein zweites Mal blühend, 40 cm. Friib 0.40
Député Nomblot. Siehe Neuheiten 3.—	— Ivirs. Neubronner. Dom- u. Hängeblätter leuchtend
Eckesachs. Domblätter zartlavendelblau, Hänge- blätter hellpurpurviolett. 60 cm. Früh 0.40	neigoldgelb. 50 cm. Mittelfrüh
— Fatum. Hängeblätter tiefsamtigschwarzblau, Dom-	— Mrs. H. Darwin. Wachsartigweiß, untere Blumen- blätter leicht violett geadert. 60 cm. Mittelfrüh . 0.40
blätter dunkelblau. Straffwachsende Sorte. 70 cm 0.60	— Mrs. Reuthe Kuppel zartliablau, wachsweiß und
— - Flammenschwert. Domblätter hellgelb, Hänge-	zartilla geadert. 70 cm. Spät
blätter samtigbraun. 60 cm. Mittelfrüh 0.70	I Nadia. Siehe Neuheiten
- Florentina. Groß, weiß, innen perlmutterfarben	Nibelungen. Domblatter oliventarben m. schwe fel
schimmernd. 60 cm. Früh	gelbem Anflug; Hangeblätt, tiefpurpurviolett 80 cm 0 50
vortretender braungelb. Aderung auf hellem Grund,	- Norräna. Riesengroße Blüten, deren Dom licht- lavendel mit goldenem Schimmer ist. Hängeblätter
lichtrosa farbener Dom. Mittelfrüh. 60 cm 0.60	violett mit breitem weißen Rand 70

Iris germanica (Fortsetzung) 1St.	Iris (Fortsetzung)
— Odenvogel. Dom zitronengelb, Hängeblätter	— foetidissima fol. var. Breite, grasartige, weißbunte
purpurviolett, gelb gerandet. 70 cm. Früh 0.60	Belaubung. 50 cm VI-VII 0.80
— Pallida dalmatica. Blumen sehr groß, zartlavendel-	— graminea. Blüten von blauer, weißer und purpurner
blau. 120 em. Spät 0.40	Farbe und aprikosenartigem Duft, Belaubung gras-
— Pfauenfeder. Domblätter hellgelb, Hängeblätter	artig. 40 cm VII-VIII 0.60
violettblau mit hellgelbem Rand, von niederem	— japon. Ledgers var. Siehe Neuheiten 1.—
Wuchs. 60 cm. Mittelfrüh	— laevigata. Aehnelt stark Iris Kaempferi, ist aber bedeutend härter als diese. Schöne, tiefblaue Blumen.
schwefelgelb, untere Blumenblätter pflaumfarben	50 cm VI-VII 0.70
mit cremefarbener Umrandung. 70 cm. Mittelfrüh 0.40	— — fol. var. Buntblättr. Form d.vorig. 50 cm VI-VII 0.70
— Pullach. Sehr frühblühd., dunkellila, 80 cm. Früh 0.40	— Rose Queen. Blum. prächt. rosa. 50 cm VI-VII 0.70
Queen of May. Die rosalila Blüten stehen auf	— Monspur. Prächtiger Wuchs, Blüten von herrlich licht-
schlanken hohen Stielen. 80 cm. Mittelfrüh 0.40	blauer Farbe. 100 cm VI-VII 0.60
Rheinfels. Besonders große, edle Blumen, Dom	orientalis. Von schön tief blauer Farbe mit leichter gelb,
und Hängeblätter weiß, an den Rändern porzellan-	schwarz und weißer Zeichnung auf den äußeren Blumenblättern. 50 cm VI-VII 0.40
blau geadert. 80 cm. Spät	— Schneekönigin. Große, elfenbeinweiße Blumen
als die Hängeblätter. 60 cm. Mittelfrüh 0.50	auf 60 cm hohen, schlanken Stielen . VI-VII 0.50
— Rhein-Nixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter	— pseudacorus. Gelbblühende Wasserschwertlilie. 80 cm 0.40
tiefveilchenbl. mit weißem Rand. 100 cm. Mittelfrüh 0.50	- sibirica. Von schlankem, hohem Wuchs mit feinen,
— Rheinsage. Dom cremegolden mit lila Hauch. Die	hellblauen Blüten. 80 cm VI-VII 0.40
Hängeblätter lachskarmin und stark getigert. 80 cm 1.50	— alba. Mit lichten, reinweißen Blüten. 80 cm 0.40
— Rheintochter. Hängeblätter tiefsamtigviolettblau	— superba. Dunkelblau, großblumig. 80 cm 0.50
mit klarem, breiten lichtlila Rand. Domblätter weiß	— Perry's blue. Große, klarblaue Blumen auf starken hohen Stielen. 80 cm VI-VII 0.50
mit lichtlila Rand. 80 cm. Spät 1.50 — Rheinfraube.Domblätter reinlavendelblau, Hänge-	— Strandperle. Reinhimmelbl., sehr reichbl. 80 cm . 0.50
blätter purpurviolett. 100 cm. Mittelfrüh 0.60	— spuria. Schwertförmige, lanzettlich-lineale Blätter.
— Riese v. Cönnern. Große herrlich reinhimmelblaue	Blumen weißlichgelb, blau geadert, innen violett.
Blumen. 120 cm. Spät	60 cm VI-VII 0.70
— Rota. Dom seidenartig karminrosa, einige Ton-	- versicolor. Blätter schmal, schwertförmig, Blumen
stufen heller als die deutlich geaderten, jedoch nicht	dunkelviolett. 60 cm VI-VII 0.40
geränderten Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh 0.60	— Wilsonii. Mit hellgelben, wachsartigen Blumen. 80 cm 0.50
— Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamt- violett mit weißer Aderung. 60 cm. Mittelfrüh 0.60	Iris Kaempferi, Japan. Pracht-Schwertlilien ○□ ¾
— — Salonique. Dom hellgelb, Hängebl. dunkelpurpur 0.80	Die Einzelblüten sind von riesiger Größe u. weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. An Teich-, Bach-
— — Schwanhild.Diezart.,lilarosaFarb.derBlüt.machen	und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung.
sie für die feiner Binderei wertvoll. 60 cm. Mittelfrüh 0.40	60 cm VI-VII
— Sirius. Siehe Neuheiten	Wir liefern ein feines Sortiment. 100 St. in 10 Sort.
— Souvenir de Mad. Gaudichau. Blumen violett-	unserer Wahl zu RM 60.—. 25 Stück zum % Preis.
purpur, sehr starkwüchsig, reichblühend und großblumig. 70 cm. Mittelfrüh 1.—	— Alfukurin. Weiß mit lilablauen Flecken u. Rändern 0.80
- Spectabilis. Reindunkelblau mit weinrot. Anflug.	— — Akashi. Sehr großblum., rötlichviolett, weiß geadert 0.80 — — Gei-sho-ui. Rötlichpurpur, gelbe Flecken 0.80
50 cm. Früh 0.40	— Gekko-no-nami. Großblumig, weiß 0.80
— — Srinager. Reinanilinblaue Domblätter und schmale,	— — Gofukushoshu. Starke violettrote Aderung auf
tiefpurpurne, fast schwarze Hängeblätter. 45 cm. 1.—	grauem Grund
— Thorsten. Dom lavendelblau, Hängeblätter dunkel-	— Hinode-Sakura. Lilarosa, Stempelbl. tiefviolettrot 0.80
samtblau. 60 cm. Spät	— Kumoisho. Rötlichpurpur Aderung auf grauem
— — Thrudwang. Dom kräftiggelb, Hängeblätter tiefdunkelpflaumfarbig. 60 cm. Mittelfrüh 0.60	Grund. In der Mitte einen gelben Flecken 0.80
— Toelleturm. Die tiefsamtigvioletten, weißgerand.	— Misuji-no-ito. Weiß mit breitem rosa Ring 0.80 — Mrs. Stanley. Rötlichpurpur, hellere Ränder 0.80
Hängeblätter stehen zu dem schneeweißen Dom in	— O-torige. Hellpurpur, purpur geadert 0.80
gutem Kontrast. 70 cm. Mittelfrüh 0.60	- Shigano-ura-nami. Tiefviolett, weiß geadert 0.80
— Vingolf. Hängebl. tiefsamtigviolettblau, stumpf-	— Shimoyo-no-tsuki. Weiß, hellblau schattiert 0.80
cremefarbene Domblätter. 60 cm. Mittelfrüh 0.00	Shira-no-tamoto. Rotviolett mit gelbem Flecken . 0.80
— White Knight. Siehe Neuheiten 0.80	— Shishi-no-ikari. Rötlichpurpur, dunkler geadert . 0.80
Verschiedene Iris-Arten ○□ ⊥ Nachstehende Sorten können außer auf Blumen-	— Shu-fu-raku. Rosa, im Zentrum gelb. Rot geadert 0.80
Rabatten auch an seuchten Usern von Gewässern	— Ujaka. Großblumig, weiß, gefüllt 0.80 — Ushio-no-kemuri. Violettblau, weiß geadert 0.80
prachtvoll verwandt werden V-VI	— Wakamusha. Weiß, scharf violett geadert 0.80
Iris aphylla. Große, germanicaähnliche leuchtend wein-	— Yube-no-sora. Äußere Blumenblätter bläulich,
rote Blumen. Die Blütezeit liegt zwischen Iris	innere Blumenblätter rotviolett, weiß geadert 0.80
pumila und interregna, was sie besonders wertvoll	Yurushi-no-iro. Tiefviolettrot, sehr großblumig . 0.80
macht. 40 cm V 0.60	— Prachtmischung aller Farben 0.60
— caespitosa. Siehe unter niedrig bleibenden Stauden.	Kirengeshoma palmata. Siehe Neuheiten 1.20 Kniphofia, Japan. Fackellilie, Liliaceae ○ □ 🌣 ⊥ ∧
— chrysographes.Mitdunkelvioletten Blumen,die pracht- voll goldgelb gezeichnet sind. 60 cm. VI-VIII 0.70	Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich
— Margot Holmes. Siehe Neuheiten 1.—	auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer
— Delavayi. Rötlichviolett mit weiß, schlank gestielt.	ähnlichen Blütenkolben VI-IX
70 cm VI-VII 0.60	— corallina. Leuchtend korallenrot. 60 cm 0.80
- ensata. Schmales, aufrecht stehendes, grasartiges	elegans multicolor. Die großen Kolben erscheinen in
Blattwerk. Violette Blumen mit dunkleren Adern	rot, orange, gelb und creme Tönungen. Sie blüht
und gelblichem Schlund. 50 cm VI-VII 0.70	sehr früh und remontiert sehr gut. 60 cm 0.50





Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St. R.M. Veriebedia (Ferriebedia (Ferr	Lobelia, Lobelie, Campanulaceae ○ □ X 1St.
Kniphofia (Fortsetzung)	— coerulea. Aufrechte Staude mit lanzettlichen Blättern
— gracilis Goldelse. Siche Neuheiten 0.70	u. leuchtend blauen Rispenblüten. 40 cm VI-VIII 0.50
— — hybr. Grasart. Belaubung. Sehr zierl. Blütenkolben	Luninus Lunino Loguminosao O D V 1 D "1/"
in den Farben hell- bis dunkelgelb, rot bis orange 0.60	Lupinus, Lupine, Leguminosae O X \(\perp\) Prächtige
— hybr. Luna. Siehe Neuheiten 1.—	buschige Stauden mit fingerförmig geteilten Blättern
— Aetna. Enorme, glühendrote Rispen. 80 cm 1.—	und langen üppigen Blütenähren. Kultur in jedem
- Express. Farbe leucht. hell-bis dunkelorange, variiert	Boden, 60–100 cm V-VIII
jedoch auch in lachs- und karminrot. Diese Sorte	— polyphyllus Ada. Siehe Neuheiten 1.20
hat in unserer Gärtnerei die stärksten Winter, nur	— albus. Cremeweiß, lange Rispen 0.40
durch eine Fichtenreiserdecke geschützt, ohne jeg-	— — Bayern. Einzelblüte zur Hälfte blau und zur Hälfte
lichen Schaden zu nehmen, ausgehalten. Sehr früh-	weiß
blühend. 80 cm	— — Black Knight. Siehe Neuheiten
— Glow. Korallenrot, sehr frühblühend. 50 cm 1.—	carmineus. Karminrot, von großer Leuchtkraft . 0.60
Solfatere. Hellgelb blühend. Sehr auffallende Sorte.	— Chocolade Soldier. Siche Neuheiten 1.50
70 cm	- Countess of March. Siehe Neuheiten 2.50
— Tuckii. Gelborange, sehr widerstandsfähig. 80 cm 0.50	— — Downers Delight. Siehe Neuheiten 1.50
— uvaria grandifl. Großblumig, orangescharlach. 80 cm 0.60	— — Downers Pink Pearls. Siehe Neuheiten 1.20
Lathyrus, Prachtwicke, Leguminosae ○ X	— Elisabeth Arden. Siehe Neuheiten 1.50
— latifolius. Die perennierende Wicke, prächtig rosa blü-	— — Flamingo. Siehe Neuheiten
	— — Goldcrest. Siehe Neuheiten 1.50
	— — Goodwood. Siehe Neuheiten 1.50
	— — Harkness Hybriden. Vom zarten himmelblau bis
Lavandula, Lavendel, Labiatae O 🗆 : X VII-VIII	zum tiefsten dunkelblau, orange, weiß, rosa 0.40
- vera. Der echte Lavendel mit seiner graugrünen Be-	— — Magnificense. Siehe Neuheiten 1.50
laubung und den schön lila Blütenähren ist sehr ge-	— — Moerheimii. Rosablühend, von kompaktem Wuchs
eignet für Steingärten und Kanten. 40 cm 0.40	und intensiver Farbe 0.60
— alba. Siehe Neuheiten 1.20	— Nelly. Siehe Neuheiten
— Dwarf blue. Ganz niedere Art mit dunkelblauen	— — roseus. Rosarot, mit hohen Blütenschäften 0.50
Blumen, sehr wohlriechend. 30 cm 0.50	— Roy Prichard. Siehe Neuheiten
— Middachten. Gedrungene Form, Blumen dunkel-	— Ruby King. Siehe Neuheiten
blau. 40 cm 0.50	— — Sunshine. Großblumig, goldgelb
- Munstead var. Leuchtend blaue Blüten, beson-	Lychnis, Lichtnelke, Caryophyllaceae ○ □ ×
ders stark duftend. 50 cm	- chalcedonica. Brennende Liebe. Aufrechte ansehn-
— — latifolia. Silbergraue, besond. breitblättrige Form.	liche Staude für jeden Gartenboden. Blüte leuchtend
50 cm	
Lavatera, Strauchmalve, Malvaceae O D L A	scharlach. 80 cm VI-VII 0.40
— olbia rosea. Große rosa, malvenartige Blumen an	—— fl. pl. nana. Niedrige gefüllte Form der feuerroten,
langen Stielen. 150 cm VII-IX 0.70	Brennenden Liebe. 40 cm VI-VII 0.60
Lepachys, Schwarzköpfchen, Compositae ○ □ X	— coronaria (tomentosa). Silbergraue, sparrig wachsende
- pinnata. Herrliche Rudbeckiaähnliche Staude mit hell-	Staude mit blutroten Blüten. 70 cm. VII-VIII 0.40
gelben Strahlenblüten, in deren Mitte sich, stark	— dioica rubra plena. Hübsche, rosarot gefüllte Blumen.
kontrastierend ein schwarzer Kegel erhebt.	40 cm V-VI 0.50
150 cm VII-IX 0.60	— viscaria. Siche Viscaria.
Leucanthemum. Siehe Chrysanthemum	Lychsilene, Pechnelkenbastard, Caryophyllaceae 🔾 🗆
Liatris, Prachtscharte, Compositae O D X Schöne,	— grandiflora. Ein Bastard zwischen Silene asterias und
kerzenartige Blütenähren, dicht besetzt mit meist	Viscaria viscosa. Die Pflanze gleicht einer robust
purpurfarbigen Blütenköpfen die von oben nach	wachsenden Viscaria. Leuchtend purpurrote große
unten aufblühen VII-IX	Blüten an stark verzweigten Stielen. 70 cm.
— callilepis. Straffaufrechtwachsend, leuchtend purpur-	Selten VI-VIII 0.60
rote Blütenkerzen. 50 cm	Lysimachia, Felberich, Primulaceae ○ ≅-()
graminifolia. Bis 100 cm hoch, leuchtend purpur 0.50	— clethroides. Die weißen, endständigen Blütentrauben
— pycnostachya. Leucht. purpurrosa, großblumig. 100 cm 0.60	haben viel Ähnlichkeit mit denen einer Clethra.
— spicata. Violettpurpur. 50 cm 0.50	80 cm VII-VIII 0.50
Ligularia. Siehe Senecio.	- longistachys. Die beblätterten Stiele endigen in eine
Linaria, Leinkraut, Scrophulariaceae O X	dichte, überhängende Traube weißer Blüten.
— macedonica. Aufrechtwachsendes Sträuchlein mit	50 cm VII-VIII 0.50
silbergrauer Belaubung und gelben Blüten. 60 cm 0.50	— phyllocephala. Siehe Neuheiten 1.20
— Siehe auch niedere Stauden.	— punctata. Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben
Lindelofia, Trauben-Gedenkemein, Borraginaceae	fünfsternigen Blüten. 50 cm VII-VIII 0.50
— longiflora (spectabilis). Rauhblätterige Staude mit	Lythrum, Weiderich, Lythraceae ○ ≅ □
großen vergißmeinnichtähnlichen saphirblauen Blu- men, 50 cm V-VI 0.50	Die hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegen-
	ständigen Blättern dicht besetzt, leucht. purpurne
Linum, Lein, Linaceae O – ∞ \triangle \square	Blütenstände VII-IX
— austriacum. Leuchtend blaue Blüten. 40 cm VII-VIII 0.50	- Crimson Dwarf. Eine weithin leuchtende rotblühende
— flavum. Goldgelbe Blumen. 40 cm VII-VIII 0.40	niedere Sorte. 60 cm
- perenne. Große hellblaue Blüten und nadelförmige	- Lady Sackville. Große Dolden. Leuchtend rosenrot.
Blättchen. 50 cm VII-VIII 0.40	80 cm
— album. Mit weißen Blüten. 50 cm VII-VIII 0.50	- Rose Queen. Von besonders zierlichem Wuchs.
- narbonnense. Großblumig, himmelblau.	Schlanke, lockere lachsrosa Blütenähren. 80 cm . 0.50
50 cm VII-VIII 0.50	— salicaria atropurp. Dunkelrote Blütenähren. 120 cm 0.40
— Six Hills var. Siehe Neuheiten 1.50	roseum superbum. Leuchtend lachsrosafarbige

Paeonia albiflora (Fortsetzung) 1 St. Papaver orientale (Fortsetzung) 1 St. Papaver orientale (Fortsetzung)				
— prolifera tricolor. Reinweiß 1,20	— King George. Mit gefransten, reinscharlach Blu-			
— purpurea superba. Lebhaftdunkelpurpur 1.20	men. 100 cm			
— Rubra Triumphant. Leuchtend dunkelpurpur . 1.20	— — Lady Roscoe. Ladsrot. 70 cm			
- Sarah Bernhardt. Großblumig, leuchtend rosa 1.50	— Lord Lambourne. Orangescharlachrot, Blumen-			
— Solange. Lachsfarbigorange, in der Mitte hellrosa 1.50	blätter eingeschnitten. 80 cm			
— Souvenir de l'exposition Universelle. Scidenrosa 1.20 — sulphurea. Cremefarben	— Mahony. Mahagonibraun, sehr groß. Blum. 100 cm 0.60			
— Thorbecke. Leuchtend rot	— — May Queen. Gutgefülltblühend, tieflachsrot. 80 cm 0.50			
— — Triomphe de l'exposition de Lille. Silbrigrosa . 1.20	— May Sadler. Siehe Neuheiten			
— Triumphans gandavensis. Zartlila, Füllung hell-	Mrs. Stobarth. Großblumig, leucht. dunkelkarmin.			
gelb mit lachsfarben	— Olympia. Siche Neuheiten			
	— Orangekönig. Leuchtend orangescharlach. 80 cm 0.50			
Einfachblühende, europäische Sorten:	— Perrys Weiße. Atlasweiß mit dunkl. Flecken. 80 cm 0.50			
— Brutus. Rosa mit gelben Staubfäden 1.20 — Clothos. Karminrosa mit Silberrand 1.20	— Peter Pan. Leuchtend kirschrote Zwergsorte. 30 cm 0.60			
- Conus. Fleischfarbigrosa	 — Prinzess Ena. Kleinblumig, lachsrosa. 40 cm 0.60 — Roland. Großblumig, anemonenart., scharlachrot. 			
— — Hogarth. Purpurrosa	70 cm			
— Holbein. Hellseidenrosa 1.—	— Rotkäppchen. Hellzinnoberrote, niedr. Sort. 40 cm 0.60			
— Ludwig Richter. Pfirsichfarben 1.—	— Sturmfackel. Siehe Neuheiten			
— — Murillo. Lichtfleischfarbenrosa m. gold. Staubgefäß. 1.— — — Rembrandt. Leuchtend blutrot mit Atlasglanz 1.50	— Thora Perry. Siehe Neuheiten			
— Van Dongen. Schr großblumig, rosa 1.20	wertvollsten. 80 cm 0.50			
— Whitley major. Sehr großblumig, reinweiß 1.50	— — Wunderkind. Karminrosa Riesenblumen. 80 cm 0.60			
Einfachblühende und halbgefüllte	— Württembergia. Tiefblutrot, besond. großblumig.			
japanische Sorten:	100 cm			
— Ginko-nishiki. Weiß, purpurn gestreift und ge-	Paradisea, Graslilie, Liliaceae ○ — (□ X			
flammt. Mitte eigelb. 70 cm 1.50 — Hinodesekai. Karmin in rosa übergehend. Große	— liliastrum giganteum. Grasartige linealische Blätter,			
innere Blumenblätt., rosig mit gelb geflammt. 80 cm 1.50	schlanke Blütenstiele mit einfachen, weißen Blüten-			
— — Hyakka-to. Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter	ähren. 40 cm V-VII 0.70			
strohgelb, ballförmig zusammengekrümmt. 80 cm . 1.50	— major. Schöne weiße an kleine Gladiolen erinnernde Blumen. 40 cm V-VI 0.60			
— Kunimori. Lockergefüllt, dunkelkarmin, Staubblätter lebhafthellgelb. 80 cm	Peltiphyllum (Saxifraga), Schildblatt,			
— Meigetsuko. Blaßlilarot. 100 cm 1.50	Saxifragaceae $\bigcirc\cong - \bigcirc \bot$			
— — Mine-no-momiji. Seidigweiß, rahmgelbe Mitte 1.50	— peltatum. Große, schildförmige, bis 30 cm breite			
— Ohirama. Dunkelrosa, lockergefüllt, Staubblätter	Blätter und hohe rosa Blütenrisp. 50 cm. V-VI 0.70 Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae O X			
bandartig strohgelb. 80 cm	Eignen sich ihrer mittleren Höhe u. Reichblütigkeit			
wellt, hellgelb. 60 cm	wegen besond. zur Rabattenpflanzung. VI-IX			
— — Shiraginu. Lockergefüllt, rahmweiß, Staubblätter	- barbatus hybridus (Chelone). Hohe Rispen, zart-			
zungenförmig, schwefelgelb. 70 cm 1.50 — — Tamabotan. Gefüllt, rahmweiß, schwachrot ge-	rosa bis purpurrot. 70 cm			
streift. 80 cm	— hybr. nanus. Eine Zwergform obiger Sorte. 40 cm 0.50			
Paeonia, verschiedene Sorten, 40-50 cm:	— glaber. Große Schmallanzettliche Belaubung und schöne			
- officinalis fl. pl. Purpurrot gefüllte Bauern-Pfingstrose 1	himmelblaue bis rosa Blütenrispen. 40 cm 0.50 — heterophyllus True Blue. Siehe Neuheiten 1.—			
— alba plena. Weißgefüllt V-VI 1.—	— hybr. Andenken an Hahn. Die Blütenrisp. erscheinen			
— mutabilis plena.Rosa, spät.weiß, gefüllt V 1.— — rosea plena. Rosa, gefüllt V-VI 1.—	in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer hin-			
— tenuifolia. Geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuch-	durch. Die Farbe der Blüten ist ein leuchtendes			
tend rot VI-VII 1.50	weinrot mit hellem Schlund. 40 cm 0.60 — Andenken an Purpus. Siehe Neuheiten 0.80			
— fl. pl. Gefüllt purpurrot VI-VII 1.50 — rosea. Einfach, rosablühend V-VII 1.50	— laevigatus digitalis. Breitovalblättrige Art mit			
— rosea. Einfach, rosablühend V-VII 1.50 — Wittmanniana hybr. Schön geformte, einfache Blumen,	großen weißen Blüten. 80 cm			
schwefelgelb in lachsrosa übergehend V-VI 2.—	— Siehe auch niedere Stauden.			
Papaver orientale,	Petasites, Pestwurz, Compositae ○ ≅ ①			
Riesen-Türkenmohn, Papaveraceae O D X	— japonicus giganteus. Dekorative Blattpflanze. Rosa Blütenschäfte vor den Blättern. 50 cm IV-V 0.70			
Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuch- tenden Farben ist der Riesen-Mohn eine allgemein	— niveus. Weißfilzige große Blätter. 40 cm IV-V 0.40			
gesuchte Zierstaude. Nach der Blütezeit schneide	— officinalis (Tussilago vulg.). Starkwachs., heimische			
man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab,	Blattpflanze für größere Anlagen. 50 cm			
da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben V-VI	Phlomis, Filzkraut, Labiatae ○ ⊥ □			
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in	- Hausknechti (capitata). Aufrechte, weißgrau behaarte,			
10 Sorten unserer Wahl zu RM 40.—	buschige Staud. mit gelblich-weißen, quirlständigen			
25 Stück zum ⁶ / ₀ Preis.	Blüten, 60 cm			
— Feuerzeichen. Zinnoberrot, guter Bau. 70 cm 0.50 — Goliath. Große Blumen, brennendscharlachrot.	— samia. Eilanzettliche, silbergraue Belaubung und prächtige, goldgelbe, quirlständige Blüten.			
100 cm	60 cm V-VII 0.60			
— gracile Perkeo. Siche Neuheiten 1.—	— viscosa (Russeliana). Behaarte Blätter und große			
— — Großfürst. Dunkelrot m. schwarzen Flecken. 100 cm 0.50	gelbe Lippenblüten. 70 cm VII-VIII 0.60			

1	Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Phlox	paniculata (Fortsetzung)	1 St.
Phlox	Arendsii,		Camillo Schneider. Verbesserung der alten, roten	1 St. RM
	Flammenblume, Polemoniaceae 🔾 🗆 🗶 Krcu-		Aegir, Diumen bedeutend groker und leuchtender	
	zung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe		ou cm. Spat	0.50
	der divaricata mit den besten paniculata-Sorten,		Carmen. Rein leucht, karmin, kompakter Wuche	
	die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschließen und bis zum vollen Erblühen der Phlox paniculata		besonders spätblühend, großdoldig. 60 cm. Spät. Caroline van den Berg. Enorm große Blüten von	0.50
	hinreichen V-IX		aunallend blauer Farbe, überaus große Dolden	
	Amanda. Blüten mittelgroß, hellila mit dunkler		70 cm. Mittel	0.50
	Mitte. 40 cm		Daily Skelch. Siehe Neuheifen	0.80
	Charlotte. Weiß mit rosa Schein und dunkllila		Deutschland. Orangerot, nicht verblassend. 90 cm. Mittel Direktor, Dr. Vassel, Dr. Vas	0.50
	Auge. 60 cm		Dieklor Dr. vogel. Blauviolette Blumen große	
	blumig. 60 cm		Doniell. 100 cm. Militel	0.50
	Grete. Weiß, in der Krone etwas rosa scheinend.		Dr. Konigsnoter. Feurigzinnoberscharlach mit	
	50 cm		dunkelblutrotem Auge. 60 cm. Mittel Eclaireur. Purpurkarmin, großbl. 80 cm. Mittel Elisabeth Campbell H. B. & C	0.40
	Hilda. Weiß, lila Schein u. leucht. rosa Auge. 40 cm 0.50		Ensure Callibrell. Hellachet in work Vantania	0.40
	lnge. Reinrosafarbene, weißgeaugte Blum. 60 cm 0.50		Trachilotta Matte bellen 100	0 50
	Käthe. Helles purpurrosa m. dunklem Auge. 50 cm 0.50		- Hall Fladia, Gillhendkarminrot produce 60	060
	Lisbeth. Weiß mit zartlila Rückseite. 60 cm 0.50		Erntefeuer. Siche Neuheiten	0.80
	Luise. Hellila mit lilakarmin Auge. 60 cm 0.50 Marianne. Dunkelblauviolette Blüten. 40 cm 0.50		2 va i Ocisiei. Sent großblumig, leuchtend la deroga	
	maculata,		verbesserting der Sorte E. Campbell 50 am	060
	Flammenblume, Polemoniaceae O = X Ent-		L'origenie, vornehm rosa coha ano [J.1] 70	O EO
	stammen einer Kreuzung mit Phlox suffruticosa,		Fellbacher Porzellan. Zartlila mit heller Mitte.	0.10
	denen sie auch sehr ähnlich sind VI-IX		Todala. Leucht.orangescharlach Mittodunklan	0 50
	Alpha. Elegante Rispen leuchtend rosafarbener		. Stelle Neuherten	080
	Blüten. 80 cm		edilo. Ein besonders glühendes rot zeichnet diese	
Annelities	Rosalinde. Leuchtend karminrosa mit dunklem Auge. 100 cm		dankbare Sorte aus. 60 cm. Mittel. Fidelio. Reinweiß mit großer auffallender, karmin-	0.60
	Schneelawine. Blendendweiß. 80 cm 0.40		roter Fifte, ov cm, Wiffel	060
	suffruticosa (glaberrima)		Tillidillelli. Zartlila m. weils Anna En Milli	0 10
TIIIOX	Flammenblume, Polemoniaceae O A Be-		The Amon buchiler, Schneewerke Riston and	
	ginnen 4 Wochen früher als Phlox paniculata zu		Frau Paul Pfitzer. Großblumig, schr zartrosalila.	
	blühen und remontieren bis zum Eintritt stärkerer		V Cili. L'IIIICI	0 50
	Fröste. Langgestreckte schmale Rispen. VI-IX		Tod Rullerly, OroRollimia orangement 20 E "1	0 10
-	Gryp. Weiß mit rosa Auge. 60 cm 0.40 Indian Chief. Dunkelpurpurlila. 60 cm 0.50		Freifräulein von Laßberg. Reinweiß, großblumig, große kompakte Dolden. 60 cm. Mittel	
	Magnificense. Purpurkarmin. 60 cm 0.40		reminer. Edutrosa, sehr trubblibend 50 am	0 10
	Snowdon. Lange Blütenschäfte, vollbesetzt mit		Official valle Culti. Lelichi la cherot m was le	0 10
	blendendweißen Blumen. 60 cm 0.40		Ocoly Olbrich. Oberaus groke Einzelblitan von	
Phlox	paniculata (decussata)		leucht, dunkelrosa Farbe mit großer weißer Mitte. 100 cm. Mittel Georg Stipp, L. J.	0 50
	Flammenblume, Polemoniaceae O = X Schönste	-	Coly Shipp. Lamsrot mit karmin Ange and ha	
	u. dankbarste Staude von unerschöpflichem Farben- reichtum. Sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger		solders kraftigen Dolden, 60 cm Mittel	0.50
	Lage. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten,		Ciciodes Clory, Grobblumor frofising brown	
	neuesten großblütigsten Züchtungen . VII-IX		40 cm. Mittel	0.80
	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sort. uns. Wahl RM 32.— 25 St. zum ⁰ /o Preis.		olati striatricht und rotem Auge, 100 cm Spät	0.40
Service and provincians	Administrator. Scharlachorange mit rotem Auge.		Old Leppelli. Großblumig, blendend weiß mit	-
	60 cm. Mittel		karminrotem Auge. 60 cm. Früh	0.50
	Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem		soliders medrig im Wuchs, 50 cm. Mittel	0.50
	Auge. Riesige Dolden. 80 cm. Früh		ridis voilitoller. Lila m. weik. Mitte 70 cm Spite	0.10
	Schöne, runde, kompakte Büsche. 60 cm. Mittel . 0.60		riddpillatili Nolli. Leuchtend dunkelkarminrot	
	Alfred Weifs. Großbl., veildenbl. 50 cm. Mittel 0.50	= -	Großblumig und großdoldig. 80 cm. Mittel H. B. May. Reinrosa, besonders großdoldig. 80 cm.	0.60
	Andenken an Wilhelm Pfitzer. Karminrosa, sehr		1 icidunkelrosa mit rotem Auge	
	gute Gruppensorte. 100 cm. Mittel 0.50 Anton Mercier. Großblum., zartlila. 60 cm. Mittel 0.40	_	To Chi. Printer	0.50
	Asien. Lilarosa m. leucht. karmin Auge. 60 cm. Spät 0.50		Illidenburg. Große Dolden von mildestem rot	
	Australien. Karminviolett. 80 cm. Mittel 0.40		60 cm. Früh Jules Verne. Tiefviolettblau. 100 cm. Mittel	0.50
	Baron v. Dedem. Orangerot, Auge karmin. 70 cm.		Juliglut. Schr großbl., gühendkirschrot. 60 cm. Früh	0.40
	Mittel		Junius. Sehr großblum., lachsrosa, nicht verblassend	0.60
	Mittel		Napitan Konig. Lachsrosa mit karmin Auge. 70 cm	0.50
	Biedermeier. Siehe Neuheiten 0.80		Karr Foerster. Farbe glühenddunkelorangeret große	,
generalization (Applications)	Border Gem. Tiefdunkelviolette, breite, große Dolden. Sehr starkwüchsig und widerstandsfähig.		Einzelbluten. 70 cm. Mittel	0.50
	40 cm. Spät		Kommerzienrał Borsig. Leuchtend zinnoberrot mit karminrotem Auge. 80 cm. Mittel	t 0.40

Phlox	paniculata (Fortsetzung) 1St.	Physalis, Lampionpflanze, Solanaceae ○□ X 1St.
	Le Mahdi. Tiefdunkelblau. 80 cm. Mittel 0.40	- Franchetii. Mit hübschen, leuchtd. roten ballonartigen
	Leo Schlageter. Große pyramidale Dolden schar-	Früchten in den Blattwinkeln. 60 cm VIII-IX 0.40 — Bunyardii. Schr große, zinnoberrote, ballonartige
	lachkarminroter Blumen mit dunklerem Zentrum.	Früchte. 40 cm VIII-IX 0.40
	100 cm. Früh	Physostegia, Etagenerika, Labiatae ○ □ X
	Lofna. Silberrosa mit weißem Spiegel. 90 cm. Mittel 0.40	- virginiana alba. Lederartige Belaubung mit weißen
	Loki. Reinlachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring.	Lippenblüten in aufrechten langen Ahren. 80 cm VI-VIII 0.50
	80 cm. Mittel	— grdfl. Prachtvolle, straffe, rosablühende Sorte.
	blumig und großdoldig. 70 cm. Mittel 0.60	80 cm V1-V111 0.40
	Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm. Spät 0.40	— Vivid. Siehe Neuheiten 0.80
	Lukas Schwinghammer. Leuchtend karmin mit blutrotem Auge, sehr großblumig. 70 cm. Mittel . 0.60	Phytolacca, Kermesbeere, Phytolaccaceae O-D 1
	Mandelduft. Siehe Neuheiten	- americana (decandra). Eigenartige Staude von exotischem Aussehen. Weiße Blütenrispen, denen
	Mia Ruys. Großblumig, reinweiß, reichverzweigt.	im Herbst schwarze Beeren an langen Frucht-
	40 cm. Mittel	trauben folgen. 100 cm VII-VIII 0.70
	blühend, 60 cm. Mittel	Platycodon, Marienglockenblume, Campanulaceae
	Mrs. Ethel Prichard. Groß. zartbläulichrosa Dolden.	— grandifl. Mariesii (Wahlenbergia). Flache, an
	Besonders große Einzelblüten. 80 cm. Mittel 0.60	Glockenblumen erinnernde, leuchtend blaue Blüten.
	Mrs. H. J. Jones. Malvenrosa mit rotem Auge. 80 cm. Mittel	40 cm VII-VIII 0.50
	Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zartrosa.	— — album. Weißblühende Art der vorigen. 40 cm VII-VIII 0.50
	60 cm. Mittel 0.50	Podophyllum, Fußblatt, Berberidaceae → • ● ≅
	Mrs. Rütgers. Zartlilarosa mit dunklerem Auge, große breite Dolde. 70 cm. Mittel 0.50	- emodi majum. Schildförmige marmor. Blätter, einzeln
	Nelkendom. Siehe Neuheiten 0.70	stchende, weiße bis zartrosa Blumen. Taubenei-
	Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrot. Auge. 60 cm 0.50	große rote Früchte. 60 cm IV-V 0.80 Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae ○ □ ¾
	Opal. Siche Neuheiten	— carneum. Auffallender Frühjahrsblüher mit fleisch-
	Mitte, sehr auffallende Farbe. 80 cm. Mittel 0.50	farbigrosa Blüten. 40 cm V-VII 0.80
	Professor Went. Tiefamarantpurpur, sehr reich-	— coeruleum Primadonna. Zarthellblaue Blüten zeich- nen diese kräftig und gedrungen wachsende Staude
	blühend und großdoldig. 50 cm. Mittel 0.50 Rheinländer. Lachsfarbigrosa m. karminrot. Mitte 0.40	aus. 40 cm V-VII 0.50
	Rigoletto. Karminlila, großdold. u. straffwachsend.	- Richardsonii (lanatum). Niedrige Art, prachtvoll
	80 cm. Mittel	himmelblau. 40 cm V-VII 0.50 — album. Blendendweiße Blumen. 60 cm V-VII 0.50
	Rokoko. Schr großblumig, zartrosa. Nicht verblassend. 70 cm. Mittel 0.50	— — album. Blendendweiße Blumen. 60 cm V-VII 0.50 — — pallidum. Reinporzellanblaue Blumen.
	Rosenkavalier. Rosenrot, zeichnet sich durch ro-	40 cm V-VII 0.60
	busten Wuchs aus. 60 cm. Mittel 0.60	— superbum. Mit dunkelblauen Blüten. 40 cm V-VII 0.60
	Saladin. Leucht. scharlachorangerot, blutrot. Auge 0.50 Salom'e. Lachsrosa mit lila Auge. 50 cm. Sehr früh 0.50	Polygonatum, Salomonssiegel, Liliaceae → - ×
	San Antonio. Dunkelblutrot. 80 cm. Mittel 0.60	- officinale. Hängende grünlichweiße Blüten an bogigen
	Schwerins Flagge. Die einzelnen Blumenblätter	Trieben. 60 cm V-VI 0.40
	sind weiß mit einem breiten dunkelrosa Mittelstrich. 70 cm. Mittel 0.70	— multiflorum. Besonders vielblütige u. großblütige Abart der vorigen. 70 cm V-VI 0.50
	Septemberglut. Orangerot m. dunkelkarminrotem	Polygonum, Knöterich, Polygonaceae $\bigcirc - \bigcirc \cong$
	Auge. 70 cm. Spät	- amplexicaule. Stengelumfassende, herzförm. Blätter u.
	Septemberschnee. Siehe Neuheiten 0.80 Sir William Lawrence. Siehe Neuheiten 0.80	schlanke, leucht.rote Blütenähren. 80 cm V-IX 0.60
	Smiles. Schr großblumig, lilarosa mit dunklem	— atropurpureum. Dankbar blühende Bienennähr- pflanze, mit großen Rispen von schwarzroter Farbe.
	Auge. 60 cm. Spät	80 cm V-1X 0.50
	Spätrot. Schöne, dichte Dolden von einem tiefen,	— bistorta superbum. Dichte rote Blütenähren.
	warmen Zinnoberrot. 100 cm. Spät 0.80 StadtgärtnerWaiblinger. Feurigmagentarote, teil-	40 cm VI-VIII 0.50 — album grdfl. Weißbl. Form. 50 cm . VI-VIII 0.60
	weise karminviolett scheinende Bl. 40 cm. Mittel 0.60	— — usuriense. Üppiger wachsende Form mit längeren
	U. Deutschland. Auffall. dunkelorangerot. 60 cm 0.50	fleischfarbigen Blütenähren. 40 cm. VI-VIII 0.50
	Weiße Perle. Reinweiß, reichverzweigte große	— polystachyum. Staudenflieder. Blüht in rosaweißen Blütenrispen. 120 cm VIII-X 0.60
-	Widar. Violettblau mit reinweißem Auge, große	- sacchalinense. Weißblühender Riesenknöterich.
	Dolden. 70 cm. Mittel 0.40	2 m VIII-X 0.50
	Wiking. Dichte Dolden von lachsrosa Farbe.	— sericeum. Mit lanzettlich. Blättern u. reichverzweigten blendendweißen Blütenrispen. 80 cm VI-VII 0.70
	100 cm. Spät	— Siehe auch niedere Stauden.
	Wilhelm Kesselring. Dunkelviolettpurpur mit großem weißem Auge. 40 cm. Früh 0.40	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae O D X Große erd-
	Württembergia. Karminrosa mit hellerer Mitte,	beerähnliche Blumen auf festen Stielen und sehr
	sehr große Dolden. 40 cm. Früh 0.40	wohlriechendes Blattwerk. 40 cm VI-VIII — atrosanguinea (Gibsons Scarlet). Dunkelblutrote
1	W. Ramsey. Violettrot, sehr aparte Farbe und	Blüten, reichblühend 0.50
Dist	reichblühend. 60 cm. Mittel 0.40	- hybr. Carneval. Orangerot, gelb getönt, gefüllt 0.50
Phlo	k divaricata und pilosa. Siehe unter niedere Stauden.	— Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern, gefüllt 0.50

70

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Pyrethrum roseum (Fortsetzung) 1 St.	
Potentilla hybr. (Fortsetzung)	P //	
— Goldkugel. Goldgelb, gefülltblühend 0.50	— Holstein. Rosarote Zwergsorte 0.60 — James Kelway. Sammetrot, mit die schönste und	
— — Harlequin. Blüten scharlach mit goldgelb, halbgef. 0.50	dunkelste	
— purpurea plena. Purpurkarmin, gefüllt 0.50	- Walenglut, Scharlach mit karmesin, Blüten, doppel-	
Star of the North. Scharlachrot, gefüllt 0.50	reinig	
— sulphurea pl. Dunkelbräunlichgelb, gefüllt 0.50 — Wm. Rollisson. Blüten rot mit gelb, halbgefüllt . 0.50	Tyldud. Dunkellilarosa	
— nepalensis Miss Willmott. Äußerst dankbar blühende	1 1 1 1 1 1	
Art mit mittelgroßen, karminrosafarbigen einfach.	- Orion. Große, langstrahlige Blüten von zartrosa Farbe	
Blüten in großer Fülle 0.40	Cikeo. Hellblutrote Zwergsorte	
- Roxana. Leucht. kupfrigrosa mit kirschrotem Auge 0.50	Nubella, Siene Neuherten	
Thurberi. Achnlich der Sorte nep. Miss Willmott, je-	official field unkelrot	
doch dunkelblutrote Blumen	Soprific. Lettered rosa	
Poterium, Wiesenknopf, Rosaceae ○ ≅ □ obtusum. Frischgrün gesiederte Belaubung, lange	Sildifictiviolic, Groke, hellrosa Riuman	
clegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren.	- Tucan. Siehe Neuheiten	
100 cm VI-VIII 0.50	- hybr. Sämlingspflanzen. Feinstes großblumigstes	
— — album. Weißblütige Form. 100 cm . VI-VIII 0.50	Farbenspiel	
Primula. Siehe niedere Stauden. Pyrethrum corymbosum hybridum. Farbenspiel wie		
Pulmonaria. Siehe niedere Stauden.	ber Tyrethrum ros. hybr., jedoch erecheinen die	
Pyrethrum roseum, Bunte Marguerite,	Bruten zu mehreren an einem Stengel und hilden	
Compositae O = X Aus üppigen, von feinzerteilten	daddidi ganze Dittenbuschel. 40 cm. V-VI 0.70	
Fiederblättchen gebild. Blattros. kommen d. bunt.,	Ranunculus, Hahnenfuß, Ranunculaceae	
margeritenart. Blum. hervor. 50-70 cm V-VII	acommonus II. Dl. Liet eingeschnittene Blatt	
Wir liefern ein feines Sortiment gefüllt- u. einfach-	weiße Diutenkopienen auf reichverzweigten Stielen	
blühende Pyrethrum von 100 St. in besten Sorten uns. Wahl mit Namen RM 50.—. 25 St. zum ⁶ / ₀ Preis.	00 cm	
Gefülltblühende	acris fl. pl. Mit dichtgefüllten, goldgelben Blüten.	
— — Alfred. Hellamarant 0.70	— Duidosus (speciosus) fl. pl. Niedrighleibanda Ant mit	
— — Amethyst. Amarantrot 0.70	großen, goldgelben, gefüllt. Blum. 30 cm V-VI 0.40	
— Aphrodite. Reinweiß, sehr frühblühend 0.60	Rheum, Zier-Rhabarber, Polygonaceae ○≅- → ⊥	
— Capella. Der lilarosa Blütenrand umschließt eine	Die Zierrhabarber sind prachtvolle Staulen die	
reinweiße, dichtgefüllte Scheibe 0.50	durch in machiges blattwerk sehr hohen Schmidt	
— Delphin. Chamoisfarben	weit haben	
— Deutsche Kaiserin. Große Blüten von eigenartig schöner lachsrosa Farbe. Mitte cremefarbig 1.—	emoul. Unters, rot belaubt, weike Rlittennian 200	
- Figaro. Großblumig, karminrot 0.70	partition for tubio, platter het goedstatat. f. 1	
— Grefel. Dunkelmagenta, halbgefüllt 0.60	Blütenstände mit tiefroten Blütchen. 200 cm 0.80 - tanguticum. Spitzlanzettliche Blätter, rote Blüten-	
— Hobart Pascha. Dunkelrot 0.70	schaffe. 150 cm	
- Koralle. Scharfdunkelrosa, Blumen gleichmäßig ge-	spense Khabarber. Stehe Obst.	
füllt und kräftig gestielt 0.70 La Vestale. Lila mit silbriger Mitte 0.60	Rodgersia, Schaublatt, Saxifragaceae → = = 1	
- Lord Rosebery. Leuchtendes karminrot 0.70	Reugerst dekorative Schmuckstande mit interessent	
- Madel. le Clerq. Große, lockere, langstrahlige	Laubwerk und schonen spiracenähnlichen Blitten	
Blumen, silbrigrosa	00 100 cm , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
— Montblanc. Weiß. Sehr reichblühend 0.60	— aesculifolia. Kastanienähnliche Belaubung, große, weiße Blütenrispen	
- Non plus ultra. Fleischfarbigrosa 0.60	printed dibd. Diatter dillillin wie die encie	
— Oldenburg. Frischrosa, gutgefüllt 0.60 — Prinz Metternich. Reinweiß, spitzstrahlig 0.70	genedert angeordnet. The veryw Riller 'e o oo	
- Progression. Gefülltblühend, seinzartrosa 0.70	podopity ita. Titt biblizedillo glangend mack.	
— Queen Mary. Blum. von edelster Form, zartes Rosa 0.60	ningeriten Diattern II. Spiracepantaman Div	
— Wega. Chamoisfarben 0.60	sampachona. Die nelaub, eleicht der eines H-II.	
- Weife Aster. Großblumig, weiß 0.60	strauches, die Blütenrispen einer weißen Spiraea . 0.80 tabularis. Gänzlich ungeteilte Blätter, die am Rande	
— White Queen Mary. Weiße Form der bekannten Sorte Queen Mary	geodetice sind und uschformer dem Blasses 1 C	
- Yvonne Cayeux. Reinweiß mit cremesarb. Mitte,	ortzen. Blutenrispen weiß	
spitzstrahlig 0.60	komneya Coulteri, Baummohn, Panaveracoao	
Einfachblühende	Genedelle Diaugrune Belaubung gene	
Aminthe. Leuchtend karminrot 0.60	artige wellse Diumen mit goldgelben Staubfällen	
- Beatrix Kelway. Leuchtend kirschrot 0.60	3 -	
— Donatis. Siehe Neuheiten	Rosmarinus, Rosmarin, Labiatae O $\perp \land$	
— Dr. Bosch. Leuchtend lachsrosa Farbe, wie diese bisher bei Pyrethrum noch nicht vorhanden war . 1.—	- officinalis. Der echte Rosmarin. Blätter und Blüten	
Dr. Parker. Sehr fein salmrosa, großblumig . 0.70	köstlich duftend. Ueberwinterung in frostfreiem	
— Eileen May Robinson. Sehr großblumig, rein-	Raume nötig od. gute Laubdecke. 50 cm VII-VIII 0.70	
rosa, auf straffen Stielen	Rudbeckia, Sonnenhut, Compositae O = X \(\subseteq \text{Sic haben} \)	
— Feuerstrahlen. Feurigkarminrot 0.60	alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer staunenswerten Blühwilligkeit.	
- Freya. Reinmalvenrosa, edel geformt 0.60	VV CITE ATISDI UTISVOTI.	
— — Hamlet. Lebhaftrosa	- flava. Rudbeckia speciosa sehr ähnlich: blake: 1	
ridioid Robinson, Herriadisdiariadikarmesin 0.70	vier Wochen früher als diese. 40 cm. VI-VII 0.40	

Rudbeckia (Fortsetzung)	Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae O - X Sie gehören 1 St.
— laciniata fl. pl. Goldball. Blüte gefüllt, goldgelb;	unbedingt zu unseren besten Schmuck- und Schnitt- stauden, verlangen aber zum guten Gedeihen einen
hervorragend schön. 200 cm VII-X 0.50	nahrhaften Boden VI-X
— maxima. Blaugrüne, glatte Belaubung und große, goldgelbe Strahlenblüten mit schwarzer Mitte.	— caucasica alba. Weiße Art der caucasica. 50 cm 0.50
100 cm. Selten VI-VIII 1.—	— — Amethyst. Siehe Neuheiten
— nitida Herbstsonne. Edelgeformte, große goldgelbe Blumen, straff in der Haltung. 200 cm VII-XI 0.50	— Frieda. Siehe Neuheiten 0.80
— purpurea. Karminrote Blüte von auffallender Schön-	— Mrs. Willmott. Siehe Neuheiten 0.80
heit. 100 em VII-IX 0.50	— perfecta. Blumen sehr groß, hellviolett bis himmel- blau, auf langen, drahtartigen Stielen. 70 cm 0.50
— atropurpurea. Große tiefrote Blumen. 70 cm VII-IX 0.70	— Prachtkerl. Siehe Neuheiten 1.20
— Ideal. Prächtige edle Blumen, leucht. reinrosa. Schr	 Schöne von Eisenach. Bildet runde, gedrungene Büsche. Die großen, hellblauen Blüten erscheinen
großblumige wertvolle Sorte. 100 cm VII-IX 1.20 — Leuchtstern. Farbe edelkarminrot, außerordent-	viele Monate lang ununterbrochen. 60 cm 1.20
lich großblumig. 100 cm VII-IX 1.50	— lagodechiana. Fiederblättrige Art mit lachsrosa Blumen auf drahtartigen Stielen. 80 cm. VII-VIII 0.70
— speciosa (Neumannii). Sattgoldgelbe Strahlen- blüte mit schwarzer Scheibe. Wuchs gedrungen.	Scutellaria, Helmkraut, Labiatae ○ □ X
50 cm VII-X 0.40	- canescens (incana). Feine hellblaue, drachenförmige
= subtomentosa. In Belaubung, Blüten und Blühwillig- keit wie Rudbeckia speciosa (Neumanni), nur daß	Blumen an kräftigen Rispen in großer Fülle. Nach der Blüte wirken die violetten Bracteen wie bei
die Pflanze höher wird. Hervorragende, außer-	Salvia nemorosa. 80 cm VII-IX 0.60
ordentl. lang blühende Staude. 100 cm VII-X 0.60	— baicalensis (macrantha). Blätter ganzrandig, Blüten
Ruscus, Mäusedorn, Liliaceae () → () Mit immergrüner, lederartiger Belaubung u. roten	reinblau, auf hohen Rispen. 50 cm VII-VIII 0.50
Beeren im Winter VII-VIII	Sedum, Fetthenne, Crassulaceae ○—① □ — aizoon. Lanzettliche, gezähnte Blätter und gelbe
— aculeatus. Mit stechenden Blättern. 40 cm 0.80 — racemosus. Graziöser Wuchs, breitere Blätter. 80 cm 1.	Blütendolden. 40 cm VI-VII 0.40
Ruta, Raute, Rutaceae O	— fabaria Brillant. Dickes, breit ovales, frischgrünes Laub und dunkle, tiefamarantrote Blütendolden.
— graveolens. Feinzerteilte, bläulichgrüne Blätter und	40 cm VII-VIII 0.50
gelbe Blüten, 50 cm VI-VIII 0.50	— Carmen. Dunkelpurpurrot, sehr großblumig. 40 cm VII-VIII 0.50
Salvia, Salbei, Labiatae ○ □ — azurea grdfl. Weidenartige Blätter und schöne blaue	— — fol. var. Gelbbuntblättrige Form, rosa Blüten.
Blütenrispen. 100 cm VIII-X 0.80	40 cm VII-VIII 0.60 — telephiumatropurpureum. Mit schwarzpurpurner Be-
— Jurisicii. Belaubung stark fiederteilig und behaart. Hellviolette Blütenrispen. 40 cm VII-VIII 0.60	laubung u. gelben Blütendolden. 40 cm VIII-IX 0.50
— nemorosa superba (S. virgata nemerosa). Die grau-	— — Munstead Dark Red. Siehe Neuheiten 1.—
grünbelaubten Büsche bringen in reichster Fülle schlanke, aufrechte Blütenähren von leuchtend vio-	Senecio, Kreuzkraut, Compositae ○ ≅ ⊥ □ X Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für Park,
lettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche rötlich-	Rabatte und Teichränder VII-VIII
violett. Gilt z. Zt. als die beste Bienenfutterpflanze da det Honig den Salbeigeschmack annimmt.	— clivorum. Dekorative Staude mit großem Blattwerk und leucht. orangegelben Blütenständen. 100 cm . 0.60
50 cm VII-IX 0.50	— — Orangekönig. Sehr schöne, große orangef. Blum. 0.70
— alba. Weißblühende Form der vorigen. 40 cm 0.70 — officinalis. Silbergrau belaubte, halbholzige, immer-	— Othello. Blätter im Austreiben dunkelpurpur, Blüten dunkelorange. 100 cm
grüne Staude m. schönen violettblauen Blütenrispen.	— Greyii. Siehe Neuheiten (Gehölze) 1.50
60 cm VII-VIII 0.50 — atropurpurea. Prachtvolle, dunkelviolettpurpurne	— hybr. Hessei. Siehe Neuheiten
Belaubung u. violetten Blüten. 50 cm VII-VIII 0.70	— Przewalskii. Blätter fingerförmig eingeschnitten, gelbe
— tricolor. Herrliche gelbbuntblättrige, immergrüne Belaubung. 40 cm VII-VIII 0.60	Blütenrispen, 80 cm 0.60
— pratensis superba. Schöne leuchtend blaue Blüten.	— stenocephalus. Große, herzförmige Blätter u. lange Aehren gelber Strahlenblüten. 120 cm 0.60
40 cm	— — globosus. Die Einzelblumen sind größer als die der
— alba. Reinweiße Blüten. 40 cm VII-VIII 0.50 — rosea. Leuchtend rosa. 40 cm VII-VIII 0.50	Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen, pyramidenförmigen Blütenstand. 100 cm . 0.80
- ringens. Belaubung fiederschnittig, klebrig behaart.	— — purpureus. Blätter dunkelpurpur, gelbe Bläten.
Prachtvolle, himmelblaue Blüten an langen Rispen. 60 cm VII-VIII 0.70	— Veitchianus. Blütenrispen kerzenartig, Blüte leuchtend
Sanguisorba. Siehe Poterium.	gelb. 150 cm
Saponaria, Seifenkraut, Scrophulariaceae ○ □ X	— Wilsonianus. Mit breiten Blättern, Blütenrispen rein-
— officinalis fl. pl. Rosa bis fleischfarbige, flache große Dolden. 100 cm VI-VII 0.50	goldgelb, kerzenartig. 100 cm
— Siehe auch niedere Stauden.	Stauden mit kleiner malvenähnl. Belaub. u. eben-
Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae) - •	solcher Blüten an langen Rispen VII-VIII
 Fortunei / Interessante Art mit herzförmigen, grünen auf der Unterseite roten Blättern u. Rispen weißer, 	— hybr. Crimson King. Dichte karmoisinrote Blüt. 50 cm 0.50
geschwänzter Blüt. 40 cm. Selten 1X-X 0.80	— — Monarch. Halbgefüllte, dunkelrote Blumen. 60 cm 0.60 — — Mr. Lindbergh. Dunkelrubinrot. 50 cm 0.60
 peltata. Siehe Peltiphylla. tellimoides. Schildförmige, tiefeingeschnittene Blätter 	— Rosy Gem. Mit rosaroten Blüten. 40 cm 0.50
von saftiggrüner Farbe u. grünlichweißen Blüten-	— — Scarlet Beauty. Tiefamarantrosa. 50 cm 0.60
rispen. 60 cm V-VI 0.70	— — Sussex Beauty. Satinrosa, lockerer Blütenst. 50 cm 0.60

Mittelhohe und hohe Stauden Fortsetzung 1 St.	Stokesia, Kornblumenaster, Compositae O 🗆 X 1 St
Silphium, Kompaspflanze, Compositae O 🗆 🗘	Cydned (laevis). Eigenartige, schöne Standa wit H.M.
- perfoliatum. Dekorative Staude mit gelben Blumen	groß, himmelblauen Kornblumen-ähnl Blijten Van
und schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord	langt sonnigen warmen Standorf 40 cm VII IV 060
und Süd gerichtet sind. 200 cm VIII-IX 0.50 Sisyrinchium, Binsenlilie, Iridaceae O 🗆 /	- alba. Weiße Form der vorigen. 40 cm VII-IX 0.00 Stylophorum diphyllum. Siehe Neuheiten 1.—
striatum. Breite, grasähnliche Belaubung. Hübsche.	leiekid. Siehe Buphtalmum.
gelblichweiße Blütenrispen. 40 cm V-VII 0.50 — Siehe auch niedere Stauden.	Thalictrum, Wiesenraute, Ranunculasono o o o
Solidago, Goldrute, Compositae O-O X Alle	againegholidhi. Leighter federbuschartig Blütenstand
Goldruten sind sehr hart und anspruchslos. Die	laubung, 120 cm
Blütenstände gleichen gelben Federbüschen von	I dibdill. Pilt großen, weiken Blütenetänden
schönster Wirkung. — aspera (rugosa). Zierliche verzweigte gelbe Blüten-	OU CHI
stände, 150 cm VIII-X 0.40	100 cm
- ellyptica. Breitblätterige niedere Art mit eleganten	dipiciocalpanii. In pyramidalen Rienan -4.1 1
goldgelben Rispen. 40 cm VIII-IX 0.40 hybr. Frühgold. Breite Rispen von altgoldgelb. Farbe,	The tributted you purphrila farba and 1' 1
sehr frühblühend. 150 cm VII-VIII 0.40	tig kontrastieren. 150 cm
— Golden Wings. Mit goldgelben Blütenrispen.	The state of the s
— Goldelfe. Reichverzweigte Rispen dunkelgold-	gradeant. Diaugrune, schone Relaukung 1
gelber Strahlenblütchen. 80 cm VIII-IX 0.50	gelbe Blütenstände. 150 cm VII-VIII 0.50 minus adiantifolium. Zierliche Pflanze, deren Laub
— Goldschleier. Strahlige, leucht. goldgelbe Blüten,	A Action I diligium (Adlantum) omnoset
straffe pyramidale Rispen. 60 cm VIII-IX 0.50 — Goldstrahl. Hübsche, goldgelbe Blütenrisp, straffer	40 cm
Wuchs und ohne Ausläufer. 80 cm. VIII-IX 0.50	Thermopsis, Fuchsbohne, Leguminosae O C G fabacea. An Lupinen erinnernde Staude mit schönen,
- Mimosa. Reichverzweigte Rispen, goldgelbe Blü-	The state of the s
ten, Mimosa ähnlich. 150 cm IX-X 0.50 — Perkeo. Gleicht im Wuchs virgaurea nana, wird	
etwas höher und blüht später. 40 cm IX-X 0.50	Trachystemon, Borretschaster, Borraginaceae ○ ≅ ○ orientale. Herzförmige Blätter und strahlenförmige
- Schwefelgeisir. Von strafferem Wuchs wie aspera.	
120 cm VIII-IX 0.50 Sonnenschein. Achnlich Goldschleier, mit hellerer	inducation, Diciliasiem Commolination
Farbe und späterer Blütezeit. 50 cm IX-X 0.50	Interessante Staude von mittelhohem, aufrechten Wuchs mit schilfartigen Blättern u. schönen Blüten.
- Spätgold. Spätblüh., gleicht der Sorte Perkeo.	
— missouriensis (Aster hybr. luteus). Eine Masse gold-	Virginialia, Pili Violettolanen Riatan
gelber Sternblütchen auf Riesensträußen. Unent-	- Hutchinsonii Großbland Blüte 0.40
behrliche Schnittblume. Hält sich auch im getrock-	
meten Zustand sehr gut. 60 cm VII-IX 0.50 — mollis. Breitblätterige graugrüne Belaubung, Rispen	
goldgelb, 50 cm VIII-IX 0.80	erecta. Aufrechtwachsende 0.40
nemoralis. Amerikan. Einführung mit schmal lanzett-	ordined redditelled 10t .
licher Belaubung und goldgelben sehr graziösen Rispen, 50 cm VIII-IX 0.60	— — plena. Rote, gefüllte Blumen 0.50 Tricyrtis, Krötenlilie, Liliaceae ○ — □ □
- Shorfii. Altbekannte Art m. groß., leicht federig., gelben	— dilatata. Jap. Art. Im Charakter wie zu bei
Blütenrisp. Wuchs straff aufr 150 cm IX-X 0.40) caver in maratochen, dunkler punk front Di"
virgaurea nana (canadensis). Von niedrigem, straff aufrechtem Wuchs, goldgelbe, federartige Rispen.	
40 cm VIII-IX 0.40	mit eigenartigen gelben, braup gestellt Staude
praecox. Wegen der schon im Juli erscheinenden schlank. gelb. Risp. schr wertvoll. 40 cm VII-VIII 0.40	True victorial (1) (1) (1)
Spiraea Aruncus. Siehe Aruncus silvester.	Tritoma. Siehe Kniphofia. Trollius, Trollblume, Ranunculaceae O = - D = X
Tilipendula, palmata und andere. Siehe Filipendula.	Districtsige Rabatten- und Salarita i
Stachys (Betonica), Scheinziest, Labiatae O grandiflora robusta. Schöne, große purpurrosa Lippen-	or and harosulating Lago 1). Die.
blüten auf kräft. Stielen in dichter, breiter Achre.	rosenartig, kugelig. 40-60 cm. V-VI u. VII-IX Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in
40 cm VII-VIII 0.50	anserer want zu MM 45 — 25 Still
— grandiflora superba. Heller wie vorige, von gleichem Wuchs. 40 cm VII-VIII 0.50	
- Siehe auch niedere Stauden.	europaeus superbus. Hellgoldgelbe Blumen Hybriden. Mischung in gelb u orangen.
Statice, Strandflieder, Plumbaginaceae O D X	hybr. Atna Tieforangerote Blitter
Aus großen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die	— Canary Bird. Kanariengelbe Blüten
abgeschnitten und getrocknet sehr lange haltbar	— Earliest of All. Früheste von allen, ungeheuer reich- blühend, großblumig, goldenlik
sind. 40 cm VII-VIII	— — Empire Day, Hellorangerell, S. 1 0.60
— eximia alba. Mit großen, weißen Blüten 0.50 — latifolia. Mit Massen kleiner blauer Blütchen 0.50	
— limonium. Blätter verkehrt eiförm., Blüt. blauviolett 0.50	- Feuertroll, Orangerot
Stenanthium, Federbusch, Liliaceae 🕽 🗆 📗	- Goldauelle, Grobe Knowll,
— robustum. Große, lanzettl. Belaub., kleine rahmweiße Blüten in großen, federart Risp. 120 cm VII-VIII 1.—	— Goliath. Hodwachs. u. reichblüh., dunkelorange . 0.60 — Götterfunke. Leuchtand . 0.60
0 /	Concluded and and the conclusion of the conclusi

Trollius hybr. (Fortsetzung)	Viscaria, Pechnelke, Caryophyllaceae ○ □ 🗴 1 St.
— Helios. Kugelförmig, reingelb 0.70	- viscosa alba grdfl. Blüt. in reinweiß. großen Rispen.
— — Lichtball. Festgeschlossene Kugeln, orangegelb . 0.60	40 cm V-VI 0.40 — fl. pl. Rot gefüllt, hervorragende Leuchtkraft.
— Majesty. Große, orangegelbe Blumen 0.60 — Orange Kugel. Blüte schr reich, glüh. orangegelb 0.60	40 cm V-VI 0.40
— Orangekönig. Leuchtend orangegelb, sehr großbl. 0.70	— — lilacina. Siehe Neuheiten 0.80
— Orange Prinzeß. Schön geformte orangef. Blum. 0.70	Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ □ ⊥ — agavaefolia. Siche Neuheiten
— — Salamander. Kupfrigorange 0.70 — Schwefelglanz. Hellgelb, großblumig 0.60	- angustifolia. Besonders schmale, steif-spitzblättrige
- japonicus fl. pl. Leuchtend orangegelb, leicht gefüllt 0.70	Belaubung und cremeweiße Blütenglocken.
- Ledebouri. Leuchtend orangefarbig mit langen ver-	60 cm VIII-IX 3.— — filamentosa. Bekannte immergrüne Staude mit breit-
breiterten Honigblättern. Eigenartige spätblühende Art. 50 cm	lanzettlicher Belaubung und große Blütenständen
— Golden Queen. Dunkelorangegelber Sommer-	cremeweißer Glocken. 80 cm VIII-IX 1.—
trollius. 60 cm VI-VII 1.— — patulus Bees var. Große, flache, reingoldgelbe Blumen.	— elegantissima. Achnlich der vorigen mit elegant schmaler Belaubung. 80 cm VIII-IX 2.—
40 cm V-VI 0.70	— — latifolia. Durch die großen, breiten, dunkelgrünen
— pumilus Moerheimii. Schr großblumig, goldgelb mit	Blätter unterscheidet sie sich wesentlich von der Stammart, 100 cm VIII-IX 2.—
mehreren Petalen. 50 cm VI-VII 0.70 — yunnanensis. Wachsartige, goldgelbe flache Blu-	— hybr. filamentosissima. Eine auffallend starke
men. 40 cm V-VI 0.70	Faserbild, an schmalblättriger Belaubung macht
Tropaeolum, Ausdauernde Kapuzinerkresse,	die Sorte besonders interessant und schön. Der Wuchs ist aufrecht und die Blätter blaugrün 2.—
Tropaeolaceae	Zauschneria. Siehe niedere Stauden.
Blättern u zinnoberroten Blüt. 100 cm VIII-IX 0.80	
Tussilago, Huflattich, Compositae ○ ≅-0	Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter
farfara fol. var. Dekorativ. Weißbuntbl. 30 cm 0.70	Alant (Inula helenium). Die Wurzel wird zu Likör und als Heilmittel verwendet 0.40
Valeriana, Baldrian, Valerianaceae ○≅-→ — alliariaefolia. Kräftigwachs. Art m. herzförm. Blättern	Baldrian (Valeriana officinalis). Die Wurzel wird zu
u. großen, weißen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.50	Heilmittel verwendet 0.40
Siehe auch niedere Stauden.	Beifuß (Artemisia vulgaris). Als Gewürz bei Braten und
Veratrum, Germer, Liliaceae ○ □ □ ⊥	Soßen zu verwenden 0.40 Bohnenkraut (Satureia montana). Für Suppenwürze
— album. Prächtige Blattpflanze mit weißen Blüten- rispen. 100 cm VII-VIII 1.—	sowie als Gewürzkraut zu Bohnen und Gurken . 0.40
— californicum. Kandelaberartige Blattstaude m. groß.,	Erdbeer-Tomate (Physalis Franchetii). Bildet im Herbst
weißen Blütenrispen. Selten. 180 cm. VII-VIII 3.—	knallrote Früchte, die roh oder in Zucker eingemacht, in Peru sehr beliebt sind 0.40
— nigrum. Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Einzelpflanze. 120 cm VII-VIII 1.50	Estragon (Artemisia dracunculus). Als Gewürzkraut
Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae ○-∞□⊥	beim Einlegen von Gurken zu verwenden 0.50
Herrliche ornamentale Blatt- und Blütenstaude, die	Lavendel (Lavandula vera). Die Blüten liefern auch ein
in jedem Boden gedeiht VII-IX — densiflorùm (thapsiformae). Blütenstände dichtbesetzt	gutes Schutzmittel gegen Motten
mit mittelgroßen, hellorangegelben Blüten. 100 cm 0.40	für Braten und Suppen 0.40
- hybr. C. R. Adams. Siehe Neuheiten 1.	Majoran (Origanum offinarum comp.). Feines Gewürz
— Mars. Isabellafarbig mit rot. 80 cm 0.60 — phoeniceum. Blüten variieren von weiß durch hellrosa	für Wurstbereitung, sowie für Braten und Suppen 0.50 Pfefferminze (Mentha piperita). Vorzüglich zur Tee-
und hellila bis purpurviolett. 40 cm 0.40	bereitung
 pyramidalum. Rot mit gelb, imposant. 80 cm vernale (nigrum). Mit verzweigtem Blütenstand und 	Pimpinell (Sanguisorba minor). Sehr fein für Salate . 0.30
hellgoldgelben Blumen. 150 cm 0.40	Rhabarber (Rheum). Siche Obst.
— Cotswold Beauty. Biskuitfarb., purpurschatt. 100cm 0.60	Rosmarin (Rosmarinus officinalis). Die Blätter werden als Heilmittel verwendet 0.70
— — Gem. Gelblichlachsfarb., purpur schatt. 100 cm 0.50 — — Queen. Dunkellachsfarbig. 100 cm 0.60	Salbei (Salvia officinalis). Die Blüten finden als Gewürz
Vernonia, Eisenkraut, Compositae ○ ⊥ X	Verwendung, die Blätter als Heilmittel (Salbeitee) 0.50
— crinita (arkansana). In Tracht wie folgende, jedoch	Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Vorzüglich für
purpurrote Blütenköpfe. 180 cm VII-IX 0.70	Suppen und Speisen
— noveboracensis. Aufrechtwachsende amerikanische Staude mit wechselständigen, lanzettlichen Blättern	matische Speisenwürze
und dichtdoldigen, purpurvioletten Blütenköpfen.	Tripmadam (Sedum reflexum). Vorzügliches Braten-
180 cm VII-IX 0.70	und Soßengewürz 0,30 Waldmeister (Asperula odorata). Vorzüglich zur
Veronica, Ehrenpreis, Scrophulariaceae O O A	Bowlenbereitung
Unverwüstliche Dauergewächse von großer Wider- standskraft gegen Dürre.	Weinraute (Rufa graveolens). Uraltes Heilmittel, auch
— Hendersonii (longifolia subsessilis). Prachtvolle	für Kräutersoßen verwendbar 0.50
Staude mit großen dunkelblauen Blütenrispen.	Wermut (Artemisia absinthium). Für Herstellung von Likören und Essenzen. Bewährtes Hausmittel 0.50
50 cm VII-IX 0.60 — hybr. Blaukerze. Siehe Neuheiten	Ysop (Hyssopus officinalis). Blätter finden zur Tee-
— longitolia. Lilablaue Blütenrispen. 70 cm VII-VIII 0.50	bereitung bei Erkrankungen der Atmungsorgane
— spicata. Reichblühende dankbare dunkelblaue Art. 40 cm VI-VIII 0.40	und des Magens Verwendung 0.40
Neuseeländer, Siehe niedere Stauden.	Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Zur Teebereitung sehr beliebt. Gute Heilpflanze

Winterharte Bambusen und Ziergräser	Carex (Fortsetzung) 1 St.
bringen im Garten angenehme Abwechslung hervor, wenn sie,	- riparia tol. var. Weißbuntblätterige Form unseres
ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden.	heimischen Riedgrases. 50 cm 0.60 — umbrosa. Frischgrüne Belaub. Bildet breite Teppiche. 0.60
Zeichenerklärung:	Chrysopogon nutans. Siehe Neuheiten 0.80
$\bigcirc = \text{Sonne}, \bigcirc = \text{Halbschatten}, : : = \text{Einfassung}, \triangle = \text{Felsen},$	Cortaderia, Pampasgras, Gramineae ○ ⊥ ∧
\cong = Feucht, #= Immergrün, \perp = Solitär, \wedge = Winterschutz.	— Selloana. Sehr dekorativ, mit leuchtend weißen, feder- artigen Blütenbüscheln im Sommer. 150 cm 2.—
Agrostis, Windhalm, Gramineae O-D \(\triangle \)	Cyperus, Zypergras, Cyperaceae $\bigcirc\cong -\bigcirc$
— alpina. Feines, zartes Schleiergras. 25 cm 0.50 Aira, Waldschmiele, Gramineae O—	— carexoides. Mit carexähnlicher Belaubung u. braunen
— caespitosa. Dunkelgrüne, graziöse Belaubung, Blüten- ähren gelblich. 40 cm 0.40	Blütenbüscheln. 40 cm
Alopecurus, Goldfuchsschwanzgras, Gramineae ○ ≅ — pratensis aureus. Zierliche, goldbuntblättrige Belau-	— speciosus. Hellgrüne Belaubung, gelblichgrüne Blütendolden. 60 cm
bung und bräunliche Blüten. 40 cm 0.50	— glaucus. Mit schönen blauweißen, breiten Blättern.
Andropogon, Indianer-Bartgras, Gramineae O — furcatus. Rötlichgrüne Belaubung und lockere, langgestielte Blütenähren. 100 cm 0.70	— giganteus. Bläulichgrüne, robuste Belaubung und
Arrhenatherum, Blatthafer, Gramineae ○ ≅	fingerlange Blütenähren. 80 cm 0.50 Erianthus, Ravennagras, Gramineae O \(\perp\)
bulbosum fol. var. Schmale Blätter, hübsch weißbunt.	— strictus. Ornamentale, steifaufrechte Belaubung und weiße, federige Blütenrispen. 150 cm 1.—
Arundinaria, Bambusrohr, Gramineae ○ ≅ - → # ⊥ Fortunei fol. var. Weißbuntblättr. Zwergbambus. 50 cm 1.—	Eriophorum, Wollgras, Cyperaceae $\bigcirc \cong \triangle$
metake (japonica). Starkwachsende Art, sehr deko-	— alpinum. Seidenartig feine, silberweiße Samenperücken.
rative Belaubung. 180 cm	20 cm
— nitida. Zierlichste und schönste aller Bambusarten, den	Blutenkopie, 20 cm 0.60
höchsten Kältegraden widerstehend, bildet präch- tige, große Büsche von überhängendem, eleganten	Eulalia. Siche Miscanthus.
Wuchs. 200 cm	Festuca, Schwingel, Gramineae O A: #: # — alpina. Grüne, feste Polster bildend. 20 cm 0.50
 palmata. Auffallend breite, dunkelgrüne Blätter. 150 cm 2.50 pumila. Grünblättrige Zwergsorte, gibt schönen Rasen. 	glacialis, Herrliches blaugraues Teppichoras, 10 cm 040
30 cm	— glauca. Blaugrüne Grasart, besond. f. Einfass. 20 cm 0.40 — ovina amethystina. Bildet prächtige Grasschöpfe mit
— ruscifolia. Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus.	silberliarosa schimmernden Tonungen, 30 cm., 060
Arundinella anomala. Japanisches Schilfgras ○ ⊥	— glauca pallens. Lilablauschimmernde Belaub. 20 cm 0.60 — sempervirens. Smaragdgrüne Form vorgenannter
Tracht ähnlich Miscanthus, jedoch noch straffer auf-	Art. 50 cm
recht wachsend, auch ist die Belaub. spitzblätterig und dunkelgrüner. Der ganze Busch färbt sich im	— punctaria. Igelborstenartige Blätter von blaugrüner Färbung. 10 cm
zeitigen Herbst goldgelb. 150 cm 0.60	scoparia (crinum ursi). Dichte, hellgrüne Polster mit fadenartigen, harten Blättern. 10 cm 0.40
Arundo, Klarinettenrohr, Gramineae O L donax. Sehr dekoratives Riesenschilf, liebt feuchten	Glyceria, Schwadengras, Gramineae ○ ≅
Boden. 200 cm	— aquatica fol. var. (spectabilis). Rosa, weiß und griin
— fol. var. Buntblättrig, weiß u. grün gestreift. 150 cm 2.—	gestreitte grazios überhängende Blätter. 100 cm. 0.40
— phragmitis. Einheimisches Schilfrohr. 200 cm 0.40 — fol. aurea. var. Mit gelbbunter Belaubung 0.80	Gynerium argentum. Siche Cortaderia Selloana. Imperata saccharifera. Siehe Miscanthus.
Avena, Blaustrahlhafer, Gramineae ○ △ #	Luzula, Hainsimse, Juncaceae ○≅-① △ #
- sempervirens. Herrlich blaugraue, steif aufrecht-	- nivea. Weißbehaarte Blatt- und Blittenhijschel 040
stehende Blätter. Sehr dekorativ. 40 cm 0.50 Bambusa. Siehe Arundinaria.	— silvalica (lildxima). Mit etwas weiß gestreift, Blättern
Bouteloua oligostachya. Moskitogras O Nordameri-	und breiter Belaubung. 40 cm 0.40 Melica, Amerikanisches Perlgras, Gramineae O
kanische Präriepflanze von eigenartiger Struktur.	— altissima. Lange, saftiggrüne Belaubung und eilben
Aeußerst schmalblättrig. Die braunen, 5 cm langen Aehren stehen wagrecht an den beblättert. Stengeln	grade Diutenrispen. 100 cm 0.50
und erscheinen in großer Anzahl. 40 cm 0.80	Miscanthus, Stielblütengras, Gramineae O L
Carex, Segge, Cyperaceae ○ ≅ - 1 △ #	- condensatus. Schr dekorativ und schön belaubt, unterscheidet sich von den übrigen Miseanthus-
— acuła fol. var. Immergrüne, breite, gelbgestreifte Be- laubung, schwarzbraune Blütenähren. 30 cm 0.50	Arten durch den niederen Wuchs. Selten, 80 cm 150
— Buchananii. Siehe Neuheiten	saccharifer (Imperata). Üppig wachsendes Ziergras mit hübschen weißen Wedeln. 200 cm 0.60
— viridis. Siehe Neuheiten	= sinelisis giganieus. Hohes, dekoratives Ziergrae mit
ähren. 40 cm	- fol. var. Mit breiten weißen Längsstreifen 150 am 0 80
 pendula. Saftiggrüne, hängende Belaubung. 50 cm . 0.50 plantaginea. Mit breit., interessantem Blattwerk. 30 cm 0.50 	— gracillimus. Elegante, lineale dunkelgrüne Blätter von einem weißen Mittelnerv durchzogen. 120 em . 0.60
	5 5

Miscanthus sinensis (Fortsetzung) 1 St. RM	Acorus gramineus (Fortsetzung) 1 St. RM
— — zebrinus. Mit gelbgestreiften hängenden Blättern. 150 cm	— fol. var. Zwergkalmus mit schöner weißbunter Belaubung. 30 cm
strictus. Aufrechtstehende Blätter mit gelben	Alisma, Froschlöffel, Alismataceae U
Querstreifen. 100 cm 0.80 Molinia, Bentgras, Gramineae O	— plantago. Breite, langgestielte Blätter. Griffel langgestreckt. Blüten weiß. 70 cm VII-IX 0.40
— coerulea fol. var. Weißbuntes, elegantes, buschiges Gras. 50 cm	— lancifolium. Schmallanzettliche Belaubung, rosaweiße Blüten. 70 cm VII-IX 0.60
Panicum, Hirse, Gramineae $\bigcirc \perp \cong$	Anemopsis, Sumpfanemone, Ranunculaceae U
 altissimum. Zierliche Belaubung. 150 cm virgatum. Schmale bräunlichschimmernde Belaubung und braune Blütenrispen. 100 cm 0.60 	— californica. Dunkelgrüne, rotgeaderte, ovalherzförm. Belaubung u. gelblichweiße elethraähnliche Blüten- rispen. Einzelblüte an Anemone erinnernd. 50 cm. 0.80
Pennisetum, Lampenputzergras, Gramineae ○ ⊥ — compressum. Siehe Neuheiten	Aponogeton, Wasserähre, Aponogetonaceae U — distachyus. Schwimmpflanze mit duftenden weißen Blütenähren VIII-X 1.50
— japonicum. Sehr dekoratives Ziergras mit schmaler elegant überhängender Belaubg. Rotbraune walzen- förmige Blütenähren mit weißen Spitzen, was die Schönheit dieses Grases noch steigert. 80 cm 1.50	Butomus, Blumenbinse, Butomaceae U — umbellatus. Blätter schmal schilfartig, schöne rosen- rote Blüten in Dolden. 60 cm VI-VIII 0.50
Phalaris, Bandgras, Gramineae ○ ≅ — arundinacea picta. Mit schön weißbunten Blättern.	Calla, Sumpfkalla, Araceae — palustris. Weißblühende Sumpfealla. 20 cm VI-VII 0.70
Nicht wuchernd. 60 cm 0.40	Caltha. Siehe niedere Stauden.
Sesleria, Blaugras, Gramineae ○ ≅ — coerulea. Zierlich blaugrüne Belaubung und rötlich-	Carex. Siehe Ziergräser.
braune Blütenrispen. 30 cm 0.60	Cyperus. Siehe Ziergräser.
Sporobolus, Fallsame, Gramineae O	Equisetum, Riesenschachtelhalm, Equisetaceae — giganteum. Frischgrüne runde Stengel mit stark her-
— aizoides. In Tracht wie Aira. Rauh behaarte Blätter und schöne große Blütenrispen, 90 cm 0.60 Stipa, Haargras, Gramineae ○ △	vortretenden, schwarzen Ringen. 120 cm. Selten . 2. palustre. Großer immergrüner, schwarz gegliederter Schachtelhalm. 70 cm
- calamagrostis. Mit prachtvollen federigen Blüten-	Eriophorum. Siehe Ziergräser.
ständen. 100 cm	Glyceria. Siehe Ziergräser.
Grannen. 80 cm	Hibiscus, Sumpfeibisch, Malvaceae U
— gigantea. Greisenhaargras. Schmale fast borstige Belaubung und lange, fahnenförmige, weiße Blütenähren. 100 cm	— palustris (moschatus). Eibischartige Blätter, Blüten einer einfachblühenden Malve ähnlich, rosablühend. 100 cm VII-VIII 1.50
— pennata. Mäddenhaargras. Sehr zierlich belaubt und lange, federartige Blütenähren. 30 cm 0.60	Hippuris, Tannenwedel, Hippuridaceae U — vulgaris. Zierliche tannennadelartige Belaubung, ver-
Themeda, Japanisches Bartgras, Gramineae ○ ⊥	zweigte aus dem Wasser herausrag. Stengel. 40 cm 0.40
— Forskalii japonica. Miscanthus-äkalide behaarte Belaubung, jedoch viel interessantere Blütenrispen.	Houttuynia cordata U Siehe Anemopsis.
100 cm. Selten	Hydrocharis, Froschbiß, Hydrocharitaceae U — morsus ranae. Schwimmpflanze mit herzförmigen
Uniola, Plattährengras, Gramineae O _	Blättern und weißen Blüten VII-VIII 0.50
— latifolia. Flache bis 2 cm breite und plattgedrückte, prächtige braune Blütenähren. 80 cm 0.80 Zizania, Hafer-Reis, Gramineae. ○ ≅	Iris laevigata, Kaempferii, orientalis i. S., pseudacorus, sibirica i. S., versicolor. Siehe unter mittelhohe Stauden.
— aquatica var. arundinacea. Breite, rohrkolbenartige Belaubung, welche sich im Herbst gelblichweiß färbt.	Juncus zebrinus U Siehe Scirpus Tabernaemontanii zebrinus.
Große, haferähnliche Rispen. 150 cm 1.50	Limnanthemum, Sumpfrose, Gentianaceae U
Wintorhauto Superfound Wassaustander	— nymphaeoides. Schwimmpflanze mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen VII-VIII 0.40
Winterharte Sumpf- und Wasserstauden	Lysichitum, Scheinkalla, Araceae
für Teiche und Wasserläufe U = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen,	— americanum. Mit an Musa erinnernd. Blättern. Große, callaähnliche gelbe Blumen. 50 cm . VII-VIII 3.— — camtschatcense. Wie vorige, jedoch weißblühend.
die übrigen gedeihen in sumpfiger Lage.	50 cm. Selten VII-VIII 4.
Acorus, Kalmus, Araceae VI-VII	Lysimachia. Siehe mittelhohe und niedere Stauden.
— calamus. Dunkelgrün schilfartige Blätter, Blütenstand einen Kolben bildend, wohlriechend. 80 cm 0.40	Marsilia, Kleefarn, Marsiliaceae — quadrifolia. Vierblättrige steinkleeartige Staude. 20 cm 0.80
— fol. var. Weißbunte Blätter, 80 cm 0.80	Menyanthes, Bitterklee, Gentianaceae
— gramineus (pusilla). Seltener Zwergkalamus aus Japan mit grasartiger, blaugrüner Belaubung. 10 cm 1.—	— trifoliata. Mit dreizähligen Blättern. Blüten feder- artigweiß. 20 cm VII-VIII 0.40

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden (Fortsetzung)	Winterharte Seerosen
Myosotis. Siehe niedere Stauden.	Die Kultur der herrlichen, winterharten Seerosen (Nymphaeen)
Nuphar, Mummel, Nymphaeaceae U	ist sehr einfach und in jedem Garten ausführbar. Sie verlangen
— luteum. Gelbe Teichrose VI-VIII 1.50	sonnige Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das ver-
— advena. Mit über das Wasser sich erhebenden Blättern	dunstete Wasser erneuert werden. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene,
und gelben Blüten, Selten VI-VIII 3.—	ausgebrannte Petroleum- oder Seisenfässer, die in den Boden
Ophiopogon, Schlangenbart, Liliaceae	eingelassen werden Pflanzerde soll kräftig sein; gute Lehm-
— japonicus. Immergrüne, grasartige Blätt., blaue Blüten- ähren, türkisblaue Beeren. 30 cm VI-VIII 0.80	erde mit einem guten Teil verrottetem Kuhdünger oder Horn-
	spänen vermischt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt,
Orontium, Goldähre, Araceae U	um das Wasser sauber zu halten. In Teichen genügt der vor- handene Schlamm, Pflanzstelle muß jedoch schilffrei sein. Die
— aquaticum. Maiblumenähnliche Blätter oben dunkel- grün, unten silberig und gelbe Blütenkolben an	Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai ab. Zur Einsenkung
schneeweißen Stielen. Selten. 30 cm . V-VII 3.—	in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder
Peltandra, Pfeilaron, Araceae U	in eine 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten dünnen Bind-
— virginica. Callaähnliche Blätter und Blumen. 60 cm.	faden oder Draht darüber und versenke sie.
Selten V-VI 3.—	Der Mindest-Wasserstand sei 50 cm für die schwachwachsenden
Pontederia, Hechtkraut, Pontederiaceae U	Sorten, wie Laydekeri-, odorata- und pygmaea-Sorten und mindestens 70 cm für die starkwachsenden N. alba, N. Mar-
— cordata. Herzeiförmige Belaubung und blaue Blüten-	liacea, tuberosa und Hybriden.
ähren. 80 cm VII-VIII 2.—	Winterschutz ist in Teichen unnötig. Beton-Behälter und Fässer
— robusta. Siehe Neuheiten	entleere man vom Wasser und fülle sie mit Torf oder Laub.
Ranunculus, Wasserhahnenfuß, Ranunculaceae U	Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl RM 20.—
- aquatilis. Schwimmende Art mit kreisförmigen.	Nuphar luteum und advena. Siehe unter Sumpf- und
3-5 teiligen Blättern. Anemonenartige, weiße	Wasserstauden. 1 St.
Bluten VI-VIII 0.60	Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae VI-IX RM
— lingua. Lanzettliche Belaubung, gelbe Blüten. 150 cm VI-VIII 0.60	— alba. Die gewöhnliche weiße Seerose 2.—
grandiflorum. Prächtige Sumpf- u. Wasserstaude	— caroliniana perfecta. Wohlriedend, ladısfarbig 6.— — rosea. Große rosafarbene Blumen, cremefarbene
mit fast fingerdicken, runden Stengeln, schmaler,	Staubgefäße, sehr wohlriechend 6.—
zungenformiger Belaubung und wildrosengroßen,	— nivea. Wohlriedend, großblumig, weiß 6.—
goldgelben Blumen. 150 cm V-VIII 1.—	— hybr. atropurpurea. Tiefglänzend, karmesinfarben,
Sagittaria, Pfeilkraut, Alismataceae U Gleich dekorat.	Staubfäden goldgelb
durch ihre Blätter und Blumen, alle weißblühend.	— Andreana. Schalenförmige, leuchtend rote Blüten 7.—
40-60 cm V1-V111 — latifolia. Mit breitem Blattwerk und großen Blüten . 0.40	- Colossea. Fleischfarbene, in weiß übergehende,
— lancifolia. Mit froschlöffelähnlicher Belaubung 0.50	sehr wohlriechende Blumen 5.—
sagimiolia (japonica). Schmale pfeilförmige Blätter 0.40	— Comanche. Große ockergelbe bis kupferfarbene
— II. pl. Siehe Neuheiten	Blumen. Staubgefäße orangefarben 8.— — Escarboucle. Große zinnoberrote Blume, Staub-
— graminea. Schmalblättrig und zierliche Blumen . 0.50 — leucopetala. Besonders schöne, reinweiß blühende	gefäße tiefzinnoberrot
und großblättrige Form	— Froebelli. Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit
Saururus, Molchschwanz, Saururaceae U	zinnoberroten Staubfäden 6
— cernuus. Stengelumfassende Blätter und weiße wohl-	— Galathée. Schöne, rote, weiß bemalte Blumen. Staubgefäße orangegelb 8.—
riechende Achrenblüten. 50 cm. Selten VII-VIII 0.80	— — James Brydon, Schr gr., scharlachkarminr. Blum. 7.—
Loureirii. Chinesische, seltene Sumpfstaude mit wechsel-	— Indiana. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach
ständigen, 5 cm großen herzförmigen Blättern und	in ein sehr lebhattes kupferrot über 8.
großen, weißen Blütentrauben. Wächst sowohl im Wasser als auch in sumpfig. Lage, 40 cm VII-VIII 0.80	— — Massianello. Große, wohlriechende Blumen, rosa, karmin getupft
Scirpus, Binse, Cyperaceae ப	— - Meteor. Sehr große, granatrote Blumen 7—
— lacustris. Riesenbinse, mit dunkelgr. Blattwerk. 200 cm 0.50	— Robinsonii. Rotviolette, in ockerg, übergeh Blum 8—
— spiralis. Spiralförmig wachsende Binse. 40 cm. Selten 2.—	— Seignourem. Karminrosa abgestuft auf gelbem
- Tabernaemontanii zebrinus (Juncus). Weiß quer-	Grund. Staubgefäße gelb. Sehr reichblühend 7.— - Laydekeri alba. Großblumig, weiß 4.—
gestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde	- purpurata. Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot.
Binse. 80 cm 0.70	Senr schon und reichblühend
Stratiotes, Wasseraloe, Hydrocharitaceae U — aloides. An Aloe erinnernde Schwimmpflanze mit	1 - Osed. Mit rosaroten Bliffen
stark gezähntem Blattwerk. 20 cm 0.60	— lucida. Großblumig, dunkelkarminrosa 7.— — Marliacea albida. Weiße, sehr große Blum., reichblüh. 3.—
	— carnea. Fleischfarbige große Blumen 4.—
Typha, Rohrkolben, Typhaceae U — angustifolia. Schmalblätt. Rohrkolb. 200 cm VIII-IX 0.50	- Giroffidiella. Schonste gelbe Art mit braungefleckten
— latifolia. Breitblättriger Rohrkolben. 250 cm 0.40	Diattern. Dluten u. Blaffer sehr schön kontroation u. 15
— Laxmannii. Sehr zierliche, schmalblättrige Art mit	- OSed. Hellrosa, grobblumio
fingerlangen, dünnen Rohrkolben. 120 cm. Selten . 1.—	— odorata superba. Schneeweiß, wohlriechend 4.— — minor. Kleinblumig, weiß
minima. Der kleinste und zierlichste aller Rohrkolben,	Tuberosa rosea, Wohlriechend, rosarof
mit dunkelgrüner, grasartiger Belaubung und nur bis 3 cm langen Rohrkölbchen. 40 cm. Selten 1.—	— Gladsioniana. Sehr groß, weiß
— Shuttleworthii. Breitblättrige Art mit dicken rundlichen	1 Comingberg, Riesenbluten, schneeweiß, größte
Rohrkolben. 150 cm. Selten	aller winterharten Seerosen 8 —
Villarsia U Siehe Limnanthemum.	— Richardsonii. Ballförmig gefüllt, schneeweiß 4.— — Rosennymphe. Herrlich rosablühende Riesenblüt. 8.—
	titescholul, O.

Winterharte Garten-Blumenzwiebeln 1 St.	Lilium (Fortsetzung) 1 St. RM.
Allium. Siehe niedere Stauden.	— pardalinum. Pantherlilie. Orangerot, gelb gefleckt. 150 cm
Anemone. apennina. Siehe niedere Stauden.	— philippinense formosanum. Pelikanlilie. Großblumig,
Colchicum, Herbstzeitlose, Liliaceae $\bigcirc \cong \triangle$ 20–40 cm IX-X	trompetenförmig, weiß mit gelbem Schlund, außen mit rötlichen Mittelstreifen gezeichnet. 80 cm 1.20
— autumnale. Rosarote Blüten. 20 cm 0.30	— regale. Königslilie. Gehört zu den schönsten u. dank-
— — fl. pl. Rosagefüllte Blumen. 20 cm	barsten aller Lilien Saftiggrüne, weidenart. Blätter. Blume sehr groß reinweiß, das im Schlunde in ein
— album. Reinweiße Blüten. 20 cm 0.60	zartes kanariengelb übergeht. 80 cm 0.75
— giganteum. Schr großblumig, rosarot. 30 cm. Selten 0.80	— speciosum Krätzeri (lancifolium). Edle weiße Blumen
Cyclamen. Siehe niedere Stauden. Eranthis. Siehe niedere Stauden.	auf kräftigen Stielen. 100 cm 1.— — roseum. Großblumig rosa. 100 cm
Eremurus. Siehe mittelhohe Stauden.	— — rubrum. Dunkelrot gefleckte, sehr schöne Blüten.
Erythronium, Hundszahn, Liliaceae ○ △	100 cm
— dens canis. Rotblühend. 20 cm IV-V 0.30	— superbum. Blumen langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt. 80 cm
Fritillaria, Kaiserkrone, Liliaceae ○ □ — imperialis. Orangefarbige Blüten hängen kronenartig	— tenuifolium. Korallenlilie. Blüten scharlach. 80 cm . 1.20
an dem dicken, 50 cm hohen Stengel . IV-V 1.20	— tigrinum. Tigerlilie. Rote gefleckte Lilie, die stark
— meleagris. Kiebitzeier. Feine Tönungen um purpur,	wächst und dankbar blüht. 100 cm 0.60
punktiert, 30 cm. Prachtmischung IV-V 0.20	— — fl. pl. Rote gefüllte Form. 100 cm 0.60 — — splendens. Besonders leuchtend rote Art. 100 cm 0.60
Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae ○-①:::△	— Willmoffiae. Orangerot, braun punktiert. 80 cm 2.—
— nivalis. Das altbekannte und beliebte Schneeglöckchen.	Muscari, Traubenhyazinthe, Liliaceae ○△ 1V-V
15 cm	— botryoides, Dunkelblaue Blütentrauben, 15 cm 0.10
— candicans. Weiße Glocken an langen Rispen.	Narcissus, Narzisse, Amaryllidaceae ○ □ :: — Golden Spur. Reingoldgelbe, einfache Trompeten-
100 cm VIII-IX 0.35	narzisse, frühblühend. 40 cm IV-V 0.20
Leucoium, Märzbecher, Amaryllidaceae ○ - ① : : △ — vernum. Aehnlich dem bekannten Schneeglöckchen.	— poeticus ornatus. Dichternarzisse. Einfache, schnee- weiße Blumen mit roter Krone. 40 cm 1V-V 0.20
Blütenglocken jedoch größer u. mit grünen Tupfen	— Van Sion fl. pl. Gefülltbl., goldgelb. 40 cm 1V-V 0.30
an den Spitzen. 20 cm	
Illium Lilia Liliacoao O O Sie lieban eëmtlieb einen	
Lilium, Lilie, Liliaceae ○—① □ Sie lieben sämtlich einen Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man	Blumenzwiebeln und Knollen
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder	Blumenzwiebeln und Knollen die im Keller überwintert werden müssen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ ¼ Knollen werden von März bis Mai in
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ ¼ Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O = & Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm VIII-IX
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80–100 cm. VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80–100 cm. VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80–100 cm. VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gesteckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischsarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80−100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert:
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm 1.— — croceum. Feuerlilie. Starkwachsend m. safranorangefarbenen Blumen. 80 cm 1.— — davuricum (umbellatum). Eine der schönsten und dankbarsten Sorten, großblumig, leuchtend orangerot. 80 cm 1.— — incomparabile. Blutrot auf orangefarb. Grunde. 100 cm 1.50 — elegansbicolor(Thunbergianum). Orangerot gefleckt. 80 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 em tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80−100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- u. dunkelblau, orange 0.25 — Prachtmischung aller Farben 0.20 Montbretien ○ □ × Kultur wie Gladiolen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan. Goldbandlilie m. riesig. Blüten. 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	Gladiolus ○ □ X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 em tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80 – 100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- u. dunkelblau, orange 0.25 — Prachtmischung aller Farben
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m. riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus ○□ X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 em tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80−100 cm . VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb 0.25 — Aida. Sehr schöne, große dunkelblaue Blumen 0.25 — Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25 — Alt-Wien. Hellblau, nach der Mitte lavendelblau . 0.30 — Apfelblüte. Zartapfelblütenfarbig, großblumig 0.40 — Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefleckt 0.30 — Flammendes Schwert. Scharlachrot 0.20 — Gelbe Maske. Reinkanariengelb, frühblühend 0.25 — Krimhilde. Weit geöffnete Einzelblumen, zartrosa . 0.25 — L. H. v. Kattendijke. Fleischfarbig mit roten Flecken . 0.30 — L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70 — Marokko. Die dunkelste der dunkelroten 0.50 — Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20 — Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25 — Stuttgardia. Großblumig, glühendrot 0.30 — Walter Bloem. Eine leucht. salmfarbige Primulinussorte 0.30 — Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farb. sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- u. dunkelblau, orange 0.25 — Prachtmischung aller Farben 0.20 Montbretien ○ □ × Kultur wie Gladiolen.
Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze u. Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit VII-X — auratum. Japan.Goldbandlilie m.riesig. Blüten, 150 cm 2.— — Batemanniae. Aprikosenorange. 100 cm 1.— — candidum. Kirchenlilie. Allbekannte schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60 — concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunklen Flecken. 50 cm	die im Keller überwintert werden müssen. Gladiolus O X Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreich. Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm. VIII-IX — Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb

Einfachblühende und Mignondahlien 🔾 🗆 🕸 🗴	Athyrium filix femina (Fortsetzung) 1 St.
Wir haben diese einfachblühenden Dahlien neu aufgenommen, da sie in vielfacher Hinsicht äußerst wertvoll sind. Sie sind niedrig, daher windfest, ungeheuer reich- und langblühend. Mit sommer- und herbstblühenden Stauden zusammengepflanzt, lassen sich herrliche Farbwirkungen erzielen VII-X 1 St.	 — Fieldiae. Aehnlich Victoriae, schmale, lange Wedel, ziemlich hoch wachsend. 50 cm
Betsy. Leuchtend rot. 50 cm 0.60 Bishop of Llandaff. Blätter braunrot, Blumen scharlach, lockere Füllung. 60 cm 0.70	blättchen. 40 cm
Coltness Gem. Leuchtend scharlachrot. 50 cm 0.60 Dunecht Yellow. Gelbblühend. 50 cm 0.60 Helvetia (Danebrog). Weiß, feurigrot bandiert. 100 cm 0.60 Lady Aileen. Kräftigrosa, dunklere Mitte. 50 cm 0.60 L'Innocence. Reinweiß. 40 cm 0.60	an den Endspitzen. 50 cm
Lucifer. Braunrotes Laub, blutrote Blüten. 60 cm 0.70 Maasland. Dunkelrot. 50 cm 0.60 Meteor. Leuchtend zinnoberrot. 50 cm 0.70 Mrs. K. Webb. Blätt. braunrot, Blum. lachsorange. 100 cm 0.70	 — setigerum. Sehr schmale, hellgrüne Wed. 30 cm 0.50 — simpannosum. Wedel sehr zierlich. 40 cm . 0.70 — Standishii. Zierl. gekrauste nied. Form. 50 cm 0.60 — Victoriae. Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen. 40 cm 0.70
Orangeflagge. Leuchtend orange. 60 cm 0.80 Philine. Niedrigste Sorte, leuchtend dunkelrot. 40 cm . 0.60 Prinzefs Marie José. Leuchtend dunkelrosa. 60 cm 0.70 Prinz Hendrik. Leuchtend rosa. 50 cm 0.70	Blechnum, Rippenfarn, Polypodiaceae ● # ≅ △ — penna marina (alpinum). Rasenbildende Art mit leder- artiger, dunkelgrüner Belaubung. 10 cm 0.60
Winterharte Freilandfarne Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung	 spicanf. Glänzende, lederartige Belaubung und lange schwarzbraune Sporenträger. 40 cm
der absonnigen Teile von Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne. Es empfiehlt sich, dem Boden eine Beis mischung von Torf oder Lauberde zu geben. Wir empfehlen ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten	Ceterach, Schriftfarn, Polypodiaceae $\triangle \#$ — officinarum. Mauerfarn mit silberweißer, rundlicher Belaubung, unten braun besport. 10 cm 0.70
unserer Wahl zu RM 45.—, 25 Stück zum Hundertpreis. Zeichenerklärung: ○ = Sonne, gedeiht natürlich auch im Halbschatten. ≅ = verlangen feuchte Lage. ■ = Schatten, gedeiht auch im Halb-	Cryptogramma, Rollfarn, Polypodiaceae ♠ △ ≅ — crispum (Allosorus). Feinfiederiger, hellgrüner Zwerg- farn. 10 cm
schatten. △ = für Steingärten. # = Immergrün. ¾ = Schnitt. Adiantum, Frauenhaar, Polypodiaceae ● ¾ 1 St. — pedatum. Zierliche Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend Adiantum euneatum. 40 cm 1.—	 Cystopteris, Blasenfarn, Polypodiaceae — asplenioides. Starkwüchsige, feinblättr. Form. 40 cm 0.60 — bulbifera. Schmale Brutknöllchen tragende Wedel, die im Frühjahr herrlich rot austreiben. 40 cm 0.50 — fragilis △ Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen
Allosorus. Siehe Cryptogramma. Aspidium aculeatum, A. angulare, dilatatum. Siehe	Wedeln. 30 cm
Polystichum. — filix mas. Siehe Dryopteris. Asplenium, Milzfarn, Polypodiaceae	Dennstaedtia (Dicksonia) Schüsselfarn, Polypodiaceae — punctilobula. Kriechende Rhizome mit langen zier- lichen, feinzerteilten Wedeln. 30 cm 0.60
 adiantum nigrum ○ # △ Wedelstiele glänz.schwarzbraun, Fiederblätter glänzend dunkelgrün. 30 cm. 0,70 angustifolium ● Seltene, halb-immergrüne Art, mit fasanenfederartigen Wedeln. 60 cm 0.70 	Dryopteris (Aspidium) Wurmfarn, Polypodiaceae — decursive pinnata. Eigenartige schmale, grob gefiederte lange Wedel. 30 cm. Selten
 — germanicum ♠ △ Hübscher Zwergfarn mit am Ende doppelt gefiederten Wedeln. 10 cm 0.70 — rufa muraria ○ △ # Zierlicher Mauerfarn mit kleinen Fiederblättchen. 5 cm	 dilatata # Lange, breite, dunkelgrüne Wedel 0.50 — gracile # Besonders zierliche Form der vorigen . 0.80 — erythrosora # Lederartige Blätter, die beim Austrieb prächtigrot erscheinen. 40 cm. Selten — filix mas. Heinische Art, mit langen Wedeln. 60 cm 0.40
— septemtrionale ○ # △ Wedel derb sattgrün, unregel- mäßig gabelförmig. 15 cm	— — Barnesii. Elegante, schmale Wedel. 50 cm 0.60 — — cristata. Lange, am Ende gekrauste Wedel. 60 cm 0.60 — — angustata. Schmale, kammartig gekrauste Wedel. 40 cm
 — viride ● △ Mit zierlicher, saftiggrüner Belaub. 15 cm 0.60 Athyrium, Streifenfarn, Polypodiaceae ● — filix femina. Hellgrüne, im Herbst absterbende Wedel. Heimische Art. 50 cm	— — Ellwormi. Lichte, schmale Wedel. 40 cm 0.60 — — erosa crenata. Scharf gekerbte Wedel. 40 cm 0.70 — — fluctuosa. Gedrungen wachsende Form mit
— — corymbiferum. Stark gefiederte Wedel. 40 cm 0.60 — — Craigii. Zierlich gefiederte, feine Wedel. 50 cm 0.60 — — cristatum. Wedel hellgrün, eigenartig gekraust 0.60	etwas gewellten Blättern. 40 cm 0.60 — — furcans. Sehr graziöse, gabelige Wedel. 40 cm 0.60 — — gracile. Aeußerst zierlich, geteilte Wedel mit feinzerschlitzten Fiederblättchen. 40 cm 0.60 — — lineare Mit mühren. 40 cm 0.60
 — — — nanum △ Herrl, gekr. Zwergform. 30 cm 0.60 — — disectum gracile. Zierliche, fein zerschlitzte Wedel, 30 cm	— — lineare. Mit gröberen zerschlitzten, linear- lanzettlichen Fiederblättchen. 40 cm 0.60 — — polydactyla. Mit stark geschlitzter Belau- bung. 60 cm
— — erosum minus △ Zwergfarn mit zierlichen kleinen Wedeln. 20 cm	— — monstrosa. Wedel mit am Ende hübsch hahnen- kammartig gekrausten Fiederblättern. 60 cm 0.60

Dryopteris filix mas (Fortsetzung) 1 St.	Polystichum angulare proliferum (Fortsetzung) 1St.
— — palleacea. Glänzenddunkelgrüne Wedel, ungesägte Fiederblättchen. 40 cm	 — nephrolepifolium. Siehe Neuheiten 3.— — scalptum densum. Prachtvolle Wedel, deren einzelne Fiederblättchen gespalten sind. 40 cm 0.80 — Wollaston. Breite, starkgefiederte Wedel. 60 cm 0.80 — lobatum. Glänzend lederartige Wedel 0.60
- — polydactyla. Dunkelgrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende büschelartig zusammenstehen. 60 cm	Pteridium, Adlerfarn, Polypodiaceae — aquilinum (Pteris aquilina). Hohes, heimisches Farn- kraut mit dreifachgefied., ausgebreit. Wed. 100 cm 0.50
Wedeln. 30 cm	Scolopendrium U Siehe Phyllitis. Selaginella. Siehe unter niedere Stauden. Struthiopteris U Siehe Matteucia.
derten, bleichgrünen Wedel. 40 cm 0.70 — phegopteris. Breit dreickig, zarthellgrüne Wedel.	Winterharte Heidekräuter
30 cm	Obwohl diese in fast jedem lockeren, humosen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heides, Laubs oder Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeckung mit Tannenreis im Winter ist zu empfehlen.
thelypteris. Wedel lebhaftgrün, langgestielt, weich.	Wir liefern ein feines Sortiment von 100 St. in 20 Sorten unserer
Lomaria alpina. Siehe Blechnum. Matteucia, Becherfarn, Polypodiaceae ○ ≅	Wahl mit Namen zu RM 50.— Ab 25 Stück Hundertpreis. Bruckenthalia, Ährenheide, Ericaceae ○ - ① △ # 1 St.
— struthiopteris (Struthiopteris germanica). Die jungen, zarthellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichter-	— spiculifolia. Feinnadelige saftiggrüne Belaub., dichte hellrosafarbige Blütenährchen. 30 cm VI-IX 0.80
förmigen Becher aus. 80 cm 0.60 — pennsylvanica. Stärkerwachsende Art, mit blaugrünen Wedeln. 100 cm 0.70	Calluna, Herbstheidekraut, Ericaceae ○ - ① △ # 10-30 cm VIII-IX - vulgaris. Unser gewöhnliches, allbekanntes und be-
Onoclea, Perlfarn, Polypodiaceae ○ ≅ — sensibilis. Kriechende Rhizome mit eigenartiger, graugrüner Belaubung. 40 cm 0.60	liebtes Heidekraut mit lila Blütenrispen 0.50 — alba. Mit weißen Blüten 0.60 — plena. Siehe Neuheiten
— interupta. Wie vorige jedoch mit zinnoberrot austreibenden Wedeln	— — erecta. Aufrechte, kräftigwachsende Sorte mit weißen Blüten 0.60
Osmunda, Königsfarn, Osmundaceae () ≅ — cinnamomea. Zierliche Art mit gelblichgrünen, später zimtbraunen Sporenträgern. 50 cm 1.50	— — Alportii. Schlanke graugrüne Triebe, dunkelrote Blütenrispen
— Claytoniana. Achnl. der vorigen, mit gröberen Frucht- wedeln. 60 cm	— — aurea. Goldgelbe Belaubung, lila Blütchen 0.60 — — Camla Variety. Siehe Neuheiten 1.— — — compacta. Von gedrungenem Wuchs, lila Blüten . 0.60
Wedel, zierende, lange Sporenträger. 80 cm 1.— — gracilis. Sehr zierlich belaubt. 40 cm. Selten 3.—	— — cuprea. Belaubung rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun, Blüten lila 0.60
Phyllitis, Hirschzungenfarn, Polypodiaceae ● ≅ △ # — scolopendrium. Starkwachsender, herrlicher Farn,	— — dumosa. Starkverzweigt, dichte Form, Blüten lila 0.60 — — elegantissima. Sehr zierliche Form, lila Blüten . 0.60
mit breit lanzettlichen Wedeln. 30 cm 0.60 — cristatum. Prächtige, gekrauste Form. 30 cm 0.80	— — fl. pleno. Große, gefüllte, lila Blütenrispen 0.70 — — Foxii, Siehe Neuheiten
— lacerum. Mit starkgeschlitzten Wedeln. 30 cm . 0.80 — marginatum. Monströs geränderte Form. 30 cm . 0.80	— — Hammondii. Aufrechtwachsende Form mit weißen Blüten
— monstrosum. Schmale, monströs geformte Blätter. 30 cm	— H. G. Beale. Siehe Neuheiten 1.— — Johnson var. Siehe Neuheiten
— nepenthoides. Blätter am Grunde nepenthesartig	— minima. Ganz niedrige, dunkelgrüne Rasen bildend. Lila Blüten 0.60
zusammengerollt. 30 cm	— — Mullion. Siehe Neuheiten 0.80
monströs-schirmartig geformt. 30 cm 0.80 — undulatum. Breite und lange, hellimmergrüne, ge-	— prostrata. Siehe Neuheiten
wellte Blätter. Sehr effektvoll. 30 cm 0.80 — var. Hookeri. Siehe Neuheiten 4.—	— — — flagelliformis. Siehe Neuheiten 0.80 — — — Kuphaldii. Siehe Neuheiten 1.—
Polypodium, Tüpfelfarn, Polypodiaceae ● △ # — vulgare. Mit kriechenden Rhizomen u. dunkelgrünen,	— — pygmaea. Niedrigbleibende Art mit lila Blüten 0.60 — — Searlei. Graugrün belaubt, weiße Blüten, spät-
tiefeingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. 30 cm 0.50 — cambricum pulcherrimum. Prächtige, an Nephrolepis erinnernde breite Wedel. 30 cm 0.80	blühend
Polystichum, Punktfarn, Polypodiaceae ● # ≅	Erica, Ericaceae ○─() △ # : : Frühjahrs-Heidekraut — Schneeheide.
— acrostichoides. Seltene nordamerikan. Art mit langen, lederartigen, grobgefiederten Wedeln. 60 cm 1.—	10-30 cm III-IV
 aculeatum. Lange, schmale, lederart. Wedel. 40 cm. 0.60 angulare divisilobum. Große feingefied. Wedel. 50 cm 0.80 	— carnea. Frühblüh. Art, sobald der Schnee verschwindet mit leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt 0.60
— — robustum. Üppigwachsende Form mit fein zerteilter Belaubung. 60 cm	— — alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen 0.70 — — atrorubra. Siehe Neuheiten 0.80
— — plumosum. Sehr feinzerteilte Wedel, moosartig durchscheinend. 40 cm	— gracilis. Siehe Neuheiten
— proliferum. Feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel. Sehr dekorativ. 50 cm 0.80	— — Springwood. Siehe Neuheiten 1.— — Thomas Kingskote. Siehe Neuheiten 0.80



Carex japonica im Rauhreif



Phyllitis scolopendrium undulatum



Paeonia moutan Dakota




Nymphaea Marliacea albida



Clematis hybr. Lasurstern

Berberis (Fortsetzung)	Cotoneaster (Fortsetzung)
— Hookeri # Lederartige, bis 8 cm lange u. 2 cm breite	- prostrata. Starkverzweigte, auf der Erde liegende Art.
kurzgestielte Belaubung. Blüten groß, prächtig	Belaubung groß, hellgrün. Früchte leuchtend rot . 2.—
schwefelgelb	— fructu sanguinea. Siehe Neuheiten 2.
— compacta # Niedrigbleibende Form der vorigen mit den gleichen guten Eigenschaften 2.50	— rubens # Auffallend stumpfschwarzgrüne, zierliche Belaubung und schöne, rote Früchte 1.50
— Julianae # Elyptischlanzettliche Blätter, unterseits	- rupestris. Von niedrigem Wuchs, überschattet mit leuch-
grünlichweiß, goldgelbe Blüten 2.50	tend roten Beeren. Laub rötlichblaugrün 2
stenophylla # Blätter lederartig, oberseits dunkelgrün,	Crataegus pyracantha. Siehe Pyracantha coccinea.
unterseits weißlichgrün, Blüten gelb 2.— — empetrifolia # Empetrumblättrige Form mit rot-	
holzigen, gebogenen Zweigen u. goldgelben Blüten 2.50	Cytisus, Besenginster, Leguminosae ○-∞△⊥ V-VI — albus. Kleine weiße Blüten an schlanken Rispen 1.50
— — Irwinii # Reichblühender, niedriger, dichtwachsend.	- durus. Reichblühende Form, cremeweiße Blüten . 1.
Strauch mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer	- Ardouinii. Niedriger Felsenstrauch, gelbe Blüten 1.50
lederartiger Belaubung und gelben Blüten 2.50 — latifolia # Eine großblättrige Form der Stammart 2.50	decumbens. Siehe Neuheiten
- Thunbergii Hellgelbe Blüten, korallenrote Früchte 0.70	 kewensis. Kriechender Bastard, lichtgelbe Blüten 2.50 praecox. Elfenbeinginster. Zierl. Zweige, schwefel-
— — atropurpurea. Blutrotes Laub, gelbe Blüten, einer	gelbe Schmetterlingsblüt. Ungeheuer reichblühend 1
der schönsten unter den Berberitzen 1.	- prostrata. Stark auf dem Boden liegende Art mit gold-
— minor. Niedrigbleibende Form von B. Thunbergii 1.20 verruculosa # Lederartige, starkbestachelte Blättchen.	gelben Blüten
Blüten goldgelb. 40 cm 2.	- purpureus incarnatus. Aufrechtwachsende Art mit
- Veitchii # Starkbedornter Strauch mit singerlanger	rosafarbigen Blüten
lederartiger Belaubung und goldgelben Blüten 2.50	- schipkaensis. Kleeblättrige, rauhbehaarte Art mit
— Wallichiana # Große, lederartige, breite Blätter, gelbe Blüten 2.50	hellgelben Blütenköpfen
— Wilsonae & Stachel. Büsche, kleine bläulichschimmernde	— — pendula. Bogig überhängende Zweige. Blüten
Belaubung. Blüten goldgelb 1.20	gelb mit rot
Betula, Zwergbirke, Betulaceae O A ®	— Butterfly, Goldgelbe, rotschattierte Blüten 1.50
— nana. Kleinblättrige, niedrige, sehr langsam wachsende Art	— C. E. Pearson. Sehr große, rosabunte Blüten 2.50 — Daisy Hill. Fahlgelb mit verwaschenem rot. Eigen-
Caragana, Erbsenstrauch, Leguminosae ○ △ V-VI	artiges Farbenspiel 2.50
- aurantiaca. Schwachbedornter Zwergstrauch mit	— — Dallimorei. Lebhaftkarmin geflügelte Blüten 2.50
genistaähnlichem Aussehen und orangegelben	— Dorothy Walpole. Fahne magentarosa, Flügel tiefrot. Eine der schönsten Roten 2.50
Schmetterlingsblüten, welche an den gebogenen Zweigen sitzen	— Dragonfly. Nankinggelb, Flügelsamt.düsterkarmin 2.—
- Maxinowicziana. Zierlicher dichter Strauch mit klei-	— — Firefly. Feurigrot geflügelte Blüten 2.—
nen lebhaft grünen Blättchen und gelben Blüten 2.50	- fulgens. Golgelbe, eigenartig leuchtend braunrot
Caryopteris, Bartblume, Verbenaceae ○ △	überzeichnete Blüten
— incana (mastacanthus). Herrlicher Sommerblüher mit	— Moonlight. Blaßgelb. Sehr wertvoll, da es die spät-
gekerbter, silbergrauer Belaubung und blauen Blütendolden	blühendste Sorte ist 2.50
Convolvulus cneorum. Siehe Neuheifen 1.50	Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.
Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae O A 99	Dryas. Siehe niedere Stauden.
- adpressa. Chinesische Art, gedrungener und niedriger	Elsholtzia, Labiatae ○ △ Ø ⊥
wie C. horizontalis, mit etwas größeren Blättern	— Stauntonii. Herbstblühender Zwergstrauch mit rötlich- violetten Blütenähren VIII-IX 1.50
und lebhaftroten Früchten. 20 cm	
- buxifolia # Buxbaumblättrige Form mit niederlie-	Ephedra. Siehe Zwergkoniferen.
genden Zweigen und verhältnismäßig großen,	Escallonia virgata. Siehe Neuheiten 1.50
weißen Blüten	Evonymus, Pfaffenhütchen, Celastraceae O-D # A
liegend, große runde Blätter. Früchte scharlachrot,	— nana (Koopmannii rosmarinifolius) # Mit dünnen langen Zweigen, lanzettliche dunkelgrüne Blätter,
perlenartig. Besonders wirkungsvolle Art 1.20	rosafarbige Samenkapsel 1.
— radicans. Siehe Neuheiten 2.—	- japonica acuta. Siehe Neuheiten 1.
- horizontalis. Bekannte Art mit wagrecht ausgebreiteten Zweigen und roten Früchten im Herbst 1.20	— obovata. Siehe Neuheiten
- fol. var. Siehe Neuheiten 2	— radicans :: # Kriechende, kleinblättrige Stammart . 0.40 — fol. var. :: # Weißbuntblättrige Abart der vorigen 0.40
- microphylla # Niederliegender Strauch mit kleinen,	- vegeta # Schöner Strauch mit großen saftig-
schmalelliptisch dunkelgrüner Belaubung u. kleinen roten Früchten	grünen Blättern. 70 cm 2.
- cochleata. Siehe Neuheiten 2.50	— minima (kewensis) # \(\Omega \) Zierliche Zweige dem
— glacialis (congesta) # Die mit feinen Blättern	Boden anschmiegend. Bildet prachtvolle Teppiche 0.70
dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich	Fuchsia, Winterharte Fuchsie, Oenotheraceae O-1 / VII-X
fest dem Gestein an	— gracilis. Kleinblumige Fuchsie. Kelch rot, Blumen-
karminroten Früchten	blätter blau 0.70
praecox Hessei. Eine besonders starkwüchsige, groß-	— — Tom Thumb. Siehe Neuheiten 1.
blättrige u. großfrüchtige Form der nachgenannten 2.50	- macrostemma. Außerordentlich reichblühende, klein-
— Nan Shan. Rosenrote Blüten, gewellte, runde Blättchen, oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün,	blumige Art
roseprote Frighte 1.50	größeren Blüten 0.70



Cytisus praecox (Elfenbeinginster)



Deutzia discolor floribunda



Phyllodoce empetriformis



Teehybridrose Florex



Mignondahlie



Rosa pimpinellifolia hispida (Edel Wildrose)

Niedrig bleibende und kriechende Felsensträucher (Zwerggehölze) Fortsetzung Genicke Ginster Laguminesse Genicke W.	Muehlenbeckia, Polsterstrauch, Polygonaceae O-() # 1 St — nana (axillaris). Reizendes Sträuchlein, dichte Polster bildend, rundl. Blätter
Genista, Ginster, Leguminosae ○-∞ △ V-VII - anglica. Dorniger Strauch, gelbe Schmetterlingsblüten 1.— cinerea. Silbergraue behaarte, lanzettliche Blättchen, leuchtend goldgelbe Blüten 2.—	Myrica, Wachsmyrte, Myricaceae ○ ⊥ — cerifera. Mit glänzenddunkelgrüner Belaub. u. schönen
germanica. Stachelige Art mit spitznadelförmiger Belaubung und gelbe Blumen	Kätzchen von würzigem Wohlgeruch . III-IV 1.50 Perowskia, Blauraute, Labiatae ○-∞ △ ⊥
hispanica. Stacheliger Strauch mit gelben Blumen 1.— horida. Kleiner, sehr dorniger Zwergginster mit gold-	 abrotanifolia. Siehe Neuheiten
gelben Blüten 2.— pilosa. Niederliegende Art mit kleinen Blättchen	Rispen VII-IX 1.—
und gelben Blüten, rasenbildend 0.80 — radiała. Sparrig verzweigter, kugeliger Strauch mit gelben Blütenköpfen 2.— — sagittalis. Eigentümliche pfeilförmige Blätter, Blüten-	Philadelphus, Falscher Jasmin, Saxifragaceae O—() — microphyllus. Zwergiger Strauch mit schmallanzettl. Belaubung und kleinen weißen, starkduftenden Blüten VI-VII 1.20
büschel goldgelb	Polygala, Kreuzblume, Polygalaceae O-O # \(\triangle - \) — chamaebuxus. Sehr zierliches Sträuchlein mit bux- ähnlichen Zweigen, braunrote Blüten V-VI 1.50
strauch mit nadelartiger Belaubung u. gelben Blüt. 1.50 —— fl. pleno. Gefülltblühende Abart der Stammform 1.20 Hedera, Zwergefeu, Araliaceae ○—④ # △	Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △ ⊥ VI-VIII — Farreri. Strauchige Fingerkrautart mit goldgelben
— helix conglomerata. Mit dichtstehenden gewellten Blättern	Blumen
minima. Aehnlich voriger, aufrechter Wuchs, kleines Blattwerk. Selten 1.50 Helianthemum. Siehe niedere Stauden.	— fruticosa Beesii. Siehe Neuheiten
Hypericum, Johanniskraut, Guttiferae O- # VII-IX aureum. Feinholziger Strauch mit lanzettlicher, unter-	in Massen (,
seits silbergrauer Belaubung und gelben Blüten . 1.— calycinum. Siehe unter niedere Stauden.	Blättern und Blüten als die anderen Arten. Blumen leuchtend gelb
- lysimachioides. Widerstandsfähige Art mit festen Zweigen, bedeckt mit goldgelben Blüten. Sehr reichblühend 0.80	— Veitchii. Mit schneeweißen Blüten 1 Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○ - ● # ⊥
— Moserianum. Goldgelbe Blumen, rote Staubgefäße, reichblühend	— coccinea. Kleine, lederartige Blätter, weiße Büschelblüten, orangerote Becren im Herbst 1.5 — praecox. Siehe Neuheiten 2
zweigt, goldgelbe Blüten	— crenulata Rogersiana. Siehe Neuheiten 2.5
— ciliatum. Zierlicher, kleiner Strauch mit eirundlichen, oberseits sattgrüner, unterseits hellgrüner Be-	Ribes, Zierjohannisbeere, Saxifragaceae O-D # — alpinum nanum. Zwergstrauch mit dunkelgrünem Laub, gedeiht auch im Schatten 0.7
laubung. Kopfartige, weiße Blütenstände 1.50 Delavayanum # Mit zierlich gebogenen Zweigspitzen	Gayana. Siehe Neuheiten
und kleiner, ovallanzettlicher Belaubung 1.50	Rubus, Zwergbrombeere, Rosaceae $\bigcirc -\bigcirc \# \triangle$
onandrum. Siehe Neuheiten	 Fockeanus. Bodenbedeckendes Sträuchlein mit kleinen. bronzegrünen Blättchen und weißen Blüten 2
strongylophyllum # Kleiner Strauch m. abgerundeten, dicklichen, lederartigen Blättchen 1.50	Salix, Zwergweide, Salicaceae $\bigcirc \cong \triangle$. III-IV
Lonicera, Heckenkirsche, Caprifoliaceae ○─○ # △ v-v1	— Bockii. Siehe Neuheiten 2.–
myrfilloides. Hängende Aeste, kleine weißrötliche	— caesia nana. Niederliegende und halbaufrechte glän- zendbraune Zweige und weiße Kätzchen 2.5
Blumen, rote Früchte	 Cottetii. Robuste Kriechweide mit schönen Kätzchen . 1 purpurea nana. Aufrecht wachsendes Sträuchlein mit
förmigen Blättchen und gelblichweißen Blüten 1.50	zierlichen, roten Zweigen und kleinen, weißen
— nitida # Aufrechtwachsender, dicht belaubter Strauch. Myrtenähnliche Blätter oberseits sattgrün, unter-	Kätzchen
seits heller. Blüte rahmweiß. Frucht erbsengroß, purpurblau	laubung und schönen Kätzchen
pileata # Cotoneaster horizontalis ähnlich. Zierstrauch,	— reticulata. Hochgebirgsweide, rundlich genetzte Blätt- chen, kleine niedliche Kätzchen 1.2
mit glänz. grüner Belaubung, Beeren violettpurpur 0.80 — yunnanensis # Gleicht im Wuchs L. nitida, er-	— retusa. Stark auf dem Boden aufliegende, kriechende Art mit glänzenddunkelgrüner Belaubung 1.2
innert jedoch in der Belaubung an L. pileata, ist	— simulatrix. Siche Neuheiten 2
aber sehr viel härter als beide 0.80 — prostrata. Niederliegender Strauch mit lanzettlichen	Senecio Greyi. Siche Neuheiten
Blättchen und weißen, duftenden Blüten 1.20 – rupicola. Mit überhängenden Zweigen und duftenden,	Spiraea, Spierstrauch, Rosaceae ○ △ 🔊 — bullata crispifolia. Halbkugelige Doldenrispen mit
hellila Blumen	dunkelrosa Blüten, Blätter geschlitzt . VII-VIII 0.7
rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren 1.—	— decumbens. Nur 15-20 cm hohes, teppidibildendes Sträuchlein mit niedlichem Blattwerk und kleinen,
— syringantha. Aufrechtwachsend mit schmallanzettlicher Belaubung und duftenden rosalila Blumen 1.20	weißen Blütendolden 2
- tibetica. Schlankzweigiger Kleinstrauch mit schmal-	– mollis. Kleinblättriger, graubehaarter Strauch mit weißlichgelben Blüten
lanzettlicher Belaubung und duftenden, violett-	- pumila. Kleines, niedrig bleibendes Sträuchlein mit

Spiraea pumila (Fortsetzung) 1St. 1	Juniperus chinensis (Fortsetzung) 1 St.
RM	T.M.
— Anthony Waterer. Buschiger Kleinstrauch mit dunkelkarminroten Blumen 0.60	— Pfitzeriana. Aeste wagrecht abstehend. Feine graugrüne Bezweigung Je nach Größe 3.50 bis 10.—
— trilobata (grossulariaefolia). Ausgebreiteter Zwerg-	— communis hibernica. Schöne schmale Säulen bildend 4.—
strauch mit stachelbeerartiger Belaubung und schnee-	— compressa. Siehe Neuheiten 4.—
weißen Blüten in großer Zahl 1.50	— nana. Niederliegende Gebirgsart mit scharfer, grünlich- grauer Benadelung
— vaccinifolia. Niedriger Strauch mit kleiner, heidelbeer- artiger Belaubung und rosa Blüten 2.—	— — aurea. Goldbunte Form der vorigen 5.—
Teucrium, Gamander, Labiatae () #	- prostrata. Niedergestreckte Art mit blauschimmernder
- chamaedrys. Siehe niedere Stauden.	Benadelung. Sehr gut zum Bepflanzen größ. Flächen 2.50
- Requienii. Kleines, niedliches Sträuchlein mit zierlich	— recurva densa. Dunkelgrüne Zwergform mit kurzen, dichten Zweigen 6.—
silbergrauer Belaubung und roten Blütchen. Zer- riebene Blättchen riechen sehr stark nach Salmiak-	— sabina. Dunkelgrüne, auf dem Boden sich ausbreitende
geist und sind ein gutes Mittel gegen Schnupfen . 1.20	Zweige Je nach Größe 3.50 bis 10.—
Ulex, Stechginster, Leguminosae ○ - ① # ⊥	— tamariscifolia. Dunkelgrüne, tamarixart. Benadel. 3.50 — squamata Mayeri. Siehe Neuheiten 5.—
- europaeus. Dorniggrüner Felsenstrauch, leuchtend	virginiana tripartita. Niedere Form mit dichtstehenden
gelbe Blüten IV-V 1.—	aufwärts ausgebreiteten Aesten u. kurzen Zweigen 3.50
— Gallii. Aehnlich vorgenannter, besonders stark bedornt 2.— Viburnum, Schneeball, Caprifoliaceae ○ Ø	- Clanbrassiliana. Ganz gedrungene kurz- u. didit-
— Carlesii. Koreanischer Schneeball m.gezähnten Blättern.	bezweigte Form
Die breiten Blütendolden setzen sich aus sehr wohl-	Picea, Zwergfichte, Pinaceae O A #
riechenden Einzelblüten zusammen 3.—	 excelsa compacta. Dichter, rundlicher Wuchs 4.50 echiniformis. Kissenförmige, igelartig benadelt :
— opulus pygmaeum. Zwergschneeball, der nur eine Höhe von 30 cm erreicht V-VI 2.—	Zwergform
— utile. Chinesischer Schneeball mit ovalen, glänzend-	— Gregoryana. Kurznadelige, dichte, runde Zwergf 5.
grünen unterseits weißfilzigen Blättern und gipfel-	— Maxwellii. Flachkugelige Varietät mit hellgrüner Benadelung
ständigen weißen Blütendolden 2.50	— Merkii. Dicht- und breitwachsende Zwergform . 5.—
Niedrig bleibende und kriechende Nadel-	— — mucronata. Ausgebreitete oder mehr aufstrebende
	Zweige
gehölze (Zwergkoniferen)	— nana. Rundliche, dichtverzweigte Form 5.— — nidiformis. Kissenbildende Form m. kurzen, fächer-
Chamaecyparis, Scheinzypresse, Pinaceae ○ △ #	förmigen, hellgrünen Zweigen 5
— Fletscheri. Siehe Neuheiten 4.—	— parviformis. Sehr gedrungene, breitpyramidale
— Lawsoniana forsteckensis. Vollkommen dicht, breit-kugelförmig 6.—	Zwergform
— Krameri. Breite dichte Kugelform m. dunkelgrüner	— pumila glauca. Plattrunde Zwergform mit bläulich-
Benadelung 8.—	schimmernder Benadelung
— minima glauca. Dichte, breitwachsende, dunkel-	— pygmaea. Dichte, kegelförmige Sorte mit hell- grüner Benadelung
blaugrüne Kugelform	- Remontii. Spitzkegelige Form. Kurze, dicht-
— obtusa albo spicata. Schöne dunkelgrüne Zwergform	stehende Zweige 5.—
mit weißen Spitzen 6.	— orientalis compacta. Zierliche, pyramidale Zwerg-
— aurea gracilis. Schöne Form mit beständiger, gold- gelber Belaubung	form mit kleiner, dunkelgrüner Benadelung 5.— — — gracilis. Eine besonders feinnadelige Form der
— Crippsii. Mit blaß- oder goldgelber Färbung 6.—	vorigen
— compacta. Gedrungener, rundlichkegelförmiger	Pinus, Zwergkiefer, Pinaceae ○ △ #
Wuchs und dunkelgrüne Belaubung 6.— — nana. Fächerförmig flachausgebreitete dunkelgrüne	- densiflora pumila. Zweinadelige Zwergkiefer von
Zwergform	kugeligem Wuchs und dunkelgrüner Benadelung 8.— — montana. Die bekannte Krummholzkiefer des Hoch-
— — aurea. Die fächerförmigen Zweige sind von	gebirges (Latsche). Niederer, strauchartiger Wuchs.
goldgelber Färbung	Für den Steingarten unentbehrlich. Aeußerst an-
form mit fadenförmigen Zweigen 4.—	spruchslos Je nach Größe 2.50 bis 6.—
— mana aureo-variegata. Niedrigbleibende, dichte,	— pumila, echt. Schr seltene sibirische Zwergkiefer von kriechendem Wuchs
goldbunte Kugelform 6.—	Taxus, Eibe, Taxaceae ○-● △ #
Cryptomeria, Kryptomerie, Taxodiaceae ○ △ # — japonica cristata. Monströse Form mit dichtstehenden,	— baccata adpressa variegata. Belaubung goldgelb
pfriemförmigen Nadeln 6.—	mit grünen Zweigen 5.—
— Lobbii compacta. Dunkelgrüne niedere schmale	— — Dovastoni, Breitwachs., grobnadelig, dunkelgrün 5.— — — aurea variegata. Goldbunte Form mit über-
Säulen	hängenden Seitenästen 5.—
Ephedra, Meerträubel, Gnetaceae O A # Gehören botanisch zu den Koniferen, gleichen aber in ihrem	Die drei vorstehenden Arten eignen sich nur für
schachtelhalmähnlich. Aussehen mehr einem Gehölz.	größere alpine Anlagen.
— Gerardiana. Interessante und seltene Art	— ericoides. Schwachwiichsige Zwergform mit schma- len, sehr spitzen Nadeln
- fragilis (campylopoda). Schöne, zierliche Sorte 1.50	— fastigiata. Irrländische, langsamwachsende Säulen-
— helvetica. Schweizer Art	cibe mit dunkelgrüner Benadelung 4
Juniperus, Wacholder, Cypressaceae ○ △ #	— — — aurea. Sehr schöne goldbunte Form der vorigen 5.—
— chinensis argentea-variegata. Bildet dichte Kugeln	Thuya, Lebensbaum, Pinaceae O A #
mit weißen Zweigspitzen 4.—	occidentalis Ellwangeriana Rheingold. Loder ge- baute Spielart von leuchtend goldgelber Färbung 4.
— — compacta aurea. Zierlich goldbunte Zweige 4.—	The second secon



Haupteingang zur Gärtnerei



Teilansicht der Abteilung Vermehrung und Bürogebäude



Teilansicht unserer Wirtschaftsgebäude



Ausschnitt aus unserer Samenversandabteilung



Pflanzkolonne bei der Arbeit

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20-25 Sorten unserer Wahl zu RM 60.-, 25 Stück zum 0/0 Preis

Acer, Ahorn, Aceraceae O ®
- campestre 1 - Korkartige Zweige, schöne Herbst-
färbung
gefärbte Früchte 0.75
Amelanchier, Felsenbirne, Rosaceae O-1-0 8
botryapium (canadensis). Hängende Zweige, Blüten groß, weiß, in Trauben V-VI 0.75
Amorpha, Bastard-Indigo, Leguminosae ○ ∞ — crispa. Gekrauste Blätter, violettblaue, ährenartige
Blütenrispen VI-VII 0.75
Aralia, Aralia, Araliaceae O L chinensis mandschurica. Aufrechter, dorniger Stamm, große, gefiederte Einzelblätter 3.—
Aronia, Zwergvogelbeere, Rosaceae O @
— arbutifolia. Glänzendgrüne Blätter, weiße Blüten und scharlachrote Beeren im Herbst V-VI 0.75
Berberis, Berberitze, Berberidaceae ○ Ø ⊥ V-VI aggregata. Belaubung lebhaftgrün, länglicheiförmig. Gelbe Blüten in dichten Trauben 1.—
 aquifolium. Siehe Mahonia. brevipaniculata. Dichtwachsender Strauch, Zweige
leuchtend rot, Blumen hellgelb 0.80
— concinna. Strauch mit rotbraunen Zweigen, Belaubung oberseits tiefgrün, unterseits stark weißlich. Blüten
tiefgelb. Frucht rot
Unterseite. Gelbe Blüten 1.50
 vulgaris. Gemeine Berberitze mit schön. rot. Früchten 0.60 atropurpurea. Beliebter Strauch mit dunkelroter
Belaubung und gelben Blüten 0.75
Buddleia, Fliederspeer, Loganiaceae ○ ⊥ — alternifolia. Siehe Neuheiten 1.50
— variabilis magnifica. Schöner Strauch mit graugrüner
Belaub. u. tiefrosapurpurne Blütenrisp. VII-X Veitchiana. Malvenblaue Blütenrispen VII-X 1.—
Calycanthus, Gewürznelke, Calycanthaceae O-1 1
- floridus. Die dunkelbraunen Blüten haben einen star- ken, würzigen Geruch VI-VII 1.50
Ceanothus, Sommerflieder, Rhamnaceae ○ ⊥
 hybr. azureus grandiflorus. Schöner Zierstrauch mit prächtigen, hellblauen Blütenrispen . VII-VIII 1.50 Marie Simon. Mit rosa Blüten VII-VIII 2.—
Colutea, Blasenstrauch, Leguminosae O
— arborescens. Feingefiederte, lichtgrüne Blätter, goldgelbe Blüten
Cornus, Hartriegel, Cornaceae O-1 8 . III-VI
— alba. Holz rotbraun, Blüten weiß, Beeren blauweiß. 0.70 — australis. Kräftige, rotbraune Triebe. Herbstfärbung
tiefviolettbraun
Blättern
— brachypoda. Breitelliptische, glänzendgrüne, unterseits weißgraue Blätter, Blüten rahmweiß 0.80
— flaviramea. Wirkt besonders im Winter durch die hell- gelbe Bezweigung sehr zierend 0.80
— mas. Blüht goldgelb vor dem Austrieb der Blätter. Rote, kirschenähnliche Früchte , 0.80
 sanguinea. Mit braunroten Zweigen
Zweigen
gerandet

Sorten unserer Wahl zu AM 60.—, 25 Stuck zum 10 Freis
Coronilla Kronwicke Leguminosae ()
Coronina, Monwicke, Leganiniosae
— emerus. Niedriger Strauch mit gehederten Blattern
und remarks does sometiment
Corylus, Hasel, Betulaceae O-D 1
avellaria. Genommente Haseistraden
— atropurpurea. Bluthasel. Belaubung und Früchte
Cotoneaster, Ziermispel, Rosaceae O Ø V-VI
— acutifolia. Glänzendgrüne Belaubung, Blüten rötlich-
weiß, Frucht braunschwarz 0.75
— applanata (Dielsiana). Ovale, dunkelgrüne Blätter,
unterseits weißgrau. Glänzendrote Früchte 0.75
- bullata. Schöner Strauch mit blasenförmig aufge-
bauschten Blättern, die oberseits glänzendgrün
sind u. unterseits gelblichgrau. Lebhaftrote Früchte 0.75
- Francheti. Schöner Strauch mit gebogenen Zweigen.
Blätter oberseits sattgrün, unterseits weiß- oder
gelbfilzig. Prachtvolle, orangerote Früchte 1.50
- lactea # Uppig weißblühend u. stark fruchtend. Selten 2
- nitens. Dichte, ausgebreitete Verzweigung, groß., breit-
ovales Blatt, lebhaftgrün. Frucht schwärzlichrot 0.80 — racemiflora (nummularia). Dunkelgrüne Belaubung,
weiße Blüten in gedrängten Doldentrauben. Rote
Früchte
— salicifolia floccosa # Lederartige, lebhaftgrüne Be-
laubung, Blätter unterseits weißfilzig. Große, leb-
haftrote Früchte
— Simonsii. Halbimmergrüner Strauch mit lederartiger,
glänzendgrüner Belaubung. Blüten gelblichweiß,
Beeren korallenrot
Crataegus, Dorn, Rosaceae O @ L V-VI
— oxyacantha alba plena. Weiß gefüllte Blüten 1.— — punicea. Blüten einfach, leuchtend dunkelrot 1.—
— — punicea. Butten einrach, ledertend dunkertet : 1. — — plena. Dunkelrote, gefüllte Blumen 1.—
— rosea plena. Blüten rosa, gefüllt 1.—
— pyracantha. Siehe Pyracantha (Zwerggehölze).
Cydonia, Japanische Quitte, Rosaceae O Ø IV-V
— japonica. Feurigrote Blüten, zitronengelbe Früchte 0.70
— alba. Einfach, weißblühend
— rubra grandiflora. Großblumig, karmoisinrot 1.—
— versicolor lutescens. Mit gelblichroten Blüten . 1.—
— Maulei. Niedrigbleibende Art mit zinnoberroten Blüt. 1.—
— Sargenti, Mit feurigroten Blumen. Zwergiger Wuchs 1.— Cytisus. Siehe unter Felsengehölze.
Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.
Decaisnea, Blauschote, Lardizabalaceae ○ ⊥
- Fargesii. Schöner Strauch mit langen, gesiederten
Blättern u. blaubereift. Zweigen. Blumen grünlich-
gelb. Blaugefärbte, hängende Früchte. V-VI 2.—
Desmodium (Lespedeza) Buschklee, Leguminosae O — penduliflorum. Mit gebogenen Zweigen, dreilappigen
Blättern und prachtvollen, rosaroten Blütenrispen 1.20
Deutzia, Maiblumenstrauch, Saxifragaceae O V-VI
- crenata candidissima. Reichblühender Strauch mit
großen, weißen Blüten 0.70
— eburnea. Zierliche Blütenrispen, herrlich elfen-
beinfarbig einfach
rosea plena. Blumen gefüllt, rosa 0.70
— discolor floribunda. Schöne, weiße Rispen, außer- ordentlich reichblühend
gracilis. Schöner Zwergstrauch mit weißen Blütenrisp. 0.70
— campanulata. Glockenförmige, mildweiße Blumen 0.70
— multiflora. Die aufrechten Zweige sind ihrer ganzen
Länge nach mit weißen Blumen bedeckt 0.70
- hybr. Welsii. Reinweiß, gefülltblühend 0.70
— Lemoinei Boule rose. Blüten aufrecht, rosaweiß, in
einer Dolde vereinigt 1.

Schönblühende 1 St.	Hydrangea (Fortsetzung) 1.St.
Deutzia (Fortsetzung)	— paniculata grandiflora. Große, reinweiße, pyramiden-
parviflora. Dunkelgrüne Belaubung, Blüten weiß 0.70 staminea. Blumen weiß und rosarot 0.70	förmige Rispen
Diervilla, Weigelie, Caprifoliaceae ○ ⊥ VI-VII	japonica. Grünholziger Strauch mit einfachen, großen,
— amabilis. Schöne, große, hellrosa Blumen 0.80 — biformis. Große dunkelrosa Blüten 0.80	gelben Blüten
— candida. Sehr schön reinweiß blühend 1.—	— piena. Beliebter Blütenstrauch mit dichtgefüllten.
Eduard André. Dunkelrote Blüten : 1.—	goldgelben Blüten 1.—
Eva Rathke. Prächtig leuchtend karmin bis purpurrot 1.— Fleur de may. Purpur marmoriert, innen lachsrosa . 1.—	Kolkwitzia amabilis. Siehe Neuheiten 2.
- Floréal. Blumen zartrosa, Schlund lebhaftkarmin 0.80	Laburnum, Goldregen, Leguminosae O- V-VI alpinum. Belaubung glänzenddunkelgrün. Sehr große,
grandiflora Vanhouttei. Blum. rosa mit weiß bordiert 0.80 hortensis Conquéte. Schr große, dunkelrosa Blumen 1.—	goldgelbe Blütenrispen. Blüht später als L. vulgare 1.50
intermedia. Rosa und weiße Blumen 0.80	- Vulgare. Gelbe, hängende Blütentrauben in großer Zahl 0.80
— Lowii. Blumen dunkelpurpurrot	Ligustrum, Rainweide, Oleaceae O – WI-VII — ovalifolium aureum elegantissimum # Blätter schön
— Président Duchartre. Blumen dunkelpurpur 1.—	goldgelb gerändert 1 —
purpurata. Einfarbig, durchscheinend, dunkelrosa . 0.80	- Regelianum. Breitwachsender und reichblühender Strauch. Weiße Blumen, schwarze Früchte 0.80
Elaeagnus, Ölweide, Elaeagnaceae ○ ⊥ — edulis (multiflora). Schöner Strauch mit silberigem	vulgare chlorocarpum. Die gelblichgrünen Früchte
Laub und großen roten Beeren V-VI 0.75	sind sehr zierend
Escallonia virgata. Siehe Neuheiten 1,50	— glaucum. Die silbergrau gefärbten Blätter sind regelmäßig weiß gerandet 0.70
Evonymus, Spindelbaum, Celastraceae O-D 8	— ITalicum # Aufrechtwachsende Varietät mit dunkel-
alata. Buschiger Strauch mit korkflügeligen vier- kantigen Zweigen	grüner mittelgroßer Belaubung 0.70 Lonicera, Heckenkirsche, Caprifoliaceae O-()
europaea. Mit korkig geflügelten grünen Aesten.	- chrysantha. Buschiger Strauch mit gelben Blüten und
Samenkapsel rosarot	dunkelroten Beeren V-VI 070
grandiflora. Schön belaubter Busch mit großen, weißen	— fragrantissima # Prachtvoller Strauch mit hängenden Zweigen und großer, rundovaler, lederartiger Be-
Blütentrauben IV-V 1.50	laubung. Weiße, wohlriechende Blumen. II-III 1.—
Fontanesia, Fontanesie, Oleaceae O-D phillyraeoides. Schönbelaubter, grünblättrig. Strauch	— Morrowii. Mit überhängenden Aesten, eirundlichen Blättern und weißgelben Blüten.
mit traubenartigen Scheindolden von weißer	Beeren blutrot V-VI 0.70
Farbe V-VI 0.80	— Purpusi # Herrlicher Strauch mit lederartiger Be- laubung und außerordentlich wohlriechenden grün-
Forsythia, Forsythie, Oleaceae O-() III-IV intermedia. Bekannt. Zierstrauch mit lichtgelben Blüt. 0.70	weißen Blüten II-III 1.50
— primulina. Die hellgelben Blüten stehen sehr dicht	— tatarica. Schönblühender Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaftroten Früchten V-VI 0.70
gedrängt	- xylosteum. Uberhängende Zweige, gelblichweiße
— suspensa. Die überhängenden Zweige sind dichtbesetzt	Blumen und rote Beeren V-VI 0.70 Magnolia. Siehe Moorbeetpflanzen.
mit trichterigen, glockigen, hellgelben Blüten 0.70 Fortunei atrocaulis. Schwarzrot austreibende	Mahonia, Fliederberberitze, Berberidaceae ○ - () #
Triebe, gelbe Blüten 1.	— aquitolia. Bekannter Strauch mit glänzendgrijnen
viridissima. Grünholziger Strauch mit dunkelgelben	lederatigen gehederten Blättern und gelben Blüten-
Blüten	— Japonica. 30 cm lange, gefiederte, lederartige Blätter
- japonica. Seltener Zierstrauch mit großen, goldgelben	große geibe bluten IV-V 2.—
dichtstehenden Blüten mit braunroter Zeichnung, die den Strauch vollständig überdecken I-III 4.—	Malus, Zierapfel, Rosaceae O \(\preceq\) V-VI — Eleyi. Der junge Austrieb ist rotpurpurn, die großen
- mollis. Blumen lebhaftgelb u.v.köstl. Duft I-III 4	Diuten lebhattweinrot
Hibiscus, Eibisch, Malvaceae ○ ⊥ VIII-IX — Admiral Dewey. Aufrechtwachsender Strauch und	— floribundus purpureus. Belaub. im Austrieb purpur- rot. Zahlreiche karmesin- oder kirschrote Blumen 1.50
malvenartige, weißgefüllte Blüten 1.50	- Nieuzweizkydna. Leuchtend braunrote Belaubung
coelestis. Einfach, blaublühend	Blüten dunkelrosa. Große dunkelrote Früchte 1.50 — Scheideckeri. Zartrosa gefüllte Blüten 1.50
puniceus plenus. Halbgefüllt, dunkelrosa 1.50	Morus, Maulbeere, Moraceae O
Rubin. Einfach, dunkelrot	— alba. Weißfrüchtige Art. Lebhaftgrüne Belaubung . 0.70
Snowdrift, Große, reinweiße Blumen 1.50 Hippophae, Sanddorn, Elaeagnaceae ○ ∞ ⊥	Paeonia moutan (arborea), Jap. Baumpaeonia
rhamnoides. Feinblättriger Strauch mit silberglänzen-	Ranunculaceae O \(\preceq\) Blühen 3 Wochen früher als die chines. Pfingstrosen. 150 cm \(\cdot\) V-VI
der Belaubung und orangefarbenen Beeren im Herbst	Gefülltblühende:
Hydrangea, Hortensie, Saxifragaceae ○ ⊥ VII-IX	- De Bugny, Weiß mit violetten Strait
- arborescens grandifl. Große, rundliche Belaubung	- Jednie d'Arc. Zarflache
und reinweiße Blumen in großen Dolden 1.— — macrophylla Domotoii. Siehe Neuheiten 1.50	— Louise Mouchelet, Silbriglachsrosa
- opuloides acuminata. Flache Blütenstände, sterile	Jouvern de Ducher. Lietrotviolett
bläuliche Blüten 1.—	I − − d'Etienne Méchin. Frischrosa

Paeonia moutan (Fortsetzung)	Ribes sanguineum (Fortsetzung) 1 St. $\Re M$
Einfach- u. halbgefüllt blühende Sorten:	— — carneum. Fleischfarbige Blütentrauben 0.75
— — Dakota, Kirschrosa	— grandiflorum. Großblumige, blutrote Blüten 0.80 Salix, Weide, Salicaceae ○ ≅
— Kansas. Reinweiß 4.—	- caprea. Große, dicke, runde, graue Kätzchen, voll
— New-York, Weiß mit kirschrotem Mittelstern 4.— — Orkus. Schwarzrot 4.—	aufgeblüht goldgelb III-IV 1.
— Pennsylvania. Ladisrot 4.—	Sambucus, Holunder, Caprifoliaceae O-()- VI-VII — canadensis maxima. Sehr dekorative Form mit riesig
Philadelphus, Falscher Jasmin, Saxifragaceae O-()	großen, breiten, weißen Blütendolden 1.
— grandiflorus. Große, einfache, reinweiße Blüten,	 nigra. Gemeine, schwarzfrüchtige Art 0.70 argentea marginata. Weißbuntblättrige Form . 1.
intensiv duftend 0.70	— racemosa. Prachtv. korallenrote Früchte in groß. Zahl 0.75
- Lemoinei erectus grandifl. Schr große, reinweiße, wohlriechende Blüten	Spiraea, Spierstrauch, Rosaceae O III-V
- Virginal. Außerordentlich große, reinweiße, gefüllte	- albiflora. Zierliche, niedr. Art mit weißen Doldenrisp. 0.70 - arguta. Die zierlichen Zweige sind im zeitigen Früh-
Blüten. Sehr wohlriechend	jahr mit schneeweißen Blüten übedeckt 0.80
weiße, wohlriechende Blüten 0.70	— japonica macrophylla. Großblättrige, schön rot austreibende Form mit roten Blüten 0.70
— pubescens. Rahmweiße, sehr wohlriechende, glockige Blüten	— Menziesii alba Douglasii. Große, kegelförmige Ris-
- satsumi Yokohamae. Große bis 3,5 cm im Durch-	pen, besetzt mit fleischfarbigen Blüten 0.70 — pseudo-Douglasii. Schmallanzettliche Belaubung,
messer haltende, geruchlose, weiße Blüten 0.70 — Zeyheri. Großblättrige und großblumige, duftende Art.	Blüten purpurrosa 0.70
Weiße Blüten	— prunifolia plena. Große, weiße, gefüllte Blüten an eleganten Zweigen
Physocarpus, Blasenspiere, Rosaceae O-() — intermedius parvitolius. Dichtverzweigter Strauch	— Thunbergii. Graziöse Zweige, die sich im zeitigen Frühjahr mit weißen Blüten schmücken 0.80
mit kleinen Blättern und rosa Blüten . VI-VII 0.70	— Vanhouttei. Hübscher Strauch m. schneeweißen Blüt. 0.70
Potentilla. Siehe unter Zwerggehölze	- Veitchii. Sehr große Dolden reinweißer Blumen 0.80
Prunus, Zierpflaume, Rosaceae O 1 IV-V	Symphoricarpus, Schneebeere, Caprifoliaceae
— japonica alba plena (sinensis alba pl.). Feinzwei- giges Sträuchlein mit weißen, gefüllten Blumen . 1.50	— acutus. Schönbelaubter Strauch mit hellroten Blüten
— rosea plena. Mit rosa gefüllten Blumen 1.50	und äußerst zahlreichen weißen Beeren 0.70 — Giraldii. Zierlicher Wuchs, Austrieb rötlich. Beeren
 Pissardi. Dunkelrote Belaubung und weißer Blütenflor 1.50 Moseri pl. Mit großen, rosagefüllten Blumen 1.50 	klein, dunkelrot 0.80
— nigra. Mit schwarzpurpurroter Belaubung und violetten Blüten	— racemosus. Bekannter Strauch mit zierenden weißen Früchten
— Purpusi. Die dunkelroten Blätter sind gelb und	Syringa, Flieder, Oleaceae ○ ⊥ V-VI
rosa marmoriert	- persica. Sparrigwachsender Strauch mit feiner Be-
glänzendunkelgrüne Blätt. u. weiße Traubenblüten 0.70	laubung und lockeren, lilarosa Blütenrispen 1.50 — vulgaris Andenken an L. Späth. Einfach, dunkel-
— triloba plena. Bekanntes, rosa gefülltblühendes Mandelbäumchen Sträucher 1.50	purpur
Halbstämmehen 2.50	— Charles X. Einfach, lilarot
Prunus serrulata, Japanische Zierkirsche, Rosaceae	— Congo. Einfach, dunkelrot
Büsche 2.—, Halbstämme 4.—, Hochstämme 6.—	— Leon Gambetta. Gefüllt, zarthellblau 2.50
— Hisakura. Sehr große, rosagefüllte Blüten in zier- lich hängenden Büscheln.	— — Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß
— — James H. Veitch. Rosarote starkgefüllte Blumen.	— Michel Buchner. Gefüllt, blaßlila 2.50
— Shidare Sakura. Große, rosagefüllte Blumen, womit die stark hängenden Zweige völlig über-	— Président Grevy. Gefüllt, lilablau 2.50
deckt sind.	Tamarix, Tamariske, Tamaricaceae ○ ⊥ . VI-VII — gallica indica. Graziöse Belaubung u. rosa Blüten . 1.—
 — Shirofugen. Zartrosa einfache Blüten. — Ukon. Halbgefüllte, große, grünlichweiße Blumen. 	— germanica. Blaugrüne Belaubung, blaßrosa Blüten . 1.—
Ptelea, Lederblume, Rutaceae O	— tetrandra. Lebhafthellgrüne Belaubung u. rosa Blüten 1.—
- trifoliata. Aufrechtwachsend. Strauch m. dreilappischen	Viburnum, Schneeball, Caprifoliaceae ○-① Ø ⊥ V-VI — lantana. Große, graugrüne Belaubung, weiße Blüten-
Blättern VI-VII 0.70 Rhus, Perückenstrauch, Anacardiaceae ○ - Ø ⊥	dolden und korallenrote Beeren 0.70
- cotinus. Hübsch belaubter Strauch mit federartigen	— opulus sterile. Allgemein beliebter und bekannter Zierstrauch mit weißen, kugeligen Blütendolden 0.80
Fruchtständen im Hochsommer 1.50 — typhina. Mit 50 cm langen, gesiederten Blättern, die	- rhytidophyllum # 20-30 cm lange, breitlanzettliche
sich im Herbst leuchtend rot färben 1.—	Blätter, oberseits dunkelgrün, unterseits bräunlich-
— laciniata. Starkgeschlitzte Belaubung 2.50	filzig. Blüten gelblichweiß, Beeren rotbraun bis schwarz
Ribes, Zierjohannisbeere, Saxifragaceae O Ø IV-V — alpinum • Kleiner Strauch mit glänzendgrüner Be-	tomentosum (plicatum). Gelblichgrüne, glänzende
laubung	Belaubung und große, weiße Kugelblüten 1.50 — venosum. Schmaleiförmige, grobgezähnte Blätter.
- Gordonianum. Lange, orangefarbene Blütentrauben 0.80	Weiße Blütendolden und schwarze Früchte 0.80
— sanguineum. Blütentrauben blutrot 0.75	— Siehe auch Zwerggehölze.

Koniferen (Nadelhölzer)	Preis per 1 St.
Für hier nicht aufgeführte Sorten u. Größen Preise auf Anfrage.	Allee- und Zierbäume 8-10-12 cm Stammumfang
Preis- klasse 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175	Acer dasycarpum. Silberahorn
1 1.80 2.40 3.— 3.60 4.80 2 2.— 3.— 3.60 4.80 6.—	— platanoides. Spitzahorn
3 2.40 3.60 4.80 6.— 8.—	Schwedleri. Rotblättriger Ahorn 6-8-
4 3.60 5.— 6.— 9.— 12.— 5 4.— 6.— 9.— 12.— 14.—	 pseudoplatanus. Bergahorn atropurpureum. Rotblättriger Bergahorn 7-8.
6 4.80 7.— 10.— 14.— 16.—	Aesculus hippocastanum. Weißbl. Roßkastanie 5-7
8 8.— 10.— 14.— 16.— 8 10.— 12.— 15.— 18.—	— rubicunda. Rotblühende Roßkastanie 6–8.– Ailanthus glandulosa. Götterbaum
Abies balsamea. Balsamtanne	Alnus glutinosa. Schwarzerle
prachyphylla. Nikkotanne	— incana. Weißerle
— grandis. Kaliforn. Weißtanne	— atropurpurea. Blutbirke mit Ballen 6-8.— Castanea vesca. Edelkastanie
Nordmanniana, Nordmannstanne	Crafaegus monogyna fl. pl. Gefülltblib. Rotdorn 5-6-
— pectinata. Weißtanne	Fagus silvatica purpurea. Blutbuche mit Ballen 8-10 – Fraxinus exelsior. Gemeine Esche
Cedrus atlantica. Atlas-Zeder	Platanus occidentalis. Amerikanische Platane
— glauca. Stahlblaue Form 8-9 — deodara. Himalaja-Zeder	ropulus balsamitera. Balsampappel 5-6-
Chamaecyparis, Schein-Zypresse	— canadensis. Kanadische Pappel
— Lawsoniana. Hellgrün, pyramidal 2-3 — Alumii. Stahlblaue Nadeln	Quercus palustris. Sumpfeiche 6-8
— erecta viridis. Frischgrün	— pedunculata. Deutsche Eiche 6–8.– — fastigiata. Pyramideneiche mit Ballen 6–8.–
3liver Queen. Silbrigschimmernd 4.5	rubra. Amerikanische Roteiche 6-8.
— Triumph von Boskoop. Blaugrün	Robinia pseudac. Bessoniana. Kugelakazie 5-6 — inermis. Kugelakazie
— glauca. Blaugrün, überhängend	Sorbus aucuparia. Gemeine Eberesche
aurea. Goldgelbe Varietät 4.5	— — moravica. Süßfrüchtige Eberesche 5–6. — Tilia grandiflora. Großblättrige Linde 5–7. —
— filifera. Fadenförmig überhängende Zweige 4-5 — plumosa. Gedrungene Form	— parvifolia Kleinblättrige Steinlinde 5-7 — rubra euchlora. Krimlinde
— — aurea. Goldgelbe Form	— tomentosa. Ungarische Silberlinde 5-7
Juniperus, Wacholder	Ulmus campestris. Feldulme
 virginiana glauca. Blaugrün Schotti. Frischgrün 5-6 5-6 	— fastigiata. Säulenulme
— communis, chinensis usw. Siehe Zwergkoniferen.	Hängebäume
Larix europaea. Gemeine Lärche 2-3 — leptolepis. Japanische Lärche	Betula pendula Youngi. Hängebirke mit Ballen 8-10.— Fagus silvatica pendula. Hängebuche mit Ballen . 10-12.—
Picea alba. Weißfichte	— purpurea pendula. Hängeblutbuche m. Ball. 12-15.— Fraxinus excelsior pendula. Hängeesche 6-8.—
— excelsa. Einheimische Rotfichte	Jalix alba viitelina pendula. Hängeweide
orientalis. Breitkegelig, dunkelgrün	Ulmus montana pendula. Hängeulme 6–8.–
pungens. Graugrün 2-3 glauca Kosteri. Echte Blautanne	Heckengehölze (ab 25 Stück % Preis) 100 St.
— Siehe auch Zwergkoniferen. Pinus cembra. Zirbelkiefer	Carpinus befulus. Hainbuche . 80–100 cm hoch . 80.— 100–125 cm hoch 100 St. 100.— 125–150 " " . 140.—
— laricio austriaca. Osterreichische Schwarzkiefer 4-5	Crataegus oxyacantha. Weißdorn 40-60 " 8.— 60-80 cm hoch 100 Stück 12.— 90-110 " 15.—
— strobus. Weymouthskiefer— 3-4 — Siehe auch Zwergkoniferen.	Ligust 60-80 cm body 30
Pseudotsuga Douglasii. Douglasfichte 2-3	80-100 cm hoch 100 Stück 40.— 100-120 " " 50.— — vulg. atrovirens. Immergrün . 40-60 cm hoch . 30.—
Taxus, Eibe — baccata. Glänzenddunkelgrüne Nadeln 6-7	60-80 cm hoch 100 Stück 40.— 80-100
— tastigiata. Siehe Zwergkoniferen.	70-80 cm hoch 100 St. 350 .— $90-100$
Thuja, Lebensbaum — gigantea. Riesen-Lebensbaum	Thuja occidentalis 100–125 "
— occidentalis. Abendländ. Lebensbaum 1-2 — Columna. Schlanke Säulen 2-3	Einfaßbux (10 Pflanzen per lfd. Meter) pro lfd. m 1.— Bux
— — Ellwangeriana. Gedrungene Pyramide 2-3	- Büsche 30-40 cm hoch 1.50 40-50 cm hoch 2
— Hoveyi. Eirundlicher Wuchs	- Pyramiden 40-50 " " 3.— 60-70 " " 4.—
— — lutea. Gelbe Belaubung	1 Rugein 25-50 3 - 35-40
Tsuga canadensis. Helmlockstanne	— Bienenkorbf. 30–40 " " 3.— 50–60 " " 5.— Für hier nicht aufgeführte Sorten u. Größen Preis auf Anfrage.
	or Ologen Freis auf Antrage.

	4.51
Winterharte Schlinggewächse 1 St. R.M.	Humulus, Goldhopfen, Moraceae O RM
Winterharte Schlinggewächse Topf-Schlingpflanzen können das ganze Jahr hindurch von uns bezogen und gepflanzt werden. Actinidia, Strahlengriffel, Dilleniaceae O — arguta. Schlingende u. nichtschlingende Triebe, weiße Blüten. Schöne Blattfärbung V-VI Akebia, Akebie, Lardizabalaceae O— — quinata. Bis 4 m hoch, dunkelgrüne Blätter. Schöne violette Blütentraube V-VI 2.— Ampelopsis. Siehe Parthenocissus. Aristolochia, Pfeifenstrauch, Aristolochiaceae O— — macrophylla (Sipho). Bildet mit sein. riesigen Blattwerk einen smaragdgrünen dicht. Vorh. V-VI 2.50 Campsis (Bignonia), — Trompetenstrauch, Bignoniaceae O — radicans. Trompetenblütige Schlingpflanze m. orangegelben Blumen — grandiflora. Besond. großbl., orangerot VI-VII 2.50 Celastrus, Baumwürger, Celastraceae O— Celastrus, Baumwürger, Celastraceae	— lupulus aureus. Mit großen goldgelben Blättern 1.— Jasminum, Jasmin, Oleaceae ○ — ① — Beesianum. Bel. ellipt., Blüt. leucht. blutrot V-VI 1.50 — nudiflorum. Schr reichblühend, goldgelb. I-III 1.20 — officinale. Weißbl., schr groß, wohlriech. VII-VIII 1.50 — stephanense. Schöner, kleinblättriger Schlinger mit rosaroten, wohlriech. Blüt. i.groß. Büsch. VII-VIII 2.— Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae ○ — ② Gedeiht in jedem Boden. Köstlich duftend . VI-VIII — alseuosmoides # Lederartige Blätter, Blüten purpur mit gelb
 orbiculata. Stark und hoch schlingend mit rundlichen, freudiggrünen Blättern und zierenden Früchten . 1.50 scandens. Längliche, dunkelgrüne Blätter u. korallenrote Früchte	sinensis # Mit rötlicher Belaubung, hellgelbe Blüten . 2.— Tellmanniana. Siehe Neuheiten 2.— tragophylla. Mit schön hellgoldgelben, 6 cm langen, außen leicht gestreiften Blumen. Selten 3.—
Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae. Zur Pflanzung hebe man eine 50 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst eine Schicht Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Kompost-	Menispermum, Amerikan. Mondsame, Menispermaceae O - canadense. Mitlapp.dunkelgr.Blätt.u.grünweiß.Risp. 1.20
Großblumige Hybriden: O Comtess of Lovelace. Blaulila	Parthenocissus (Ampelopsis), Vitaceae ○ Ø — Engelmannii. Zierlich belaubter Selbstklimmer mit schöner roter Herbstfärbung 0.80 — quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein 0.60 — radicantissima (muralis). Starkwachsender selbstklimmernder wilder Wein, mit braunr. Herbstfärb. 0.80 — tricuspidata var. Lowii. Siehe Neuheiten 2.— — Veitchii (Efeublättriger selbstklimmender japan. Wein). Die Blätter liegen fest übereinander, sodaß die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbstblutrot sich färbend
Verschiedene Arten: O-1	Periploca, Griechische Baumschlinge, Asclepiadaceae O-O graeca. Blätter glänzenddunkelgrün, bis 10 cm lang, braunrote wohlriechende Blüten . VII-VIII 3.—
 alpina. Bildet nur 1 m lange Ranken u. eignet sich sehr gut zum Überranken von Felsen usw. Sehr schöne violettblaue Blüten IV-V 2.50 montana rubens. Rote Blüten bis zu 8 cm Durchmesser, starkwachsend V-VI 2.— grandiflora. Große, weiße Blumen . V-VI 2.— orientalis.Goldgelbe,glänz.wachsart.Blum. VIII-IX 2.— paniculata. Sehr reichbl., weiß, wohlriech. VIII-X 2.— tangutica. Mit gesiedertem Blattwerk und gelben Blumen VIII-IX 2.— vitalba. Hochrankend, grünlichweiß blühend, zottige Samenstände VIII-VIII 2.— viticella. Kleinblumig, blaublühend VII-VIII 2.— 	Polygonum, Schlingknöterich, Polygonaceae O-D — Auberti. Sehr schnellwachsend und gut belaubt, mit langen weißen Rispen. Außerordentl. reichblühend, rankt windenartig ohne Nachhife . VII-X 1.20 — baldschuanicum. Aehnlich der vorigen, jedoch mit rosaweißen Blütenrispen VII-IX 2.— — multiflorum. Mit samtart. Bel. u. weiß. Blüt. VIII-IX 1.50 Rubus, Brombeere, Rosaceae O-D — Henryi. Blätter drei- bis fünffach gefingert, oberseits dunkelgrün, unterseits weißfilzig. Beeren schwarz 2.— — fruticosus laciniatus. Geschlitztblättr. Beeren schwarz 1.— — Theodor Reimers, Siehe Obst.
Hedera, Efeu, Araliaceae D- # — colchica. Mit riesigem, rundlichem Blattwerk, sehr starkwüchsig	- mumjuga. Sent lange nentrate Diacent dates

Rosen

Aus den verschiedenen Klassen führen wir nur die allerbesten, älte-
reren und die bewährtesten neuen Sorten auf, die sich durch Schon-
heit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit aus
zeichnen Beim Pflanzen schneide man die Triebe um 2/3 ihrer
Länge zurück. Pflanzweite der Buschrosen im Mittel 40 cm.
Man and I was a

zeichnen. — Beim Pflanzen schneide man die Triebe um ² / ₃ ihrer Länge zurück. Pflanzweite der Buschrosen im Mittel 40 cm.
Sämtliche Preise verstehen sich für Pflanzen I. Wahl.
Von sämtlichen Sorten sind Stammrosen lieferbar. Es kosten: Hochstämme, 110—140 cm hoch per Stück RM 1.80
Sorten die mit Neu bezeichnet sind
Halbstämme, 80–100 cm hoch , , 1.50 Sorten die mit Neu bezeichnet sind , 1.80
Sorten die mit Neu bezeichnet sind
Polyantha-Rosen. Vielblumige Zwergrosen.
Aennchen Müller. Leuchtend korallenrosa, mäßig gefüllt. 0.50
Dr. Kater. Tiefsamtigdunkelrot
Else Poulsen. Leuchtend rosa, groß, schalenförmig 0.60
Eva Teschendorff, Reinweiß, in großen Dolden blijhend 060
Frau Astrid Späth. Leuchtend korallenrosa 0.70 Frau Marie Bromme. Leuchtend rot 0.60
Gloria Mundi. Feurigorange, sehr große Dolden 0.70
Gruß an Aachen. Goldgelb bis weiß, rötl. schattiert, gefüllt 0.60
Joseph Guy. Leuchtend scharlachrot, sehr gute Sorte 0.60 Kirsten Poulsen. Feurigpurpurrot, einfachblüh., großblum. 0.60
Locarno. Zinnoberorangerot mit dunkelrot 0.60
Orléans. Geraniumrot, Mitte weiß, großdoldig 0.50
Rodhätte. Leuchtend rot, halbgefüllt, großdoldig 0.50
Schlingrosen. Reichblühend und Meltaufrei. Albéric Barbier. Milchweiß, Mitte gelb, gefüllt 0.75
American Pillar. Reinrosenrot mit weißer Mitte, einfach . 0.75
Dorothy Perkins. Kirschrosa, gefüllt, sehr reichblühend . 0.75
Excelsa. Leuchtend dunkelblutrot, gefüllt, großdoldig 0.75 Fragezeichen. Sattrosa, gefüllt, großblumig u. großdoldig 0.75
Fraulein Octavia Hesse. Gelblichweiß, großblumig 0.75
Goldfinsh. Hellgelbe Tausendschön
Lady Gay. Kirschrosa, großdoldig 0.75 New Dawn. Edelrosenähnlich, zartrosa, langblühend 1.—
Pauls Scarlet Climber. Feurigscharlachrot, halbgefüllt . 1.
Purpurtraum. Dunkelpurpur, halbgefüllt, großdoldig
Rubin. Rubinrot, lockere Dolden 0.75 Sodenia. Karminrot, großdoldig 0.75
Lausendschön, Zartrosa, großdoldig, halbgefüllt 075
Veilchenblau, Rötlichlila bis stahlblau, halbgefüllt 0.75
White Dorothy. Weiß, gefüllt, großdoldig 0.75
Edel-Wildrosen. Einwinterung nicht erforderlich. centifolia muscosa. Moosrose. Kräftig rosa 0.70
- Rose des Peintres. Moosrose. Großblumig, rosa 0.70
Giraldii. Rosarot. Große, lange Früchte
lutea bicolor. Außen gelb, innen kapuzinerrot. Einfach . 1.— Parkfeuer. Einfach, feurigrot
- Persian Yellow. Reingelb, gut gefüllt 1
microphylla. Weiße, einf. Blumen, große stachel. Früchte 1
Moyesii. Einfach, dunkelrot. Sehr schön 1.20 pimpinellifolia hispida. Rahmweiß mit gelben Staubfäden 0.80
rubiginosa. Schottische Zaunrose. Hellrosa. Gut f. Hecken 0.50
Anne of Gierstein. Dunkelkarmoisin
Lady Penzance. Einfach, kupfriggelb 0.70 Lord Penzance. Rehfarbig mit goldgelben Staubfäden 0.70
rugosa. Einfache, rote Blüten, große Früchte 0.50
Bergers Erfolg. Einfach, leuchtend rot. Reichblühend 0.80 Blanche double de Coubert, Reinweiß, halbref, duft 0.70
Blanche double de Coubert. Reinweiß, halbgef., duft. 0.70 Carmen. Dunkelblutrot, einfach, reichblühend 0.70
Conrad Ferd. Meyer. Centifolienrosa, gefüllt 0.70
- Georges Cain. Amarantrot, gefüllt, stark duftend 0.70
 Kaiserin des Nordens. Violettpurpur, gefüllt, duftend 0.70 Mme. Georges Bruant. Weiß, gefüllt, duftend 0.70
- Parfum de l'Hay. Karminkirschrot, gefüllt 0.80
Roseraie de l'Hay. Dunkelrot, gefüllt, duftend 0.80
Schneelicht. Reinweiß, einfach, reichblühend 0.70 sericea pteracantha. Reinweiß. Große, breite, rote Stacheln 1.—
Webbiana. Einfache rosa Blüten in großen Büscheln 0.80
Willmottiae. Weiß. Silbergrau berindet. Zierliche Belaub. 1.—

Buschroson

	Buschrosen	
	Eine Auswahl der schönsten und dankbarsten Sort	on
		1 St.
	für Gruppen und Schnitt.	RM
	Ambassador. Kräftigorange. Neu	0.70
	Amulett. Mittelgroß, leuchtend dunkelrot, gut gefüllt. Neu	0.70
	Angele Pernet. Rötlichorange, chromgelb schattiert	0.50
	Barcelona. Außen karminrot, innen samtigdunkelrot. Neu	0.70
	Comtesse Vandal. Kupferrot bis rosa. Sehr große Blum. Neu	0.70
)	Dame Edith Helen. Leuchtend reinrosa. Sehr stark gefüllt	0.50
)	Eduard Schill. Ziegelbraunrot. Gut gefüllt, wetterfest. Neu	0.70
)	Etoile de Holland. Große, dunkelrote Blumen. Reichblüh.	0.50
	Fascination. Kirschrot, gelb schattiert. Dauerblüher	0.60
	Florex. Salmfarbigkorallenrot, karminorange schattiert .	0.60
	Fontanelle, Gelb mit dunklerer Mitte. Schön gesormt	0.60
	Frau Karl Druschki. Reinweiß. Großblumig	0.50
	Frau Luise Lindecke. Kirschrot bis dunkelrot	0.60
	Gaiety. Zinnoberorange in altrosa übergehend. Reichblüh.	0.60
	Geheimrat Duisberg. Reinzitronengelb, groß und edel. Neu	0.70
	Golden Emblem. Sonnengelb mit scharlachkarmin Streifen Grenoble. Glänzendscharlachrot. Großblumig, gut geformt.	0.50
	Neu	0.70
	Hadley Rose. Dunkelscharlachrot, schwarz schattiert	0.70
	Heinrich Wendland. Leucht. goldgelb, innen kapuzinerrot	0.30
	Hinrich Gaede. Kupferrot m. orangegelb. Dichtgefüllt. Neu	0.70
Ì	Hermann Neuhoff. Dunkelrot	0.60
	Johanna Hill. Reingelb mit dunkler Mitte	0.60
	Johanniszauber. Dunkelsamtrot. Gut gefüllt	0.50
П	John Henry. Glänzendrosa. Edle Form	0.50
-1	Julien Potin. Chromgelb, gut gefüllt	0.50
	Königin Luise. Reinweiß. Gut gefüllt	0.60
	Laurent Carle. Großblumig, glänzenscharlachkarmin	0.50
	Lord Charlemont. Leuchtend kirschrot. Gut geformt	0.50
	Los Angeles. Glänzendrosigfeuerrot, goldgelb schattiert.	0.50
	Lilly Jung. Großblumig, tiefgoldgelb	0.60
	Mabel Morse. Großblumig, reingelb	0.50
	Mad. Butterfly. Kupfrigorange. Schr fein	0.50
	Mad. Caroline Testout. Fleischfarbigrosa, gut gefüllt	0.50
	Mad. Edouard Herriot. Krabbenrot mit gelbem Grund .	0.50
	Mad. Jules Bouché. Weiß, Mitte hellrosa, gut gefüllt	0.50
	Marcia Stanhope. Weiß, gute Form	0.50
	Mälar Rose. Leuchtend scharlachrot. Gut duftend. Neu	0.70
	Margret Mc. Gredy. Orangescharlach, sehr große Blumen	0.70
	Mary Hart. Samtigblutrot, elegante Form. Neu	0.70
	Max Krause. Rötlichorange, gut gefüllt	0.50
	Mevrouw G. A. van Rossem. Dunkelorangegelb mit apri-	
	kosentarben	0.50
- !	Mrs. Charles Russel. Karminrosarot	0.50
	Mrs. Henry Morse. Glänzendrosa mit roter Schattierung	0.50
	Mrs. Henry Winnet. Gut gefüllt, leuchtend scharlachrot	0.50
	Ophelia. Lachsfleischfarbig mit rosa	0.50
	Pink Pearl. Lebhaftrosa bis rot auf gelblichem Grund. Pius XI. Rahmweiß, großblütig, gut gefüllt.	0.50
	Portadown. Karmesinrot mit Purpurschein. Prachtvoll	0.50
	Président Herbert Hoover. Orangerosa bis kupferrot. Neu	0.00
	Prinz Felix v. Luxembourg. Samtigpurpur. Großblum. Neu	0.70
	Rapture. Korallenfarbig mit rosagelb untermischt	0.70
	Rev. Page Roberts. Goldorange, reichblijhend	0.50
1	Roselandia, Großblumig, goldgelb, gut duftend	0.50
	Roslyn. Reingoldgelb. Schr gesund. Neu	0.70
	Senator. Granzendscharlachrot, gut duttend	0.50
	Souvenir de Claudius Pernet. Goldgelb, edle Form	0.50
	Douvelli de 11.A. verschuren. Orangegelb gut auf let	0.50
	Sunkist. Leonartkupirigorange. Neu	0.70
	Tanonian. Ruplet init rosa Hauch, Jehr schön	060
	vierlanden. Orangerosa, Schr gut. Neu	0.70
	Viktoria Ademeta, Goldgelb, leurigbraunrotherandet N	0.70
	Ville de Paris. Goldgelb, sehr großblumig	0.50
	W. E. Chaplin. Dunkelkarmesinrot, großblumig Westfield Star. Atlasweiß bis schwefelgelb Wilhalm Brander Bränglich	0.60
	Whitein Dieeuel, Didumichockergeb orange-4 1 11.	0 -0
	Wilhelm Kordes. Kapuzinerrot auf goldgelbem Grund .	0.70
	Boungerbein Grund .	0.50

Obst

Fruchtgehölze — Beerenobst — Rhabarber

Unsere sämtlichen Obstgehölze sind vorzüglich bewurzelt und wachsen daher überall leicht an. Zum Versand gelangen nur Pslanzen I. Güteklasse.

Aepfel und Birnen	1 St. RM
Hochstämme, 7-8 cm Umfang	2.20
Halbstämme, 6-7 " "	2.—
	2.—
, 3-4 ,	2.50
	2.50
	3.50
Spaliere mit 1 Etage	2.50
, 2 ,	3.50
U-Formen 2-3 jährig	
3 4 ,	
	2.—
, 3-4 ,	
" waagr. 2-3 " 1 arm.	
» 3—4 " 1 "	
, 2-3 , 2 ,	
, 3-4 , 2 ,	3.—

Aepfel

Im Sommer reifende Sorten:

Charlamowsky. Leuchtend rot Weißer Klarapfel. Hellgelb mittelgroß

Im Herbst reifende Sorten: Apfel aus Croncels. Hellgrün, groß Gravensteiner. Gelb, rot gestreift Jakob Lebel. Gelblichgriin

Im Winter reifend:

Gelber Bellesleur. Reingelb, sein Kalvill, Adersleber. Gelbe gerippte Frucht Ontario. Große gerötete Frucht Prinzenapfel. Grüngelb, groß

Renette, Ananas. Goldgelb, mittelgroß

— Baumanns. Dunkelrot, mittelgroß Champagner. Wachsgelb, mittelgroß Cox Orange. Mittelgroß, vorzüglich - Gold- v. Blenheim. Goldgelb mit rot

- graue französische. Mittelgroß, grau - Harberts. Hellgelb, rot gestreift - Landsberger. Gelb, leicht gerötet

von Zuccalmaglio. Hellgelb Schöner von Boskoop. Goldgelb mit rot Winter-Goldparmäne.Goldgelb,rot gestr. Winter-Rambour. Karmoisinüberzogen

Birnen

Im Sommerreisende Sorten: Bunte Juli. Sehr fein Clapps Liebling. Gelb, sonnenwärts rot

Frühe aus Trevoux. Gelb, groß, würzig Williams Christbirne. Hellgelb, groß

Im Herbstreifende Sorten: Alexander Lucas. Gelb, rostig punktiert Boscs Flaschenbirne. Groß, goldart. berost. Gellerts Butterbirne. Grünlichgelb Köstliche v. Charneu. Grünlichgelb, mittel Mollebusch. Gute Tafelsorte Vereins-Dechantsbirne. Hellgelb, rotback.

Im Winterreifende Sorten: Clairgeaus Butterbirne. Feine Frucht Comtesse de Paris. Grünlichgelb, punkt.

Josephine v. Mecheln. Mittelgroß, für rauhe Lage Esperens Bergamotte. Gelblichgrün, süß

Madame Verté. Mittelgroß, gelb Präsident Drouard. Groß, gelb, fein punkt.

Kirschen, Pflaumen u. Zwets	ch	en 1 St.
Hochstämme, 7-8 cm Umfang		. 2.20
Halbstämme, 6-7 cm Umfang		. 2.—
Büsche 2-3 jährig		. 2.—
Spaliere 1 Etage		. 2.—
Spaliere 2 Etagen		. 2.50
Pfirsiche und Aprikosen		
Hochstämme		. 4.—
Halbstämme		
Büsche, veredelt		
Spaliere		. 3.50
Walnüsse und Quitten		
Hochstämme		. 3.50

Kirschen

Süßkirschen:

Bernhard Nette. Schwarz, festfleischig Dönissens Gelbe. Vorzügl. Einmachfr. Große schwarze Knorpelk. Schwarzbr. Große Prinzessink. Gelb m. rot, herzförm. Hedelfinger Riesen. Schwarzrot, herzf. Kassins Frühe. Schwarzrot, reichtrag. Rotterts Braune. Gute Frühsorte

Büsche 2.—

Sauerkirschen:

Königin Hortensia. Groß, glänzendrot Große lange Loth. Leuchtend dunkelrot Ludwigs Frühe. Hellrot

Anna Späth. Groß. rötlichblau, früh Frühe Fruchtbare. Sehr früh, blau Königin Viktoria. Violettrot, sehr groß Ontario. Sehr groß, goldgelb Washington. Groß, gelb, saftreich

Bühler Frühzw. Dunkelblau, mittelgroß Hauszwetsche. Groß, schwarzblau Ruth Gerstetter. Tiefblau, sehr früh Lützelsachsener Frühzw. Blau, mittelgr. Wangenheims Frühzwetsche.

Mittelgroß, schwarzblau

Mirabellen (Preis wie Pflaumen) Flotows frühe Mirabelle. Leuchtend gelb Metzer Mirabelle. Klein, gelb Mirabelle von Nancy. Mittelgroß, gelb

Reineclauden (Preis wie Pflaumen) Große grüne Reineclaude. Sehr süß Von Oullins. Groß, gelb

Pfirsiche

Amsden. Früh, groß, weißlichgelb Eiserner Kanzler. Mittelfrüh, sehr gut Königin der Obstgärten. Sehr großfr. Mayflower. Früh, mittelgroß, gelb mit rot RoteMagdalene.Mittelfr.,gelbm.dunkelr. Proskauer. Spät, braunrot, sehr gut

Aprikosen

Ambrosia. Mittelgroß, dunkelgelb Aprikose von Nancy.Rot gefärbt, mittelfr. Luizets Aprikose. Orange, früh

Apfelquitte. Apfelförmig, mittelgroß Riesenquitte von Vranje. Riesenfrüchtige, ungeheuer reichtragend. Birnenquitte. Durchschnittl. 1 kg schwere Früchte. Sehr widerstandsfähig u. frühreifend.

1 St ##
Himbeeren, ältere Sorten 0.20
neue Sorten 0.40
Brombeeren 0.50
Johannisbeeren, rotfrücht. Sort.
5-8 Triebe 0.40
" schwarz u. weißfrüchtige Sort.
5-8 Triebe 0.50
Stachelbeeren 5-8 Triebe 0.55
Stachelbeer- u. Johannisbeer-
Hochstämme 1.20
Haselnüsse 1.20
Erdbeeren 0.05
Rhabarber, ältere Sorten 0.50
" neue Sorten 1.—

Himbeeren

Deutschland. Rotfrüchtig, sehr ertragreich. Neu Gelbe Antwerpener. Gelbfrüchtig Lloyd George, Großfr., reichtragend. Neu Preußen. Groß, süß, hellrot. Neu Shaffers Colossal. Dunkelrot

Brombeeren

Wilsons Frühe. Aufrechtwachsend, tiefschwarz

Theodor Reimers. Rankend, riesenfrücht.

Johannisbeeren

Fays Fruchtbare. Rot Heros. Großfrüchtige Neuheit, rotfr. Langtraubige Rote Goliath. Schwarzfrüchtig Rote Holländische Rote Kirsch Weiße Holländische

Stachelbeeren

Gelbe Riesen. Große gelbe Beeren Grüne Riesen. Grüne Früchte Gelbe Triumphbeere. Gelbfrüchtig Hönings früheste. Gelb Maiherzog. Rotfrüchtig Rote Triumphbeere. Rotfrüchtig Weiße Triumphbeere. Weißfrüchtig

Haselnüsse

Hallesche Riesennuß. Kugelig-kegelförm. Ludolfs Zellernuß. Groß, oval Webbs Preisnuß. Langoval, groß Weißfrüchtige Lambertnuß. Eiförmig Wunder von Bollweiler. Kegelförmig

Erdbeeren

Deutsch Evern. Bewährte Frühsorte Flandern. Sehr reichtragend Mme. Moutôt. Riesenfrüchtig Oberschlesien. Spät, groß, süß Sieger. Reich- und frühtragend Schwarze Ananas. Dunkelrot, fein Rügen. Monatserdbeere, rankenlos. Sehr reichtragend. Bringt bis in d. Herbst hinein Früchte.

Rhabarber

The Sutton. Blutrot, zuckersüß, reichtr. Neu Dawes Challenge. Aehnlich vorigem Cyclop. Sehr dickstielig Queen Victoria. "Verbesserter", sehr fein Holsteiner Blut. Rotstielig. Neu Loher Blut. Rotfleischige Stiele. Neu

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Beschreibung der einzelnen Sorten siehe bei Staudenpflanzen. Jeder Samenbestellung wird auf Wunsch Kulturanweisung beigelegt.

Außer den hier aufgeführten Sämereien, haben wir von fast allen im Katalog verzeichneten Perennen und Farnen kleinere Mengen Samen geerntet. Preis pro ½ Gramm PM 0.40.

Jedes auf Seite 5-8 verzeichnete Staudensortiment ist auch als Samensortiment lieferbar. Es kosten 100 g in 34 Sorten RM 25.—. Ab 25 g wird der 100 g-Preis berechnet.

Von Samen, die pro Gramm 40 Pfg. und mehr kosten, wird auch 1/2 Gramm abgegeben.

Bei Abnahme von 5 g u. mehr einer Sorte ermäßigt sich der 1 g-Preis um 10 %, bei Abnahme von 25 g u. mehr einer Sorte um 20 %

Bei Abnahme von 5 g u. mehr einer Sorte ermäßigt sich der 1 g-Preis um 10 %, bei Abnahme von 25 g u. mehr einer Sorte um 20 %.					
1 Gramm RM	1 g RM	1	18		
Acaena fissistipula violacea 0.50	Aquilegia coerulea hybr	Astilha Thunhana daliasta 07	RM RM		
glaucophylla 0.50	(haylodgensis) 0.40	Astilbe Thunberg, delicata 0.7	01 0 1		
— inermis	vulgaris hybr 0.20	—— elegans	0.30		
microphyna 0.50	— — II. pl 0.40	I — Moerheimii 06	0 - maximum E: - 000		
- novae zealandiae 0.50	— nivea grdfl 0.30	Astrantia carniolica rosea 0.4	O — Gruppenstolz 0.20		
Acanthus longifolius . 0.10	Traditions of the control of the con	major	0 — H. v. Grüter 0.20		
Achillea ageratifolia 0.40		1	— Juwel 0.20		
— aurea 0.60 — mill. Kelwayi 0.60		— graeca superba 0.8	— Mayfield Giant 0.30 — Non plus ultra 0.30		
- Crimson Beauty . 0.60	Trimeria hybr. Bees Ruby 0.00	- feinste Mischung 0.8	- Opholia 030		
— macedonica 0.40	- formosa splendens 0.50 - majellensis 0.80	Avena sempervirens 0.4	- Neue Spielart, gem. 0.25		
— pseudopectinata 0.50	— maritima 0.60	Bahia lanata 0.5	0 — uliginosum 0.50		
Aconitum Fischeri var.	- alba	Brunella grandiflora alba 0.4	Chrysopsis vill. Rutteri . 0.50		
Wilsonii 0.50	- Laucheana . 060	—— rosea 0.4	0 0		
- lycoct. pyrenaicum 0.50	— rosea comp 0.60	— Webbiana 0.4	(dahur.) 1.—		
— napellus 0.40 — album 0.50					
— carneum 0.50	Trimea ampiexicauris 0.00		Ciematis integrinona 0.00		
= praecox 0.40	Aruncus silvester 0.50	Calimeris integrifolia 0.3			
- Stoerkianum 0.40		Campanula abietina 0.5	Branch Branch		
Actaea spicata 0.40	Asclepias purpurea 0.30	- alliariaefolia 0.3			
Adenophora Bulleyana . 0.50	Asphodeline lutea 0.30	— carpathica 0.2	O - Golden Queen . 0.30		
— polymorpha 0.30	Asparagus filicinus 1.—	— minor 0.3	0 — Perrys Var 0.30 — verticillata 0.60		
Aethionema pulchellum . 0.80	Aster alpinus 0.50	———— alba			
Ajuga rept. fol. multicolor 0.40	— albus 0.60	— — Isabell 0.3	Corydalis cheilanthifolia . 1.50		
Alisma plantago 0.40	hall water built of to	— — Riverslea 0.4 — — turbinata 0.4	odroleuca		
- lancifolium 0.50	d. ddirkcibiati . 0.40	— turbinata 0.4 — White Star 0.3	Crambe cordifolia 0.30		
Allium cyaneum 0.60	- Prachtmischung 0.30	- glomerata acaulis 0.8			
— flavum 0.60	Neuheiten Mischung 0.50	— dahurica 05			
— pulchellum 0.40	— dipl. Leichtlinii 0.40	superba 06	Cyclamen cilicicum 2.—		
speciosum 0.50 tibeticum 0.50		— grandis 0.6	— coum 2.— europaeum 2.—		
Althaea (Malve) ficifolia . 0.10		= - alba 0.6	neapolitanum 2.		
rosea fl. pl.	= novae angl. rosa. rof.	0.1kg	repandum 2.—		
in Farben sortiert 0.15	hell- und dunkelblau . 0.40	— pers. Backhousei 1.2	Cyperus carexioides 0.70		
Prachtmischung . 0.15					
Alyssum argenteum 0.30	sortiert 0.40	— punctata 0.8	Datisca cannahina 060		
saxatile 0.20	in Prachtmischer 030	pusma	Diri		
— compactum 0.20	gefülltblübende	— alba 5	17 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
— citrinum 0.60 — sulphureum 0.60	' D 1, ' 1 0,40	— — Seiberti ` 6 — rhomboidalis 0.8	- feinste Mischung . 0.30		
serpyllifolium 0.60	- stofficus	— rotundifolia superba . 1.5	- Mischung gefüllt-		
Anchusa ital. Dropmore . 0.20	- subcoeruleus 0.30	Centaurea montana grdfl. 0.4	Dluhender Sorten . 0.40		
Anemone albicyanea 0.50	—— lucidus 0.40	—— alba 0.4	O — Neuheiten Prachtm. 0.80 — Belladonna grdfl.		
— baldensis 0.50	- Wartburgstern . 0.60	Centranthus ruber 0.2			
— Halleri 0.70	Autilha Anandaii Claria 080	— — albus 0.3			
— japonica in Farb. sort. 0.60	— Granat 0.90	—— coccineus 0.3	grandifl. chin. cinerarea 0.20		
Levillei 0.60 pulsatilla 0.50	Hyacinth 0.80	Cephalaria tatarica 0.2	Tom Thumb 030		
rivularis 0.40	Wellse Gloria 0.00	Cerastium Biebersteinii . 0.1	Dianthus arenarius 0.30		
— silvestris 0.50	— in Farben sortiert . 0.70 — Prachtmischung 0.50	tomentosum 0.5	caesius hybr 0.50		
Anthemis Kelwayi 0.15	— Neuheiten Mischung 1.—	— — candidissimum 0,4	compactus 0.50		
tinct. Perrys var 0.30	— japonica. Treibsorten	— — Columnae 0.6	— lilacinus 0.50 — deltoides 0.30		
Anthyllis vuln. rubrifol 0.10	in Farben sortiert 0.70	Chelone obliqua 0.4	OI = - albus		
Aquilegia dirysantha 0.30	— Davidii 0.80	— alba 0.5	0 — Brillant 0.40		

Del Honarinie von og und mem er	and control of many general art is govern		0
*			
1 Gramm	1 g RM	1	g M
P.M.	Cantiana dalauriaa 030	Hypericum polyphyllum	Lupinuspolyph.fein.Misch. 0.20
Dianthus deltoid, spiend 0.30	Gentiana danurica 0.30	Hypericum potyphyrium . C.	20 — Neuheiten Prachtm. 0.30
graniticus 0.50	— decumbers 0.30	allows	Lydnis dalcedonica . 0.15
- Knappii 0.50	depressa	Harmon and the second of the s	50 Lyaims dialogaistachus 040
— macrodemus 0.40	Freymana 2.—	Trumulus lupulus aureus . O.	Lysimachia longistachys . 0.40 Lythrum Crimson Dwarf 0.30
— pelvitormis 0.50	- Resselringii , 0.50	Theris semp. Schneenocke. O.	50 Lythrum Crimson Dwart 0.30
plumarius hybr 0.40	- lutea	Incarvillea Delavayi O.	Lady Sackville 0.20
scoticus 0.30	- phlogitolia 0.50	grandiflora	— salic. roseum superbum 0.20 — Malva moschata 0.10
— pruinosus 0.40	- septemfida 2	- brevipes 1.	Maiva mosmata 0.10
- sanguineus 0.40	- lagodechiana 2	- hybr. Bees Pink 1.	Mimulus Fremonti 0.40
— vaginatus atrorubens . 0.30	— thianshanica 0.50	Inula ensitolia	50 — hybr. Burnetti 0.50
Dictamnus fraxinella 0.40	— tibetica 0.30	— glandulosa O.	80 — Leopard 0.50 20 — Netzfalter 0.80
Digitalis ambigua 0.20	Geranium Endressii 0.40	macrocephala O.	20 - Netzlalter 0.80
ferruginea 0.20	I — macrorrhizum 0.50	Iris Delavavi	30 Postillon 0.00
— gloxiniaeflora purpurea 0.20	Geum Borisii 0.60	— germanica hybr 0.	50 — Schmetterling 0.80
Doronicum Clusii 1.80	- diloones	- Kaemufari hybr	501 — Lensdorffii 0.40
- cordifol. (Columnae) . 3	Mrs. Bradshaw 0.30	— orientalis O.S	20 — luteus 0.20
— — Mrs. Masson 3.—	— coccineum (sibiricum) 0.30	Schneekönigin O.	20 — alpinus 0.30
Dracocephal, Ruyschianum 0.30	— mont. Heldreichii magn. 0.50	- pumila hybr. Prachtm. O.	30 Minuartia aizoides 0.50
—— japonicum 0.40	splendens 1.—	— sibirica	20 — laricifolia 0.50
Dryas octopetala 120	- hybr. Goldball 0.60	superba 0.	20 — laricifolia 0.50 20 Miscanthus sinensis zebrin. 0.20
= = lanata 1.60	- rivale Leonbards var 0.60	- alba	20 — saccharifer (Imperata) 0.20
- Siindermannii 1.50	Globularia trichosantha . 0.60	- Perrys blue O.	20 Mochringia muscosa 1.—
Edinana hannations 0.10	= vulgarie (nudicaula) 0.60	- Strandperle	20 Monarda did. Cambr. Scarl. 0.40
- humilia 0.00	Wilkommii 0.50	- versicolor	20 — Kalmiana 0.30
0.10	Gymanhila angiena	- Wilconii	750 — magnifica 0.30
niveus	Sypsophila pacifica 0.50	vv iisonii	80 - violeges apperla 0.30
- ritro	paniculata 0.20	Jasione numilis	80 — violacea superba . 0.30 40 Morina longifolia 0.70
Elymus giganteus 0.40	—— H. pl 0.50	perennis ,	Morina longitoria 0.70
Epilobium Hectori 1.—	repens Purpusii 0.50	Kniphofia corallina 0.	Mulgedium alpinum 0.30
Eremurus himalaicus 0.50	— — rosea 0.40	— elegans multicolor O.	Myosotis pal.
— robustus 0.60	Helenium autumn. Chipper-	gracilis Goldelse 0.	Graf Waldersee 0.40
Erica vagans 2.—	field Orange 1.—	— hybr 0.	40 — Perle v. Ronneberg 0.50
— — rubra 2.—	— gaillardiaeflorum . 0.80	— hybr. Expreß 0.	20 Nepeta macrantha 0.20
— — alba 2.—	- Gartensonne 0.80	— — Tudkii 0.	20 — Mussinii superba 0.50
stricta	— — H. Marschall 1.20	— Solfatere 0.	20 — Mussinii superba 0.50 50 — nervosa 0.60
Erigeron aurantiacus 1.20	— rubrum superbum . 1.—	— uvaria grandiflora 0.	40 Oenothera fruticosa major 0.20
= speciosus roseus 0.80	— Bigelovii 0.50	- feinste Mischung 0.	20 — Youngii 0.30
= semiplenus 0.40	- Hoopesii 0.20	Lathyrus latifolius 0.	10 — glauca (glabra) 0.50
superbus grdfl 0.30	Helianthemum hybr. i. Sort. 0.30	= - albus 0.	20 — Fraseri : . 0.40
Fringe alrique	- Prachtmischung 020	= vernus 0	40 — linearis 0.50
- albus	- colondiaum 0.40	Layandula vera	40 — linearis 0.50 20 — missouriensis 0.40
De Hähale 3	Halianthus Nuttallii 0.50	- Dwarf blue	30 — pumila (pusilla) 0.70
			30 Opuntia camanchica 0.50
Established as seniteran 0.50	H-linnin floribunda som 0.30	Lagrandium alvinum 2	— — albispina 0.50
Eriophyllum caespitosum 0.50	Tienopsis noribunda comp. 0.30	Leontopodium aipinum . 2.	arbispina 0.50
Eryngium alpinum superb. 0.30	— laevis Pitcheriana 0.20	Lepachys pinnata	$40 - \text{major} \dots \dots$
- hybr. Juwel 0.40	— scabra gratissima 0.20	Liatris callilepis	50 — orbicularis 0.50
— Violetta 0.40	- major 0.20	graminifolia 0.	60 — pallida 0.50
— maritimum 0.6	O zinniaeflora 0.30	- pycnostachya 0.	80 — salmonea 0.50
— Oliverianum superbum 0.5	Helleborus niger 0.30	— spicata 0.	40 — cymodila 0.50
— planum 0.10	0 — foetidus 0.40	Linaria alpina 3.	— — grandiflora Engelm. Neu 0.70
— — argenteum 0.3	Hemerocallis flava 0.40	= rosea 5	— humifusa
— — Blauer Zwerg 0.3	— in Sorten 0.40	— cymbalaria compacta . O	40 (Rafinesquiana) 0.50
_ yuccaefolium. Neu 1	- Prachtmischung 0.30	macedonica 0	40 (Rafinesquiana) 0.50 30 — arcansana 0.50
Eupatorium ageratoides . 0.3	O Heracleum villos. (gigant.) 0.20	Lindelofia longiflora 0	40 — pachyclada 0.50
— Fraseri 0.3	Heucherasanguineasplend. 1.50	Linum austriacum 0	20 — polyacantha 0.50 30 — albispina 0.50
Euphorbia epithymoides	- hybr. Feuerrispe 1.50	= capitatum 0	30 — albispina 0.50
(polychroma) 1.2	0 — Frühlicht 1.—	- flavum	30 — spirocentra 0.50
— myrsinites 0.5	Prachtmischung 1	- narbonnense O	30 — Watsonii 0.50
Feetuca glacialis 0.3	O Hieracium aurantiacum . 0.30	— perenne O	20 - rhodantha 0.50
- glavea 0.3	0 = rubrum 0.40		20 — rhodantha 0.50 20 — sphaeracantha major . 0.50
	Ol — villosum	I obelia gospulsa	30 — utahensis J.A. Purp. Neu 0.70
- Ovina	Ol Hamminum pupanaigum - 0.80	I unique polyub albus	20 xanthostemma elegans 0.50
- punctaria	Hosto Fortunai alamana 0.10	Barran C	40 - orbigularia New 0.70
- scoparia (crinum ursi) 0.3	o l'iosta Fortunei giaucesc. 0.40	Bayern	40 — orbicularis. Neu . 0.70
			.40 — rosea 0.50
Rohdorfer hybr 0.2	ovata (coerulea) 0.40	— Downers Pink Pearls 0	30 — Prachtmischung 0.40
— — regalis 0.5	0 — Sieboldii 0.50	$O = Golderest \dots O$.40 Paconia albiflora (sinensis) 0.20 .20 Papaver alpinum 1.—
— nana Kolibri 0.6	0 Hutchinsia Auerswaldii . 1.—	– – Harkneß hybr 0	.20 Papaver alpinum 1.—
Galtonia candicans 0.2	O Hypericum calveinum 0.50	— Moerheimii 0	.30 — nudicaule feinste Misch. 0.30
Galega offic. Hartlandii . 0.1	0 — Degenii 0.40	Nelly $$ 0	.30 — roseum hybr 030
Genista tinctoria 0.5	0 fragile 0.70	- Prinzeß Juliane 0	.30 — Sunbeam 0.30
Gentiana acaulis 0.5	0 — lysimachioides 0.70	— roseus "	.20 - orientale, hell-u. dklrot 0.30
- asclepiadea 0.3	O Hypericum olympicum 0.86	Ruby King C	.30 — weiß, rosa u. lachs . 0.30
Gentiana cruciata 0.3	0 - pat. var. Henryi 0.70	- Sunshine	.40 - fl. pl. May Queen . 0.40

1 Gramm	1 g RM	1 g RM	1 g RM
Panaver orientale Prachtm 020	Primula pulverulenta 0.80	Sedum aizoon minor 0.80	Thalictrum dipterocarpum 0.50
—, rupifragum 0.30	— pubescens (auricula) . 1.—	— album 0.60	— glaucum 0.30
Paradisea lilastr.giganteum 0.40	— rosea grandifl 1.— Pulmonaria rubra 0.40	— — murale 0.80	- minus adiantifolium . 0.40
Pennisetum compressum . 0.30	Pulmonaria rubra 0.40	— ellacombianum 0.60	Thermopsis fabacea 0.40
Pentastemon barbatus	Pyrethrum corymbos. hybr. 1.—	— floriferum 0.60	Thymus montanus 0.80
hybr 0.30	- roseum hybr. einfachbl.	— praecox 0.00	- rotundifol. Purpurtepp. 1
— coccineus 0.20	in Farben sort. 0.40 — — gefülltbl. in Farb. sortiert 1.—	Forsterianum 0.00	- serpyllum carneus 0.00
= bybr Anderk on Hebr 0.40	genulitation farb.	- hybridum edit 0.00	Tiarella americana 050
— Andenk an Purpus 0.60	— — Prachtmischung 0.30	—— fol var 0.70	Tradescantia virginiana . 0.40
— Gärtneri 0.50	Ranunculus gramineus . 0.40	— Laggeri 0.60	Trollius hybr. Earliest of All 0.80
— laevigata digitalis 0.20	Rheum emodii 0.20	- Middendorffianum 0.70	— — Feuertroll 1.—
- Menziesii Scouleri 0.60	- palmatum tanguticum 0.20	— — diffusum 0.70	— — Goliath 1.—
— pubescens 0.20	— (Rhabarb.) The Sutton 0.20	— reflexum 0.60	— — Orangekugel 1.—
pygmaeus 0.30	Rodgersia aesculifolia 2.— — sambucifolia 2.—	— virescens 0.60	— Schwefelglanz !.—
in weiß, rosa, rot,	— sambucitolia 2.— — tabularis 2.—	- rupestre 0.00	— Japonicus fl. pl 1.—
dunkalnat lila blan	Rudbeckia flava 0.20	— saxangulare 0.00	- Golden Queen
violett, sortiert 0.40	— purpurea 0.40	—— album 0.60	— pumilus vunnanensis . 1.—
— nana.	— atropurpurea 0.60	— — splendens 0.80	- Prachtmischung 0.90
Niedere gemischt 0.40	—— Ideal 1.—	Semperv. arachn. tomentos. 3	Tunica saxifraga 0.20
— — feinste Prachtmisch. 0.30	— — Leuchtstern 1.—	— tectorum robustum 3.—	— robusta fl. pl 0.40 Typha angustifolia 0.90
— Neuh. Prachtmisch. 0.40	— nitida Herbstsonne . 0.60	- feinste Mischung 2	Typha angustifolia 0.90
— maculata Alpha 0.40	— speciosa (Neumannii) 0.40	Senecio clivorum 0.20	— latitolia 0.50
- Schneelawine 0.40	Sagina subulata 3.— Sagittaria sagittifolia 0.60	- Orangekonig 0.30	Valeriana ellipricafelia 040
Physolic Franchetii 000	Salvia Lurigiaii 0.60	- Przewalskii 040	Veratrum nigrum 0.60
Bunyardii 0.20	— nemorosa 0.80	— Veitchianus 0.40	Verbascum phoeniceum . 0.20
Physostegia virginiana . 0.30	— pratensis rosea 0.40	— Wilsonianus 0.40	- vernale Mrs. Willmott 0.30
—— alba 0.40	— — superba 0.30	— Neue Spielarten gem 0.30	Veronica Allionii 0.70
Platycodon grdfl. Mariesii 0.30	Santoline pinnata 1,—	Seseli caespitosum 0.50	— fruticulosa 0.50
———— album 0.30	Saponaria ocymoides 0.30	Sesleria coerulea 0.40	— gentianoides 0.60
Poa alpina 0.30	Satureia montana 0.30	Sidalcea hybr. Crims. King 0.30	hybr. Blaukerze 0.50
Polemonium coeruleum	— pygmaea 0.40	- Monarch 0.50	— incana 0.40 — latifolia Königsblau . 0.50
Richardsonii 0.20	—— lutea 0.80	= - Rosy Gem 0.30	—— Shirley blue 0.50
— — album 0.20	— minor 0.80	Scarlet Beauty 0.30	— longifolia 0.20
— — pallidum 0.30	— — robusta 1.—	— — feinste Mischung . 0.30	— orientalis 0.50
—— superbum 0.30	— caespitosa lutescens . 0.80	Silene alpestris 0.40	— repens 0.40
Polygonum bistorta	—— villosa 0.80	- fl. pl 0.50	— spicata alpina 0.40
album grdfl. 0.50	— hybr. magnifica 1.—	— Schafta 0.40	— teucrium 0.50
Potentille ambient	- Purpurmantel . 1.—	Silahium parfaliatum 0.20	— waldsteinia 0.40 — Prachtmischung 0.30
argentea calabra 0.30	- Schneetenpich 0.70	Sisvrinchium anceps 0.40	Viola cornuta alba 0.80
- atrosanguinea 0.30	— — Schwefelblüte . 0.70	— convolutum 0.60	—— Alpha 0.60
- drysocraspeda aurea 0.50	— groenlandica 0.80	- striatum 0.50	— — Altona 1.—
- Honwoodings 0.30	- hypnoides densa 0.80	Solidago aspera 0.30	— Gustav Wermig . 0.80
hybr. Landseer 0.30	— lingulata (Portae) 1.—	- hybr. Frühgold 0.20	— Hansa 0.80 — Lemon Queen . 0.80 — Spafivogel. Neu . 1.—
—— fl. pl. gefülltbl. gem. 0.40	Rhei superba 1.—	— Goldschleier 0.40	Lemon Queen 0.80
nen Miss Will (4 0.30	tellimoides 1.—	- Goldelfe 0.40	— Spanyogel. Neu 1.— — W. H. Woodgate . 0.80
= Royana 0.50	— polsterbild, gemischt . 0.80	— Golden Wings 0.30	gracilis Lord Nelson . 0.80
— pedata 0.40	— rosettenbild. gemischt. 0.80	— — Mimosa 0.40	lutea
Poterium obtusum 0.60	— Prachtmisch. aller Art. 0.70	— — Sonnenschein 0.40	Strold 1.
Primula acaulis Mischung 1.—	Scabiosa australis 0.20	— — Spätgold 0.40	— odorata grandiflora . 0.20
- Beesiana 1	— caucasica alba 0.60	— nemoralis 0.40	— papiloniacea 0.50 Viscaria alpina 1.20
Bulleesiana 0.80	—— Amethyst 0.60	— Shortii 0.20	Viscaria alpina 1.20
Bulleyana 1.—	— Diamant 0.00	Production and Sout 0.40	— viscosa alba grdfl 0.30
denticulata 2.—	— Miss Willmott 060	- Prachtmisch, hoh, Sort, 0.30	Freilandfarne (Reine Sporen)
= = delicata	— perfecta 0.60	Stadiys lanata 0.20	Athyrium filix femina crist. 0.90
= - cachmeriana 4	Prachtkerl 0.80	— grandifl. robusta 0.40	Dryopteris dilatata 1.—
— — Rubin 6.—	Schöne von Eisenach 0.60	Statice auriculaefolium . 0.50	— filix mas Pindari 1.—
— elatior aurea grdfl 1.—	— Prachtmischung 0.50	— globulariaefolium 0.50	— spinulosa 0.80
— gigantea hybr 0.80	— lagodechiana 0.60	— incana pygmaea 0.50	Matteucia struthiopteris . 1.—
— Weißer Schwan . 0.80	- lucida 0.60	Stine gigentee	Onoclea sensibilis 1.—
ianonica bybr Minds 0.50	Scutellaria alpina 0.00	— pennata 0.40	Osmunda cinnamomea 2.— — Claytoniana 2.—
— — alba 0.50	Scirpus Tabernaemont.	Teucrium chamaedrys 0.40	— regalis 2.—
— atrosanguinea C.60	zebrinus 0.50	Thalictrum aquilegifolium 0.30	Phyllitis scolopendrium . 0.90
— leucophylla 0.60	Sedum acre 0.60	— album 0.40	Phyllitis scolopendrium . 0.90
— officinalis 0.50	— aizoon 0.80	—— lilacinum 0.30	Polystichum lobatum 1

Pflanzen-Zusammenstellungen für verschiedene Zwecke.

Wir verweisen auch auf die Sortimente Seite 5-8, sowie auf die Verwendungs- und Standortzeichen bei allen Pflanzengattungen.

Die besten und farbenkräftigsten Stauden für den Liebhabergarten.

Achillea filip. Parkers var., Anemone japonica i.S., Aquilegia i.S., Artemisia vulg. alba, Aster amellus i.S., Aster novi-belgii i.S., Aster novae angliae i.S., Aster subcoeruleus i.S., Aster dumosus i.S., Astilben i.S., Campanula carpathica i.S., Campanula grandis, Campanula latifolia macrantha, Centaurea dealbata, Centranthus i.S., Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum maximum, Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum uliginosum, Cimicifuga i.S., Coreopsis verticillata, Delphinium cultorum i.S., Dicentra spectabilis, Doronicum i.S., Erigeron i.S., Euphorbia epythimoides, Geum i.S., Gypsophila paniculata fl.pl., Helenium i.S., Heliopsis i.S., Hemerocallis i.S., Heudera i.S., Iberis semp. Schneeflocke, Iris interregna, Iris germanica i.S., Liatris i.S., Lupinus polyphyllus i.S., Lychnis chalcedonica, Paeonia albiflora (sinensis) i.S., Monarda i.S., Papaver orientale i.S., Pemtastemon i.S., Phlox Arendsii i.S., Phlox paniculata i.S., Physostegia i.S., Platycodon i.S., Potentilla hybr. i.S., Rudbeckia speciosa, Rudbeckia purpurca, Rudbeckia nitida Herbstsonne, Salvia nemorosa, Sedum fabaria i.S., Senecio i.S., Stachys grdfl. superba, Thalictrum aquilegifolium i.S., Trollius i.S., Verbascum i.S., Viscaria viscosa i.S.

Schwachwachsende Stauden und Gehölze für das Klein-Alpinum.

Stauden: Acantholimon i. S., Allium cyaneum, Allium yunnanensis, Androsace i. S., Anemone albicyanea, Anemone pulsatilla i. S., Asperula hirta, Asperula nitida, Adonis i. S., Aubrietia graeca grdfl., Aubrietia tauricola, Bellium minutum, Campanula garganica, Cotyledon i. S., Cyclamen i. S., Draba i. S. außer D. repens, Dianthus suavis, Dianthus Musalae, Dianthus caesius compactus, Douglasia Vitaliana, Dryas tenella, Erinus i. S., Euphorbia capitulata, Gentiana acaulis, Globularia nana, Hepatica i. S., Houstonia i. S., Hypericum coris, Iberis saxatilis, Iris cristata, Lewisia cotyledon, Linaria alpina, Linaria hepaticaefolia, Mauerfarne, Mentha Requienii, Oenothera pusilla, Papaver alpinum, Potentilla Tonguei, Primula auricula, Primula pruhoniciana Blaukissen und Schneekissen, Primula farinosa, Ramondia i. S., Raoulia australis, Saxifraga (polsterbildende) i. S., Sedum album micranthum, Sempervivum i. S., Silene acaulis i. S., Soldanella i. S., Statice incana pygmaca, Synthyris reniformis.

Gehölze: Calluna vulgaris Foxii, Cotoneaster microphylla glacialis, Daphne cneorum, Evonymus kewensis, Hedera helix

conglomerata, Polygala chamaebuxus, Rhododendron racemosum, Salix reticulata.

Wintergrüne Stauden für Steingarten und Trockenmauern.

Acaena Buchananii, Acaena glauca, Achillea macedonica, Arabis i.S., Armeria i.S., Asperula nitida, Aubrietia i.S., Calluna i.S., Cotula squalida, Dianthus i.S., Draba i.S., Erica i.S., Hutchinsia i.S., Hypericum polyphyllum, Iberis i.S., Paronychia i.S., Sagina subulata, Santoline chamaecyparissus, Saxifraga in moosartigen, polsterbildenden und rosettenbildenden Sorten, Sedum mit einigen Ausnahmen, Sempervivum i.S., Thymus i.S., Veronica armena, Veronica filiformis, Veronica repens. Farne mit den Zeichen # \(\triangle \), Gräser mit den Zeichen # \(\triangle \).

Pflanzen, die im Heidegarten verwendet werden können.

Stauden: Erica und Calluna in allen Sorten müssen natürlich vorherrschen. Anaphalis margeritacea, Antennaria dioica, Antennaria tomentosa, Anthemis Biebersteini, Argemone platyceras, Aster amellus i.S., Campanula rotundifolia, Cerastium tomentosum, Ceratostigma plumbaginoides, Dianthus deltoides in Sorten, Dianthus suavis, Dianthus Knappi, Dianthus vaginatus atrorubens, Dianthus neglectus, Dianthus caesius i.S., Epilobium angustifolium, Epilobium Hectori, Festuca i.S., Geranium i.S., Hieracium i.S., Helianthemum i.S., Hypericum polyphyllum, Lavandula i.S., Matricaria caucasica, Nepeta Mussinii, Paronychia i.S., Statice i.S., Thymus i.S., Tunica i.S., Verbascum i.S., Veronica i.S.
Gehölze: Arctostaphylos i.S., Berberis stenophylla, Betula alba verrucosa (Birke), Bruckenthalia spiculifolia, Cytisus i.S.,

Gehölze: Arctostaphylos i. S., Berberis stenophylla, Betula alba verrucosa (Birke), Bruckenthalia spiculifolia, Cytisus i. S., Elacagnus angustifolius, Empetrum nigrum, Genista i. S., Leiophyllum buxifolium, Muchlenbeckia axillaris, Perowskia atriplicifolia, Polygala chamaebuxus, Potentilla i. S., Pyracantha coccinea, Rosa Giraldii, Rosa microphylla, Rosa pimpinellifolia hispida,

Ulex europaeus, Vaccinium i. S., Juniperus (Wacholder) i. S.

Pflanzen für trockene Böschungen.

Stauden: Achillea i. S., Alyssum i. S., Anaphalis margeritacea, Arabis albida i. S., Aubrietia i. S., Carlina acaulis, Cerastium i. S., Dianthus neglectus, Dianthus deltoides i. S., Eryngium i. S., Euphorbia epithymoides, Euphorbia myrsinites, Gypsophila i. S., Helianthemum i. S., Hieracium i. S., Iberis i. S., Iris pumila i. S., Lavandula i. S., Matricaria caucasica, Nepeta i. S., Oenothera i. S., Opuntia i. S., Potentilla verna, Potentilla reptans, Potentilla chrysocraspeda aurea, Saponaria ocymoides, Sedum i. S., Sempervivum i. S., Statice i. S., Thymus i. S., Tunica i. S., Veronica teucrium prostrata, Veronica incana, Veronica orientalis, Veronica spicata alpina.

Gehölze: Berberis i. S., Cotoneaster i. S., Cytisus i. S., Juniperus i. S., Lonicera Alberti, Potentilla i. S., Pyracantha coccinea,

Spiraca pumila, Spiraca arguta.

Pflanzen für Sandböden.

Stauden: Antennaria tomentosa, Anthemis i. S., Armeria maritima i. S., Avena sempervirens, Campanula rotundifolia, Cerastium i. S., Crambe cordifolia, Dianthus deltoides i. S., Dianthus caesius i. S., Elymus glaucus, Eryngium i. S., Festuca i. S., Gypsophila i. S., Helianthus i. S., Hieracium i. S., Nepeta Mussinii superba, Oenothera missouriensis, Opuntia i. S., Paronychia i. S., Santolina chamaecyparissus, Sedum i. S., Sempervivum i. S., Solidago virgaurea praecox, Statice i. S., Thymus serpyllum i. S., Verbascum i. S., Yucca filamentosa.

Gehölze: Acer ginnala, Acer campestre, Cytisus scoparia i. S., Cytisus praecox, Genista germanica, Hippophae rhamnoides, Tamarix tetrandra, Viburnum lantana. - Juniperus chin. Pfitzeriana, Junip. communis hibernica, Junip. sabina tamariscifol., Pinus mugh.

Blütenstauden zur Umpflanzung von Wasserbecken (normaler Gartenboden).

Anchusa myosotidislora, Asphodeline lutea, Bergenia i. S., Eryngium yuccaefolium, Geum i. S., Helianthus salicifolius, Hemerocallis i. S., Hosta i. S., Iris in allen mittelhohen Sorten, Kniphosia i. S., Lythrum i. S., Physostegia i. S., Ranunculus gramineus, Sisyrinchium striatum, Symphytum grandislorum, Thalictrum i. S., Tradescantia i. S., Trollius i. S.

Stauden für Blumenwiesen, die den üblichen Gras-Schnitt im Juli mitvertragen.

Achillea filip. Parkers var., Achillea millefol. Kelwayi, Anchusa myosofidiflora, Aquilegia vulgaris hybr., Astrantia major, Brunella Webbiana, Buphtalmum speciosissimum, Campanula rotundifolia, Campanula carpathica i. S., Cardamine pratensis fl. pl., Centaurea montana i. S., Centranthus ruber i. S., Chrysanthemum leucanthemum i. S., Chrysanthemum maximum i. S., Corcopsis verticillata, Colchicum i. S., Crepis aurea, Delphinium grandiflorum chinense i. S., Dianthus vaginatus atrorubens, Doronicum i. S., Dracocephalum Ruyschianum, Erigeron speciosus i. S., Filipendula hexapetala fl. pl., Geranium i. S., Geum i. S., Helenium Hoopesii, Hieracium aurantiacum, Inula grandiflora, Linum perenne, Linum flavum, Lythrum salicaria i. S., Malva moschata, Nepeta i. S., Paradisea liliastrum giganteum, Polygonum bistorta, Potentilla alba, Potentilla chrysocraspeda aurea, Pulmonaria i. S., Salvia pratensis i. S., Saponaria officinalis fl. pl., Stachys grandiflora i. S., Thalictrum aquilegifolium i. S., Thalictrum minus adiantifolium, Trollius i. S., Veronica teucrium prostrata i. S., Viscaria viscosa i. S., Verbascum i. S.

Was past zusammen? Eine Zusammenstellung wirkungsvoller Gruppierungen

I. Niedere Stauden:

Acaena Buchananii zu Allium, Campanula pusilla

novae zealandiae zu Lin. flav., Alyss. saxat.comp. Geum coccin.

Achillea ageratifolia zu Veronica spic. Perkeo

aurea zu Campan. glomerata sup. u. C. carpathica

Adonis alle Arten zu Anemone pulsatilla, Anemone montana, Anemone silvestris

Alyssum saxatile fl. pl. zu Iris pum. Darmstadt, Iris pum. atroviol. - saxatile citrinum zu Polemonium reptans u. P. rept. superba Anemone nemorosa zu Primel und Farne

pulsatilla zu Adonis in Sorten, Festuca glauca

Anthemis Biebersteinii zu Campanula pusilla und Campanula carpathica Veronica teucrium prostrata

Arabis albida und albida fl. pl. zu Iris pum. cyanea und Phlox subulata Wilsoni

Rosabella zu Phlox subul. Maischnee u. Iris pumila Schneek. Armeria maritima zu Eryng. maritimum, Statice incana pygmaea Aster alpinus weiß zu Veronica teucrium prostrata blau

blau zu Veronica teucrium prostrata weiß

Aubrietia blau zu Iris pumila gelb u. Phlox subulata Moerheimi — lila zu Alyssum saxatile citrinum u. Phlox subulata Maischnee rosa zu Phlox subulata nivalis und Iris pumila Die Braut rot zu Iberis sempervirens Schneeflocke und Phlox nivalis weiß zu Iris pumila blau und Phlox subulata Sprite

Campanula carpathica blau zu Asclep. tuberosa u. Anth. Bieberst.

weiß zu Linum perenne und Nepeta Mussinii

pusilla blau zu Corydalis lutea, Hieracium intybaceum

weiß zu Hieracium rubrum und Erinus alpinus

Corydalis lutea zu Coreopsis rosea nana, Polemonium reptans, Viola papil. purpurea

Dianthus spiculifolius zu Aster alpin. blau u. Campan. turbinata caesius splend. zu Armeria marit, alba u. Phlox sub. Maischnee

Epimedium alle Sorten zu Farne und Primel Euphorbia myrsinites zu Festuca und Opuntien

Gentiana lagodechiana zu Helianthemum gelb und bronzefarben Geranium Endressii zu Eryngium blau u. Gypsophila rp. Purpusi platypetalum zu Genista praccox, Iris interregna weiß

Geum mont. aurantiacum zu Campanula pus. blau, Aubrietia blau Gypsophilarep, fl. pl. Rosenschl. zu Delph. grdfl, chin. Tom Thumb monstrosa zu Heuch. Feuerrispe, Veron. latifol. Königsbl.

Helianthemum rot und rosa zu Potentilla fruticosa Beesii

weiß zu Scutellaria baicalensis, Lithospermum fruticosum gelb zu Veronica armena, Linum perenne

Helleborus niger zu Farne, Vinca, alpine Rhododendron hybridus zu Pulmonaria und Primel in Sorten

Hepatica triloba zu Primula acaulis und Primula officinalis

Hieracium rubrum zu Helianthemum gelb, Veronica blau gelb zu Dianthus deltoides, Linum narbonnense Iberis zu Aubrietia blau, Geum rot und Geum gelb

Iris pumila blau zu Iberis Schneeflocke, Alyssum saxatile fl. pl.

gelb zu Aubrictia blau, Phlox subulata Wilsonii

weiß zu Phlox divaricata canad., Phlox sub. Moerheimii Linum slavum zu Campanula carpathica blau, Nepeta Mussinii Nepeta Mussinii zu Potentilla frutic. Purdomii

Oenothera missouriensis zu Veronica incana

linearis zu Lavandula, Campanula carpathica

Opuntia zu Euphorb .myrsinites, Yucca in Sort., Sed. u. Semperv. Pentastemon pygmaeus zu Festuca glauca und Inula ensifolia Phlox subulata blau zu Aubrietia weiß, Genista praecox

- rot und rosa zu Iberis und Arabis weiß

weiß zu Iris pumila blau und lila

Primula in Sorten zu Epimedium, Omphalodes, Mertensia, Farne (Etagenprimel)zu Carexjap., Aquileg., Heuch., Geum u. Farne

(jap. Primel) zu Farne, Epimed., Mertens., Heuch. u. Tiarella — (Kugelprimel) zu Caltha palustris, Omphalodes u. Myosotis

(Teppichprimel) zu Vinca minor, Viola cornuta u. V. odorata, Carex plantaginea

Pulmonaria zu Farne, Carex, Daphne, Anchusa myosotidiflora Ramondia zu immergr. Zwergfarne, Synthyris renif., Selaginella Saxifraga (polsterb.) zu Primula pruhonic., Pr. Juliae, Hepatica

(rosettenb.) zu Sempervivum, Sedum, Campanula Portenschlagiana und C. Poscharskyana, C. garganica

(verschiedenblättr.) zu Etagenprimel, Omphalodes, Mertensia

Sedum (moosart.) zu Campanula carp., C. pusilla, C. garganica, C. Portenschlag., Oenothera pusilla, Veronica teucr. prostr.

(buschige) zu Campanula pusilla, C. garganica, Cerastium Columnae, Hieracium rubrum, Platycodon grdfl. Mariesii Soldanella zu Ramondia, Globularia

Thymus (teppichbildende) zu Campanula pusilla, C. garganica, Paronychia, Matricaria caucasica, Sedum i. S.

(aufr.) zu Ajuga i. S., alp. Nelken, Hutchinsia, Inula ensifolia Tunica zu Gypsophila fl. pl. Rosenschleier, Inula ensifolia, Festuca glauca und F. glacialis

Veronica (teppichbildende) zu Geum triflorum u. G. bulgaricum, Potentilla chrysocraspeda aurea, Minuartia, Gypsophila rep.

(aufrechte) zu Geum Borisii u. G. montanum aurantiacum, Heuchera tiarelloides, Anthemis Bieberst.

Viola gracilis Juwel v. Eisenach und Lord Nelson zu Arabis procurrens, Arabis albida (gefüllt und einfach)

Viola cornuta zu Corydalis lutea und C. cheilanthifolia

odorata zu Primula acaulis und Pr. officinalis, Omphalodes und Vinca minor in Farben

II. Mittelhohe Stauden:

Achillea filip. Parkers var. zu Lychnis chalcedonica, Salvia nemoros, Helenium Crimson Beauty

millefol. Kelwayi zu Malva moschata

ptarmica fl. pl. zu Delphinium grandisl. chinense cinerarea, Pentastemon barbatus, Dracocephalum Ruyschianum

Aconitum napell. zu Coreopsis verticillata, Cimicifuga, Monarda Fischeri var. Wilsonii zu Anemone jap., Herbstast., Cimicifuga Anchusa myosotidifl. zu Caltha pal.fl.pl., Trollius, Aquilegia u. Iris Anemone japonica zu Cimicifuga, Monarda, Gräser und Farne Aquilegia zu Gräser, Farne, Trollius, Iris germanica

Asphodeline lutea zu Yucca filament., Opunt., Perowskia, Gräser Aster amell. zu Avena semperv., Artemisia stell., Rudbeckia spec. Astilbe Arendsii zu Hosta, Monarda, Cimicifuga, Campanula

latifol. macrantha, Campanula persicifolia

Astilbe simplic. zu Campanula carpath., mittelh. Gräser u. Farne Caltha palustr. zu Anchusa myosotidist., Cardamine pratens.st.pl. Campanula glomerata superba zu Achillea tomentosa, Oenothera

glauca, Oenothera speciosa latifolia macrantha zu Farne, Digitalis, Gräser

persicifolia zu Astilbe simplicifolia, Lysimachia clethroides, Paradisea liliastrum giganteum

Chrysanthemum maximum zu Delphinium, Papaver orientale,

Lychnis chalcedonica, Phlox paniculata rot Cimicifuga zu Aconitum, Hosta Fortunei, Gräser, Farne Coreopsis verticillata zu Heuchera, Delphinium, Campanula Doronicum z. Anchusa myosotidifl., Omphalodes, orangef. Trollius Euphorbia epithymoides zu Aubrietien, Anchusa myosotidiflora,

Dicentra spectabilis

Eryngium zu Gräser, Asphodeline, Opuntien

Geum, rotblühende zu Iris pumila gelb, Caltha palustris fl. pl., Alyssum saxatile fl. pl., Alyssum sax. citrinum

gelbbl.zuAubrictia,Campanula carp.,Violagrac.LordNelson Hemerocallis zu Astilben, Iris orientalis i. S, Iris sibirica i. S., Tradescantia i. S.

Heuchera zu Mertensia, Gypsoph.rep.monstr., Veron. Shirley blue Inula zu Scutellaria canescens, Scut. baicalensis, Eryngium blau Iris orient. u. sibir. zu Hemerocallis, Lythrum, Lysimachia clethr. Liatris zu Scabiosa caucasica und Gräser

Linum perenne zu Potentilla insignis, Campanula carpathica

alba, Hieracium gelb Lythrum zu Astilben, Tradescantia, Filipendula hexapetala fl. pl. Monarda zu Achillea filip. Parkers var., Salvia nemorosa,

Anemone japonica hupchensis Oenothera glauca u. frutic. Youngii zu Campanula persicifolia, Delphin.grandifl.chin.cinerarea, Geum Borisii, G. coccineum Papaver orient.rot zu Lilium weiß, Anchusa ital. Dropm., Lupinus

Pentastemon barbatus zu Achillea ptarm. fl. pl. u. blaugr. Gräsern Rodgersia zu Aconitum, Astilbe, Hosta und Farne

Scabiosa cauc.zu Aster ptarm. major, Santoline tom., Avena semp.

Thalictrum zu Astilbe Arendsii, Cimicifuga

Tradescantia zu Hemerocallis, Iris oriental., Iris sibir., Gräser Trollius zu Anch. myosotidifl., Scirpus Tabernaem. zebr., Gräser Verbascum zu Delphinium, Campanula latif. macr., Salvia nem.

Deutsche Pflanzennamen

Die Buchstaben hinter dem botanischen Namen besagen, unter welcher Abteilung Sie die Sorte im Katalog verzeichnet finden.

Es bedeuten:

N = Niedere Stauden, H = Hohe Stauden, F = Farne, Zg = Ziergräser, S = Sumpfstauden, Bz = Blumenzwiebeln, Hk = Heidekräuter.

	Hk = He		
Adlerfarn: Pteridium F	Ruschmalve: Lavatera HI	Frühlingsschelle: Synthyris . N	Herbstaster: Asternovi-belgii H
4 2 · · · 1 A 1 · NI	Durchmohn Bomnova H	Fuchshohne: Thermopsis H	Herbstaster: Ast. vovae-angl. II
The state of the s	D A nemone	Fuchsschwanzgras: Alobecur, 221	Tier Ostzertiose. Conditedini
Affodill: Asphodelus H	D that land Coltho	Friihlingswaldwicke: Lathyr. N	Herkulesstaude: Heracleum H
Affodill: Asphodelus 11	Butterblume: Caltha	Fünffaden: Pentastemon N u. H	Herzblume: Dicentra . Nu. H
	Christophskraut: Actaea . H	Funkie: Hosta H	Herzlilie: Hosta H
	Christrose: Helleborus IN	Fußblatt: Podophyllum H	Harzeteinbrech: Bergenia N
	Chrysantheme: Chrysanthem. H	Fugblatt: Podophyllum	Havanknaut: Circaea N
Alpenaster: Aster alp N	Dachwurz: Sempervivum . N	Gänsekresse: Arabis N	Himmelalaitant Polemonium H
A1 11 1 All' NI	Dickblatt: Sedum N	Gamander: Teucrium N	Himmelstetter: I ofemonium. H
Alpenglöcken: Soldanella . N	Diptam: Dictamnus H	Gartenmohn: Papaver H	Himmersschusser: Himma. IV
Al I I (Cinana NI	Doppelmalve: Sidalcea H	Gauklerblume: Mimulus N	Mirschzungenfarn: Fnyillis F
Al I Ali- NI	Doct : Eunatorium H	Gedenkemein: Omphalodes . N	Hirse: Panicum
Al local Harmon NI	Dottorbluma: Caltha H	Geißbart: Aruncus	Hornklee: Lotus
Al Luit Malandium H	Drachenkonf: Dracocenh. Nu. H.	Geißraute: Galega H	Hornkraut: Cerastium
Al La Caraba, Advillag NI	Drachenmaul Horminum . N	Gelbweiderich: Lysimachia . H	Hornveilmen: viola corn 18
All Mills ols NI	Draimactarhlume Tradescant H	Gemskresse: Hutchinsia N	Hundszahn: Erythronium Dz
Al The Caulomon NI	Drillingenflanze: Trillium N	Gemswurz: Doronicum H	Hungerblumchen: Draba N
41 1 11 Channant N	Ebanyung Carlina N	Geranium: Pelargonium NI	Igelpolster: Acantholimon . IN
A 1 / Thallatana Hi	Edoldictal Eryngium Nu H	Germer: Veratrum H	Indianernessel: Monarda . 11
	Edelante: Adilles Nu H	Giersch: Aegopodium H	Inkalilie: Alstroemeria H
Andorn: Marrubium N	Edelgarbe: Adilliea . Nu. H	Gipskraut: Gypsophila N	Immergrün: Vinca N
		Gliedkraut: Sideritis N	Japansegge: Carex jap Zg
Aurikel: Primula pubesc N	Edelweiß: Leontopodium . IV	Cladearblumes Campan Nu H	Japan, Anemone: Anem. jap. H
Bachspiere: Filipendula H	Ehrenpreis: Veronica . Nu. 11	Glockenblume: Campan. N u. H	Fackellilie: Kniphofia H
Bärenklau: Acanthus . Nu. H	Eisenhut: Aconitum H	Glücksklee: Trifolium N	"Prachtschwertl.:lrisKaempf. H
Rärenwurz: Meum	Eisenkraut: Vernonia II	Gnadenkraut: Gratiola IN	"Winteraster: Chrysanthem. H
Bärwinde: Calystegia H	Eiskraut: Sedum N	Götterprimel: Dodecatheon N	, Winteraster: Chrysanthem. II
Baldrian: Valeriana Nu. H	Elfenblume: Epimedium N	Goldahre: Orontium	Johanniskraut: Hypericum . N
Rallonglodee: Platycodon . H	Enzian: Gentiana Nu. H		Junkerlilie: Asphodeline H
D. L. Anundingrin Za	Etagenblume Monarda H	[Goldbaldrian: Patrinia N	Kaiserkrone: Fritillaria . Bz
Bandgras: Phalaris Zg	Etagenerika: Physostegia . II	Loldbandline: Lillum aurat. Dz	Kaktee: Opuntia N
Bartfaden: Pentastemon N u. H.	Eulaliengras: Miscanthus Zg	Golderdbeere: Waldsteinia N	Kaliforn. Malve: Sidalcea . II
Baummohn: Romneya H	Ewigleben: Sempervivum . N	Goldkörbchen: Chrysogonum N	Kaliforn. Mohn: Romneya . H
Becherfarn: Matteucia F		Goldmilz: Chrysosplenium . N	Kalmus: Acorus S
Becherglocke: Adenoph. Nu. H	Fahnenwicke Ovytropis N	Goldmünzkraut: Lysimachia N	Kamille: Anthemis Nu. H
Beinheil: Symphytum N	Falleame: Sporobolus Ze	Goldnessel: Lamium N	Kapuzinerkresse: Trapacol. H
Bentgras: Molinia Zg		Goldprimel: Douglasia N	Kardendistel: Morina H
Dentgras: Molana	Federmohn: Macleaya H		Katzenminze: Nepeta N
Bergaster: Aster alpinus . N	E-demalke: Dienthus plum N	Goldraute: Solidago . Nu. H	Katzenpfötchen: Antennaria N
Bergkamilie: Anthemis N	E : le le tron Opuntio	Goldtröpfchen: Chiastophyll. N	Kaukasusvergißmeinnicht:
Bergminze: Satureia	reigenkaktus: Opuntia	Gradilie Paradisea	Anchusa myosotidifl H
Berutkraut: Erigeron . Nu. II	Feinstrant: Erigeron . Nu. I	Graslilie: Paradisea H	Kermesheere: Phytolacca . H
Beschreikraut: Erigeron N u. H	Felberich: Lysimachia . Nu. I	Grasnelke: Armeria N	Kiehitzeier: Fritillaria mel. Bz
Bienenbalsam: Monarda H	Felsennelke: Dianthus N	Greisenkraut: Senecio	Kiebitzeier: Fritillaria mel. Bz
Binse: Scirpus S	Felsennelke: Tunica	Griech. Veilchen: Viola grac, N	Klarinettenrohr: Arundo Zg
D. 1.1. C 1 N H	Fatth att. Sadum	Harmsel: Ainga	Miebkraut. Citiciancia
Bischofskappe: Mitella N	Fetthenne: Sedum Nu. f.	Gundelrebe: Glechoma N	Kleefarn: Marsilia S
Rittorlelage Manyanthes S	Fettkreuzkraut: Othonopsis P	Gundermann: Glechoma IV	Kleopatranadel: Elemulus . 11
D'44 I avviois N	Fauerlilie: Lilium croceum B:	z Haargras: Stipa Lg	Knoterich: Folygonum . Iv u. 11
Dlana Cantonia E	Fenerbusch Dictamnus F	Habichtskraut: Hieracium . N	Konigstarn: Osmunda regai. r
Blauglöckchen: Mertensia . N	Ficherklee Menyanthes	Mater-Reis: Lizania Lg	Konigskerze: veroascum . 11
Blaukissen: Aubrictia N	Findermoos Cotula	Hahnentuk: Kanunculus N u. 11	Konigshile: Lillum regale Dz
Blauminze: Nepeta N	Fiedernolster Cotula	Mainkraut: Minuartia N	Kokardenblume: Gaillardia II
Plane has Cuanthus N	Filzkraut Phlomis	Hainlattich: Aposeris N	Kolibriblume: Lauschneria . N
Planetroblhafor, Avena Zo	Fingerbut Digitalis I	I Hainsimse: Luzula Zg	Kompahpilanze: Silphium . II
Dl. (the for Ambanathanum Zo	Eingerkrauf Potentilla Nu. I	Hakenlilie: Crinum	[Kopi blume: Cephalaria 11
D1: Canalastiama N n H	Flammenhlume Phlox 1	Hartheu: Hypericum	Norea-Margerne: Chrys. Rol. 11
Blumenhinse: Butomus S	Eliegendes Herz Dicentra . I	Haselwurz: Asarum N	Nornblume: Centaurea Iv u. 11
Blumenlauch: Allium N	Hodrenblume: Centaurea . 1	Il Hauhechel: Unonis	Nornblumenaster: Stokesia . 11
Blutwurz: Sanguinaria N	Erauenflache: Linaria	VI Hauslauch: Sempervivum . N	Kresse: Arabis N
D. L. Janguinaria		F Hechtkraut: Pontederia S	Kreuzkraut: Senecio . Nu. H
Bohnenkraut: Šatureia N	I Franches Disector	Heidekraut: Erica H	Krötenlilie: Tricyrtis H
Brandkraut: Phlomis 1	Trauennerz: Dicentra I	W Heidekraut: Calluna HI	Kronenwicke: Coronilla N
Braunelle: Brunella N	Frauenmantel: Alchemilia . I	Heidelb Schlaßler Lin gunh	Krugglodse: Edraianthus N
Brennender Busch: Dictamnus F	Frauenschuh: Cypripedium	I II :1-1: 1-1 - Continue N	Krugglocke: Edraianthus . N Krugelblume: Globularia . N
Brennende Liebe: Lychn. chalc. H	Freiland-Amaryllis: Crinum 1	Theilglockenen: Cortusa	Kugelblume: Globularia N
Brangablatti Galar	Glovinie neary, N u.	Heiligenblume: Santolina . I	Mugeldister: Edimops 11
P. halaladea . Edminthus N	I Freedbig Hydrocharis	S Helmkraut: Scutellaria	Nunschelle: Anemone puis Iv
Bunte Margerite: Pyrethrum I	I Froschlöffel: Alisma	S Herbstanemone: Anem. jap. 1	Kuhtritt: Wulfenia N

Edwigundenfraut Empator 1 Pföngstrein 10 Pringstrein 10	IZ 1 1 1 1 IZ II	IDC 4 'II V' I 'I N		T 1 11 12 13
Lampionpluser (Payalis				
Jampinophlanes: Physalis 1 Platiblinesgrav: Uniola Ze Segge: Caree Ze Traverglocke: Uvularia N Lebechlaham: Frinus N Drozellandin Santigagambr. N Schiepflanus: Aschepinas 11 Tendedellume: Soldanella N Lebechlaham: Prinus N Schiepflanus: Aschepinas 11 Tendedellume: Soldanella N Lebechlaham: Pradeglocke: Platycolon 11 Schiepflanus: Aschepinas 11 Tendedellume: Soldanella N Leine Liman N N Leine Liman				
Lasvendelt Lavandula II Perzellander. M. Seidenpulaner. Astelpies II Tripmadant. Sechum reflexum N. Leberkhänchen: Liepatien N. Peradiglinder. Platycolon II Störn Mohr. Pepawer andie. S. Przellanderen Liepatien N. Peradiglinder. Platycolon II Störn Mohr. Pepawer andie. S. Przellinder. Przellander. P. Peradischier. Astilbs. 11 Leinkeaut: Limaria N. u.H. Peadwicke: Lathyrus II Störn Mohr. Peradischier. Leinkeaut: Limaria N. u.H. Peadwicke: Lathyrus II Störn-Mohr. Platycolon II Störn-Mohr. Przellinder. Przellinder. N. Leinkeaut: Limaria N. u.H. Peadwicke: Lathyrus II Störn-Mohr. Przellinder. Przellinder. N. Leinkeaut: Limaria N. u.H. Peadwicke: Lathyrus II Störn-Mohr. Przellinder. N. Leinkeaut: Limaria N. u.H. Prophetenblume: Arnevba N. Stölberwegerich. Plantago II Türkenmohr. Papawer Limaria N. Przellinder. N. Przellinder. N. Lungenwurz: Metessia N. u.H. Lawenmadt: Antirrhium N. Romendar. Antirrhium N. Lungenwurz: Metessia N. u.H. Lamender. N. Lungenwurz: Metessia N. u.H. Ramender. N. H. Ramender. Ramender. N. H. Sandenblume: Edinochum N. Lungenwurz: Metessia N. u.H. Ramender. N. H. Ramender. Ramender. N. H. Ramender. Ramender. N. H. Störnbehrer. Leuroium N. Ramender. Ramender. N. H. Störnbehrer. Leuroium N. Ramender. Ramender. N. H. Maldonenlinie: Lalium cand. Be. Rauswinberer: Empetrum III Sonnenburz. Reflexulum. N. Malginischen. Convollaira: N. R. Ramender. Ramender. N. H. Malginischen. Convollaira: N. R. Riesenschofter. Leuroium N. Malginischen. Ramender. N. R. Riesenschofter. Leuroium N.				
Leberdalsams: Frims . N Perachtsjaker: Pladycodom N Soffenferant: Saponaria Nu. II Troddelblame: Soldanella N Leinkeaut's Sleue . N Prachtsjaker: Pladycodom N Silberdatet's Capaver mide. N Trollblume: Trolly optimis N Leinkeaut's Sleue . N Prachtsjaker: Astilbe II Silberdatet's Capaver mide. N Timbehindal Dolymanariag Bz Eartheappara Curydalia N Peindel Primala N Silberdatet's Capadia N Leinkeappara Curydalia N Primelle Brunella N Silberdatet's Especialism N Silberdatet's Especiali		Porzellanhl: Savifraga umbr. N	Saidenpflanze: Asclanias H	Tripmadam: Sadum reflexum N
Ledenzklüschen i Hepatica N Pradustharte Liatris II Sibir. Mohn: Papawer nudie. N Froillion N II Peathstipere Astible II Siegwers (Todiole				Troddelblume: Soldanella N
Leinkraut: Silene N. Prachtpriere: Astilbe H. Silgewurs: Gladiole Bs. Tüpfelfaran: Polypadium P. Prachtpriere: Astilbe H. Silberdiset: Carlina N. Türkendund. Lilium martag. Bs. Leinkraut: Lariaria Nu. II. Prachtwide: Lathyrus H. Sillerderze: Cinicifugo II. Türkennünd: Papawer H. Leinkendung: Armeha N. Sillerderze: Cinicifugo II. Türkennünd: Papawer H. Leinkendung: Armeha N. Sillerderze: Cinicifugo II. Ungarwurs: Waldst.inia N. Proputerzeldung. N. Proputerzeldung: Astination Policy Control of the				
Leinkaut Linaria Nu II Peathrighter Astilbe II Silberderez Cimiefuga II Türkenmohn: Papaver II Lerchensporn: Coryalais N Prime! Praintal N Silberderez Cimiefuga II Türkenmohn: Papaver II Lerchensporn: Coryalais N Prime! Praintal N Silberderez Cimiefuga II Türkenmohn: Papaver II Lerchensporn: Coryalais N Prime! Primula N Silberwergerich: Plantago N Ungerwurz: Waldstrinis N Leitenbackwif Eremurus II Prumelle Brunella N Silberwergerich: Plantago N Ungerwurz: Waldstrinis N Leitenbackwif Eremurus II Prumelle Brunella N Stachmer Soabiosa II Ventafora (Waldstown Vergigineinmicht Myootis N Leutenbackwif Eremurus II N Leutenbackwif Eremurus II N Leutenbackwif Eremurus II N Leutenbackwif Eremurus II N Leutenbackwif Soabiosa II Ventafora (Waldstown Karlondown II N Leutenbackwif II N Leutenbac				
Leicheaut: Limaria Nu H Prachtwicke: Lathyrus H Silberkerze: Cimiefuga H Türkenandir. Papawer J Primel: Primula N. Leithauffle: Lychnis H Prophetenbliume: Arnehin N Silberwerze: Plantage N Veilden: Viola oducata N Leithauffle: Lychnis H Prophetenbliume: Arnehin N Silberwerze: Dryas N Veilden: Viola oducata N Leicheadhauffle: Leicheandauf Antirrhium N Pramelle: Annehin N Silberwerze: Dryas N Veilden: Viola oducata N Leicheandauf Antirrhium N Pramelle: Annehin N Lungenbrant Pulmonaria N Lungen				Türkenbund: Lilium martag. Bz
Leistanelle, Lychnis	Leinkraut: Linaria Nu.H			
Lövenmaul; Antirehnum D. Pauhtfarn; Polystichum F. Sodeichlume; Epimedium J. Vergüfmenditt Myosotis N. Lutwarz: Onosma N. Paupstelöide, Heubera Hu. N. Somenbarger: Aster aucillus H. Vergüfmenditt Myosotis N. Paupstelöide, Heubera Hu. N. Somenbarger: Aster aucillus H. Wergüfmenditt Myosotis N. Luugenvurz: Mertensia N. n. H. Ramackel: Ramoneulus N. Hu. Somenbarger: Aster aucillus H. Waldilike: Freilime N. Somenbarger: Heliopsis H. Waldilike: Araperala N. Luugenvurz: Mertensia N. n. H. Ramackel: Ramoneulus N. Hu. Somenebarger: Heliopsis H. Waldilike: Araperala N. Bandelberer: Empertum H. Sonnenbarus: Helianhum H. Waldipiarer: Araperala N. Ramackel: Ramoneulus N. Hu. Sonnenbarus: Helianhum H. Waldipiarer: Araperala N. Ramackel: Ramoneulus N. Hu. Sonnenbarus: Helianhum H. Waldipiarer: Araperala N. Ramackel: Ramoneulus N. Hu. Sonnenbarus: Helianhum H. Waldipiarer: Araperala N. Ramoneulus N. Hu. Sonnenbarus: Helianhum H. Waldipiarer: Araperala N. Wasseralas: Stratifies N.	Lerchensporn: Corydalis N			Ungarwurz: Waldsteinia . N
Lowers: Ososoma N. Pomktfarn: Polystishum F. Sodelblume: Epimelium N. Vaduglooke: Krengeshoms H. Lungenkraut: Pulmonaria . Lungenkraut: Pulmonaria . Lungenkraut: Mertensia N. I. J. Waddensleibt. Krengeshoms H. Lungenkraut: Mertensia N. I. J. Lupine: Lapinus	Lichtnelke: Lychnis H			Veilchen: Viola odorata N
Jotwurz: Onoma N. Purpurglördch: Heubera Hu. N. Sommerzater: Astec anellu. H. Unigen: Lupimes v. H. Rauter, N. H. N. Sommerzater: Astec anellu. H. Waldhillie: Teillium. N. Waldhillium. N. Waldh				Venusfarn: Adiantum pedat. F
Lungenwerz, Wertensin Nu , Ramunelus P. H. Ramunelus P. H. Lungenwerz, Wertensin Nu H. Ramunelus P.				Vergißmeinnicht: Myosotis . N
Lunjnes Lupinus — H. Raketenhulmes Kalphofa H. Sonnenabunes H. Handester: Auperula — N. Maddenauge: Jeliopus — H. Raketenhulmes: Kalphofa — M. Sonnenabunes: Helenium — H. Waldshiele: Aira — Z.g. Maddenanenhile: Jolium cand. Br. Rawetheere: Empeterum — H. Maddenauge: Correspis Nu H. Raute: Ruta — N. M. Sonnenabunt: Rudbeckia — H. Waldspiere: Aruncus silvest. I. M. Marzebeher: Leucoium — Br. Ravennagras: Eriantlus Z.g. Sonnenamos: Sedam — N. Warzenschlund. Mazus — N. Maiglöckchen: Convallaria — N. Reibunbuneere: Mithella — Sonnenamos: Sedam — N. Warzenschlund. Mazus — N. Maiglöckchen: Convallaria — N. Riesenbandangras: Phalaris — N. Sperkraut: Polemonium Nu .I. Wasseraloe: Strafioles — Shalled — N. Marzenschlund. Mazus — N. Maiglöckchen: Gaillardia — H. Riesenschleichhalm: Equipute — Spitchhitchen: Tarrella — N. Spitchhitchen: Tarrella — N. Spitchhitchen: Tarrella — N. Wasserliesch: Bulnoums — Shalled — N. Spitchhitchen: Tarrella — N. Manassulidi Androsace — N. Reisenschleichhalm: Equipute — Shalled — N. Sportenbune: Centraltus — N. Marateru: Eryogium — H. Reinenschleichervaut. Creambe — H. Standenflachs: Linum — H. Wasserlanen: Epipolis — N. Marzenten: Eryogium — H. Reinenschleichhalm: Equipute — N. Standenflachs: Linum — H. Weispiecher: New Merzenschlein — N. Marzenten: Eryogium — H. Reinenschleichervaut. Betumm — F. Standenflachs: Linum — H. Weispiecher: New Merzenschlein — N. Marzenten: Applenium — F. Sandenflachs: Linum — H. Weispiecher: New Merzenschlein — N. Marzenten: Applenium — F. Sandenflachs: Linum — H. Weispiecher: New Merzenschlein — N. Marzenten: Applenium — F. Sandenbertul. Pricill. mel. B. Seinhureet. Spating — N. Wieterschlein — N. Wieterschlein — N. Marzenten: Paronychia — N. Sandenschlein — Sonne — N. Seinhureet. Paronychia — N. Sandenschlein: Paronychia — N. Sandenschlein — N. Sandenschl				Wachsglocke: Kircngeshoma H
Lupine: Lupinus				Waldlille: Trillium N
Maddenanger Corospis Nu L. R. Rautes Rata. N. M. Sonnenhoratt: Helenium II. Waldwise, Corospis Nu M. Rates Intan. S. M. Sonnenmos: Sedam N. Marzebecher: Leucoium B. R. Ravennagras: Erianthus Zg. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen Convallaria. N. Reibenhanderer: Mithelfa N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen Convallaria. N. Reibenhanderer: Mithelfa N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen Convallaria. N. Reibenhander: Eriodium N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen: Convallaria. N. Reibenhander: Mithelfa N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen: Convallaria. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen: Allenia. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Maigidischen: Allenia. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund, Mazus. N. Sonnenmos: Sedam N. Sonnenmos: Sedam N. Warzesschlund. N. Stadelmohn: Argemone II. Wasserlicard. N. Wasserlicard. N. Wasserlicard. N. Stadelmohn: Argemone IV. Wasserlicard. N. Wasserlicard. N. Stadelmohn: Argemone N. Wasserlicard. N. Wasserlicard. N. Stadelmohn: Argemone N. Stadelmohn: Argemone N. Wasserlicard. N. Stadelmohn: Argemone N. St				Waldmeister: Asperula N
Märdechenage: Coreopsis Nu. II Rauter: Ruta				
Mäusedors Ruscus Il Rebhunbesere Mitchella N. Nomeriosken: Helianthem. N. Marcenokland; Mazus N. Maigidickhen: Convallaria N. Reicherschabel: Erodium N. Sperrkeraut: Polemonium N. u. H. Majoran; Origanum N. Riesenbandergras: Phalaris Z. g. Spieztatude: Filippedalud H. Weiderich: Lydytum H. Marcetaris: Phyrogram H. Riesenbandergras: Phalaris Phalaris: Phyrogram H. Riesenbandergras: Phalaris Phyrogram H. Riesenbandergras: Phalaris H. Rohrkolben: Typka Spieztatude: Filippedalud H. Weiderich: Lydytum H. Weiderich:				
Massedom; Ruseus — II Rebbumbeere: Mitchella — Nomeroschen: Helianthem. Nomerocom — Nomero				Warzenschlund Mazus
Majoran: Origanum . N. Riesenbandel; Frodium . N. Sperrkraut; Polemonium N. u. H. Wasseraloe; Stratiodes . S. Riesenbandengeras; Phalais z. Zg. Spizzatude; Filippardalu . H. Wasseraloe; Stratiodes . S. Maheralthanea H. Riesenschandethalam: Equiset. S. Manarschild: Androsace . H. Riesenschaloses: Cephalaria H. Stachelmöhn: Argemone . H. Riesenschalmst. Crucianell. N. Marsteri, Evryagim . H. Riesenschalmst. Crucianell. N. Staudenflachs: Linum . H. Weiderich: Lydrymm . H. Rohrkolben: Typha . S. Steinberd: Saxifraga. N. u. H. Weiderich: Lydrymm . H. Rohrkolben: Typha . S. Steinberd: Saxifraga. N. u. H. Weiderich: Lydrymm . H. Rohrkolben: Typha . S. Steinberd: Saxifraga. N. u. H. Weiterdistel: Carlina . N. Maercholl: Platycob. H. Sallevi: Salvia . H. Steinkraut: Alyssum . N. Steinneke: Tunica . N. Steinneke: Tunica . N. Steinneke: Tunica . N. Steinneke: Tunica . N. Steinneke: Paronychia . N. Sawerklee: Oxalis . N. Steinneke: Paronychia . N. Sawerklee: Oxalis . N. Steinneke: Linum . N. Witteraster: Chrysant. ind. H. Milzfarn: Asplenium . F. Schadbretth: Fricill. Mel. Bz. Stephendum: Schaipsell. N. Steinneke: Stelaginella . N. Schamblatt: Rodgersia . H. Schatzensen. N. Schamblatt: Rodgersia . H. Schatzensen. S. Schamblatt: Rodgersia . H. Schatzensen. S. Schamblatt: Rodgersia . H. Schatzensen. S. Scheindotter: Erysnium . N. Steinneke: Slenginella . N. Schamblatt: Palagibum: N. Steindileer: Statica. N. u. H. Wollricherich: Eriogen. N. N. Scheinholme: Cancolos. R. Scheinholme: Cardamine . N. Scheinholme: Calcolos. N. Scheinholme: Cardamine . N. Scheinholme: Cardamine . N. Scheinholme: Cardamine . N. Scheinho				Wasserähre: Aponogeton S
Malerbuner Güllardia H Riesembonds: Papaver H Spirestaude: Filipendula H Wasserlachnenfuß; Ranuneul. S Malve: Althaea H Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus H Wasserlach: Buttomus S H Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus H Wasserlach: Buttomus S H Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus H Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus H Wasserlach: Bippuris S Mannsschild: Androsace N R Riesenschabitose: Cephalaria H Riesenschabitose: Cephalaria H Rangerlachtelle: Lozuda Zg Rangerlachtelle: Carabet H Stadelmüßchen: Acaena N Weideurüschen: Epidob, Nu. H Romardlumstr. Acueinaell. N Stadelmüßchen: Acaena N Weideurüschen: Epidob, Nu. H Riesenschabitose: Cephalaria H Stadelmüßchen: Acaena N Weideurüschen: Epidob, Nu. H Romardlumstr. Acaena N Weideurüschen: Epidob, Nu. H Weißbecher: Nierembergia. N Rührerschein: Angelenium H Romardlumstr. Acaena N Weideurüschen: Epidob, Nu. H Weißbecher: Nierembergia. N Rahverscheil: Sagina N Rahverscheil: Carabet H Sandelfückhen: Jasiene N Steinrich: Applenium F Rahverscheil: Angelenium F Rahverscheil: N Rahverscheil: Sagina N Rahverscheil: Cranbe H Schaehterthl: Früll. mel. B; Schaehterthl: Rahverscheil: Schaehterthl: Rahverscheilie: Lilumeconecol. B; Schaehterthl: Rahverscheilie: Li				
Malve: Althaea II Riesenmohn: Papaver I Spitzhütchen: Tiarella N Wasserpinnel: Anemopais S Mammuthlatt: Gunera II Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus. II Riesenschachtelhalm: Equiset. S Sporenblume: Centranthus. II Rannschiell: Androsace II Riesenschalerickraut: Crambe II Stachelmolin: Argemone II Rannscheu: Eryogium II Rannscheu: Perchrum II Rannscheu: Perchrum II Rannscheu: Perchrum II Rohnschlein: Platyben II Rohnschlein: Platyb				
Mammethlati Giunera II Riesenschachtlehalm: Equiset. S Mannsschild: Androsace N Mannstreut: Evragium II Martel: Luzula Z Margerite, weißer. Chrysand II Margerite, wei				
Mannstreil; Eryngium I Riesenskabione: Cephalaria H Marantrei; Eryngium I Riesenskabione: Cephalaria H Marantreil; Eryngium I Riesenskabione: Cephalaria H Marantreil; Carlina N Marantreil; Carlina N Marantreil; Carlina N Marantreil; Pyrethrum II Robrkolben: Typha S Steinkraut; Algysum N Marienglodeenbl:: Platycod. H Salbei: Salvia				
Marbei Luzuala Zg Räpenfarus Bechum F Margerite,weißei Chrysanth leucanthemun II , bunte: Pyrethrum II , bunte: Parophelic II , bunte: Pyrethrum II , beinterate: Althourna II , bunterate: Parophybis II , bunterate: Parophybis II , bunterate: Parophybis II , bunterate: Parophymi II , bunterate: Parop				Wassertanne: Hippuris S
Margerite, weißer Chrysandt B. Hargerite, weißer Chrysandt B. Heucanthemum II. bunte: Pyrethrum II. hunte: Pyrethrum II. Marienglodenbl.: Platycod. II. Masikraut: Sagina N. Marienglodenbl.: Platycod. II. Masikraut: Sagina N. Mauerfaria: Asplenium II. Malizfari: Asplenium II. Sandmiere: Arenaria N. Meerkohl: Crambe II. Schaftgabe: Advillea N. N. Merkohl: Crambe II. Schaftdolde: Inaquetia N. Mohn: Papaver II. Mohn: Papaver II. Mohning: Meconopsis II. Mohning: Meconopsis II. Moskraut: Selaginella N. Mossmarii: Solamulat: Rodgersia II. Mossmarii: Selaginella N. Mosshaut: Selaginella N. Mosshaut: Selaginella N. Mosshaut: Codyledon N. Schaumblite: Tiarella N. Motherkorio: Hieraria N. Mutterkraut: Matricaria N. Mutterkraut: Matricaria N. Moshicigras: Bouteloua Zg. Schaumelke: Silene N. Mutterkraut: Matricaria N. Mathelkraut: Codyledon N. Schaikmala: Lysichitum S. Schaumblite: Tiarella N. Mathelkraut: Codyledon N. Schaikmala: Lysichitum S. Nachtkerze: Oenothera N. H. Scheinbanf: Datisca II. Nachtvolo: Hieraria N. Scheinbanf: Datisca II. S				
Margerite, weißie: Chrysanth. Leucanthemul H honte: Pyrethrum H honte: Pyrethrum H Marienglodenthl: Platycod H Marienglodenthl: Platycod H Maskraut: Sagina N Malbei: Salvia H Maskraut: Sagina N Maerelan: Asplenium F Sandglödden: Jasione N Mauerelan: Asplenium F Sandglödden: Jasione N Maerelan: Asplenium F Sandglödden: Jasione N Maerelan: Asplenium F Sandglödden: Jasione N Maerelan: Sempervieum N Maerelan: Asplenium F Sandglödden: Jasione N Steinräset: Sempervieum N Maerelan: Asplenium F Schadbrettbl: Fritill mel Bz Meeckohl: Crambe I Schafdrodle: Hacquetia N Mohn: Papaver II Schafdlodle: Hacquetia N Mohn: Papaver II Schafdlodle: Hacquetia N Modashanz: Sauerus S Schadbrettbl: Fritill mel Bz Mooskraut: Selajinella N Mosskitogras: Bouteloua Zg Schammelke: Silene N Mosskitogras: Bouteloua Zg Schammelke: Silene N Mutterkraut: Matricaria N Schaimhaft: Datisca II Schamblite: Tiarella N Nabekraut: Cotyledon N Nadtkerze: Coenothera N Nabekraut: Cotyledon N Nadtkerze: Coenothera N Nathaman N Natherze: Coenothera N Schaimhaft: Datisca II Schambnii Peliphyllum II Nachtviole: Hesperis II Schaimhaft: Datisca II Schambnii Peliphyllum II Nachtviole: Hesperis II Schaimhaft: Poliphyllum II Nachtviole: Hesperis II Schaimhaft: Datisca II Schambnii Peliphyllum II Nachtviole: Hesperis II Schaimpenkaut: Cotyledon N Schalagenkraut: Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Cotyledon N Schalagenkraut: Schalagenkraut:				Weiderich: Lythrum H
leucanthenum II Rohrkolben Typha . S Steinbrech: Saxifraga . Nu. H Wiese: Lathyrus . H Marien Pyrethrum II Rohrkolben Typha . S Steinbrech: Saxifraga . Nu. H Wiesenfauer . H Salbei: Salvia				Weißbedier: Nierembergia . N
Marienglodenbl.: Platycod. H Salbei: Salvia H Steinkraut: Alyssum N Wiesenknopf: Poterium H Maskraut: Sagina N Salomonssiegel: Polygonatum H Steinkraus: Alyssum N Wiesenschaumkraut: Cardam. H Steinnelke: Tunica N Wilder Indigi: Baptisia . H Meerkohl: Crambe N Steinnose: Sempervirum . N Wilder Indigi: Baptisia . H Miesenschaumkraut: Cardam. N Steinnelkei: Actionse: Empervirum . N Wilder Indigi: Baptisia . H Miesenschaumkraut: Cardam. N Steinnelkei: Actionse: Supprivium . N Wilderaket: Parkathis . N Winteraket: Chrysant ind. H Miesenschaumkraut: Cardam. N Steinnelkei: Actionse: Segina . N Winteraket: Chrysant ind. H Miesenschaumkraut: Selaginella . N Schaumblite: Tiarella . N Steinnellie: Lilium concol. Bz Winterling: Eranthis . N Moskitogras: Boutelou . Zg Schaumblite: Tiarella . N Steinnellie: Lilium concol. Bz Winterling: Eranthis . N Scheinheil . N Schaumblite: Tiarella . N Storkschanelbe: Geranthus Zg Wolfsmidh: Euphorbia N u H Nachtweize: Scheinheil				Wetterdistel: Carlina N
Marienglockenbl.: Platycod. H. Salbei: Salvia				Wicconkney C. D. C.
Mauerfan: Asplenium F Sandglöckden: Jasione N Steinnicht Alyssum N Wiesenschaumkraut/Cardam.H Mauerpfeffer: Sedum acre N Sandniere: Arenaria N Steinnist Alyssum N Winderlandigi: Baptisia II M Mauerpfeffer: Sedum acre N Sandniere: Arenaria N Steinnist Alyssum N Winderlandigi: Baptisia II M Meerkohl: Crambe II Schafgarbe: Achillea N N H Steinnose: Sempervivum N Winderlandigi: Epaptisia I M Winderlandigi: Paptisia I M Winderlandigi: Paptisia I M Winderlandigi: Paptisia I M Winderlandigi: Paptisia N N Meerkohl: Crambe II Schafdroble: Hacquetia N H Steinnose: Sempervivum N Winderlandigi: Paptisia I M Winderlandigi:	Marian alakaphl + Platyand H	Salbai Salvia	Steinkresse: Aethionema N	Wiesenraute: Theliatrum H
Mauerfarn: Asplenium F Sandglöckchen: Jasione N Steinrose: Sempervium N Windralm: Agrostis Jg Mauerraute: Paronychia N Saamkiere: Arenaria N Steinrose: Sempervium N Windralm: Agrostis Zg Steinsame: Lithospermum N Winterakonit: Eranthis N Steinrose: Sempervium N Windralm: Agrostis Zg Steinsame: Lithospermum N Winterakonit: Eranthis N Steinrose: Sempervium N Winterakonit: Eranthis N Steinsame: Lithospermum N Wint		Salomonssiegel Polygonatum H	Steinnelke: Tunica N	Wiesenschaumkraut: Cardam H
Mauerpfeffer; Šedum acre N Mauerraute; Paronychia N Maerkoli: Crambe . 11 Milsfarn: Asplenium F Schafgarbe; Adrillea N u. II Milsfarn: Asplenium F Schafdrolde: Hacquetia N Mohn: Papaver II Mohn: Papaver II Mohn: Papaver II Mohning: Meconopsis II Mooskraut: Selaginella N Schaublatt: Tarella N Sternlilie: Lilium concol. Bz Winterling: Eranthis N Sterlilie: Lilium concol. Bz Winterling: Winterling: Eranthis N Sterlilie: Lilium concol. Bz Winterling: Winterling: Minterling: Minte				
Maerkoll: Crambe . H. Meerkoll: Crambe . H. Milefarn: Asplenium . F. Mohni Papawer . H. Milefarn: Asplenium . F. Mohni Papawer . H. Schafdarder k-drillea . Nu. H. Schafdschell: Fritill. mel. Bz. Steppenkraut: Seseli . N. Winteraster: Chrysant. ind. H. Mohni Papawer . H. Schaftdolde: Hacquetia . N. Sterndolde: Astrantia . N. H. Wintergüin: Pirola N. Mohling: Meconopsis . H. Schattehblüm: Mainthem. N. Sternfolde: Lilium concol. Bz. Moldschwanz: Saururus . S. Schattehblüm: Mainthem. N. Sternfolde: Lilium concol. Bz. Winterligiz: Franthis . N. Moskitogras: Bouteloua . Zg. Schaublatt: Rodgersia . H. Moosmiere: Mochringia . N. Moskitogras: Bouteloua . Zg. Scheindotter: Erysimum . N. Stranddistel: Eryng. maritim. N. Moskitogras: Bouteloua . Zg. Scheindotter: Erysimum . N. Stranddistel: Eryng. maritim. N. Molfreich: Veilden: Violand. N. Moskitogras: Bouteloua . Zg. Scheindotter: Erysimum . N. Stranddistel: Eryng. maritim. N. Wollgras: Eriophorum . Zg. Nachterze: Oenothera N. H. H. Nachtviole: Hesperis . H. Scheinsjere: Gillenia . H. Straudmalve: Lavatera . H. Nachtviole: Hesperis . H. Scheinziest: Stadys . H. Scheinziest: Stadys . H. Scheinziest: Stadys . H. Scheinziest: Stadys . H. Schildblume: Chelone . H. Nieswurz: Helleborus . N. Schildblatt: Peltiphyllum . H. Nieswurz: Helleborus . N. Schildblatt: Peltiphyllum . H. Nelsenwurz: Geum . N. H. Schleigenbart: Ophiopogon S. Schleine: Lell-Rational . H. Schleigenbart: Ophiopogon S. Schleine: Lell-Rational . H. Schleigenbart: Chelone . N. Schleig				Windhalm: Agrostis Zo
Meerkohl: Crambe . 11 Schafgarbe: Achillea . Nu. H Milzfarn: Asplenium F Schachbrettlib.: Fritill. mel. Bz Mohn: Papaver . 11 Mohnling: Meconopsis H Mohn: Papaver . 11 Mohnling: Meconopsis H Mohn: Maianthem. N Mohnshwanz: Saururus S Schaublatt: Rodgersia . H Sterndolde: Astrantia . Nu. H Moskitogras: Bouteloua . Zg Schaublatt: Rodgersia . H Schaubhlime: Cardamine H Moskitogras: Bouteloua . Zg Mummelk: Silene . N Schaumhelke: Silene . N Schaumhelke: Silene . N Schaumhelke: Silene . N Schaumhelke: Silene . N Scheinhanft: Datisca . H Scheinhanft: Datisca . H Nabelkraut: Matricaria . N Scheinhanft: Datisca . H Nabelkraut: Matricaria . N Scheinhanft: Datisca . H Nachtvoice: Hesperis . H Scheinspiere: Gilenia . H Nachtvoice: Hesperis . H Scheinspiere: Gilenia . H Nieswurz: Helleborus . N Schildblatt: Peltiphyllum H Nieswurz: Helleborus . N Schildblatt: Peltiphyllum: Chelone . H Schildblatt: Peltiphyllum: Chelone . H Schildblatt: Peltiphyllum: Chelone . H Schildblume: Chelone . H Schildblatt: Peltiphyllum: Datisca . H Schildblume: Chelone . H Schildblume: Chelon				Winterakonit: Eranthis N
Möhn: Papawer H. Mohnling: Meconopsis H. Mookwanz: Saururus Schaublatt: Rodgersia II. Moskraut: Selaginella N. Schaublatt: Rodgersia H. Moskitogras: Boutelous Zg. Mohnmella: Silene N. Moskitogras: Boutelous Zg. Mohnmella: Silene N. Moskitogras: Boutelous Zg. Mutterkraut: Matricaria N. Mohnling: Nuphar Scheindolter: Erysimum N. Mohlkraut: Cotyledon N. Mohlkraut: Meconopsis H. Nachtviole: Hesperis H. Nelke: Dianthus N. Schildblatt: Peltiphyllum M. Nelkenwurz: Geum N. H. Schildblume: Chelone H. Nelkenwurz: Helleborus N. Schildblatt: Stadiys H. Nelkenwurz: Helleborus N. Schildblatt: Schilling N. N. Mohlkraut: Otyledon H. Schildblume: Chelone H. Schildblume: Chelone H. Schildblume: Schilling N. N. Mohlkraut: Garania H. Schildblume: N. N. Mohlkraut: Garania H. N. Mohlkraut: Peltiphyllum H. Schildblume: Schildblume: Schildblume: N. N. Mohlkraut: Garania H. Schildblume: M. N. Mohlkraut: Garania H.				Winteraster: Chrysant. ind. H
Mohlnig: Meconopsis — H Molkschwanz: Saururus — S Molkschwanz: Saururus — S Mooskraut: Selaginella — N Moosmiere: Mochringia — N Moskitogras: Bouteloua — Zg Moskitogras: Bouteloua — Zg Mummel: Nuphar — S Mutterkraut: Matricaria — N Machitanti: Carlamine — N Machitanti: Carlamine — N Mummel: Nuphar — S Mutterkraut: Matricaria — N Nabelkraut: Cotyledon — N Scheinhanf: Datisca — H Nachitviole: Hesperis — H Nachtviole: Hesperis — H Nachtviole: Hesperis — H Nachtviole: Hesperis — H Nelke: Dianthus — N Nelke: Dianthus — N Nelke: Dianthus — N Nelkenwurz: Geum — N N Chiswartz: Helleborus — N Childblatt: Peltiphyllum — H Nachsenauge: Buphtalmum — H Odssenauge: Anchusa — H Pampasgras: Cortaderia — Zg Pantoffelblume: Calceolaria N Pantoffelblume: Calceolaria N Pantoffelblume: Calceolaria N Papelmalve: Malva — H Peitschenaffodill: Asphodel. H Perfahron: Onoclea — F Pestwurz: Petasites — H Pfahlroh: Arundo — Zg Schwarzköpfden: Lepachysh H Pfahlroh: Arundo — Zg Schwarzköpfden: Lepachysh H Pfallroh: Arundo — Zg Schwarzköpfden: Lepachysh H Pfellaron: Peltandra — S Pfeilkraut: Sagittaria — S Schwarzköpfden: Lepachysh H Pymin: Thymus — N Pyerjeric Ranthis — N Strandhiste: Lilium conson: A Strellblite: Althware: Althwork M Stotchshabel: Geranium N Stotchshabel: Geranium N Strandhistel: Exyng. maritim. N Strandhistel: Exyn		Schachbrettbl.: Fritill. mel. Bz	Steppenkraut: Seseli N	Wintergrün: Pirola N
Moldsschwanz: Saururus Schaumblüte: Rodgersia II Mooskraut: Selaginella Nothoskraut: Selaginella Nothoskraut: Selaginella Nothoskraut: Selaginella Nothoskraut: Selaginella Nothoskraut: Cardamine II Schaumkraut: Cardamine II Schaumkraut: Cardamine II Wohlriech. Veilchen. Viola od. Nother Nothing Nother II Nother Scheindotter: Erysimum Nother II Nother Scheindotter: Erysimum Nother Erysimum Nother II Noth	Mohn: Papaver H	Schaftdolde: Hacquetia N	Sterndolde: Astrantia . N u. H	Winterheliotrop: Petasites . N
Mooskraut: Selaginella Nooskraut: Cardamine Hoosmiere: Mochringia Nooskraut: Cardamine Hoosmiere: Mochringia Nooskraut: Cardamine Hoosmiere: Mochringia Nooskitogras: Bouteloua Zg Schaumkraut: Cardamine Hoosmiere: Silene Nooskitogras: Bouteloua Zg Schaumkrant: Cardamine Hoosmiere: Eysimum Nooskitogras: Bouteloua Zg Scheindotter: Eysimum Nooskitogras: Bouteloua Nooskitogras: Bouteloua Nooskitogras: Bouteloua Nooskitogras: Bouteloua Nooskitogras: Bouteloua Nooskitogras: Solidate N	Mohnling: Meconopsis H	Schattenblüm.: Maianthem. N	Sternlilie: Lilium concol Bz	Winterling: Eranthis N
Mosmiere: Moshringia . N Moskitogras: Bouteloua . Zg Mummell: Nuphar . S Schaumhcatt: Cardamine . H Mummel: Nuphar . S Mutterkraut: Matricaria . N Nabelkraut: Cotyledon . N Nabelkraut: Cotyledon . N Nachtkerze: Oenothera Nu. H Nachtviole: Hesperis . H Nachtviole: Hesperis . H Narzisse: Narcissus . Bz Nelke: Dianthus . N Schindolter: Erysimum . N Scheinkalla: Lysichitum . S Scheinmohn: Meconopsis . H Nachtviole: Hesperis . H Narzisse: Narcissus . Bz Nelke: Dianthus . N Schildblatt: Peltiphyllum . H Schildblume: Chelone . H Nieswurz: Geum . N u. H Schildblume: Chelone . H Nieswurz: Helleborus . N Ochsenauge: Buphtalmum . H Schlangenkraut: Cimicifuga . H Palmilile: Yucca . H Schleierkraut: Gypsoph. N u. H Pampasgras: Cortaderia . Zg Pantoffelblume: Calceolaria . N Pappelmalve: Malva . H Perfan: Onoclea . F Perlmutterglöckch: Mertens. N Perlpföttchen: Anaphalis . H Perfan: Onoclea . F Perlmutterglöckch: Mertens. N Perlpföttchen: Anaphalis . H Pestswurz: Petasites . H Pfablrohr: Arundo . Zg Pfefferminze: Mentha . H Pfellaron: Peltandra . S Schwadengras: Glyceria . Zg Pfefferminze: Mentha . H Pfellaron: Peltandra . S Schwadengras: Glyceria . Zg Pfefferminze: Mentha . H Pfellaron: Peltandra . S Schwadengras: Glyceria . Zg Pfefferminze: Mentha . H Pfellaron: Peltandra . S Schwadengras: Glyceria . Zg Pfefferminze: Mentha . H Pfellaron: Peltandra . S Schwertlilie: Iris . H Pflymica . H Powerspiere: Astibe crispa N Proplematic i Errophorum . N Strandhätel: Expramaritim. N Wohlriedeh: Anuh . W Wolknöterich: Eriogonum . N Strandhafe: Etatice . N u. H Wolknöterich: Eriogonum . N Strandhätel: Expramaritim. N Wolknöterich: Eriogonum . N Strandhätel: Expramaritim. N Wolkranter: Statice . N u. H Strandhäfeer: Statice . N u. H Wutstenclony . N Strandhätel: Expramaritim . N Wolkranter . Ly Witstenclony . N Wutstenclony . N Wutsten	Molchschwanz: Saururus . S	Schaublatt: Rodgersia H	Sternmoos: Sagina N	Witwenblume: Scabiosa H
Moskitogras: Bouteloua	Mooskraut: Selaginella N	Schaumblute: Harella N	Stielblütengras: Miscanthus Zg	Wolfsmilch: Euphorbia Nu.H
Mutterkraut: Matricaria N Scheinhalla: Lysichitum N Scheinhalla: N Schildblatt: Peltiphyllum H Schildblume: Chelone H Schildblume: Chelone H Schildblume: Chelone H Schildblume: Chelone H Schildblume: N Schildblume: N Schildblume: Chelone H Schildblume: N Schildblume: N Schildblume: N Schildblume: Chelone H Schildblume: N Schildblume:	Maskitagras Routsland Zr	Schaumnelke: Silene	Stockmalve: Althaea	Wohlmanleib A N
Mutterkraut: Matricaria N Scheinhanf: Datisca	Mummel: Number S	Scheindotter: Erysimum N	Stranddistal: Ervng maritim N	Wollgras Frienhoum
Nachtkerze: Oenothera Nu. H Nachtkerse: Oenothera Nu. H Nachtviole: Hesperis . H Nachtviole: Hesperis . H Scheinspiere: Gillenia . H Nachtviole: Hesperis . H Scheinspiere: Gillenia . H Nachtwiole: Hesperis . H Scheinspiere: Gillenia . H Nachtwiole: Hesperis . H Scheinspiere: Gillenia . H Nachtwiole: Hesperis . H Scheinspiere: Gillenia . H Nelker Dianthus . N Schildblatt: Peltiphyllum H Nelkenwurz: Geum . N u. H Schildblume: Chelone . H Nieswurz: Helleborus . N Schildblatt: Peltiphyllum H Schildblume: Chelone . H Nieswurz: Helleborus . N Schildblatt: Peltiphyllum H Schildblume: Chelone . H Ochsenauge: Buphtalmum H Ochsenauge: Buphtalmum H Ochsenauge: Anchusa H Palmplilie: Yucea . H Pampasgras: Cortaderia Zg Schlangenbart: Ophiopogon S Schleierkraut: Gypsoph. N u. H Pampasgras: Cortaderia Zg Pantoffelblume: Calceolaria N Pappelmalve: Malva H Paradiesilie: Paradisea H Pechnelke: Viscaria H Pechnelke: Viscaria H Pethschenaffodill: Asphodel. H Perlfarn: Onoclea F Schneeckissen: Iberis N Perlpfötchen: Anaphalis H Perlmutterglöckch: Mertens. N Perlpfötchen: Anaphalis H Schneekissen: Iberis N Perlpfötchen: Anaphalis H Schwarlsöpfchen: Lepadys H Pfablrohr: Arundo Zg Schwarzköpfchen: Lepadys H Pfablrohr: Arundo Zg Schwarzköpfchen: Lepadys H Pfeilaron: Peltandra S Schwarlsiner: Rainuncul. N Pfeilkraut: Sagittaria S Schwertlilie: Iris H Pfeilaron: Thymus N Swadengras: Clipteria H Straufmohn: Macleava H Straudfmohn: Macleava H Strauffmohn: Mac	Mutterkraut: Matricaria N	Scheinhanf: Datisca H	Strandflieder: Statice . Nu. H	Wollknöterich: Eriogonum N
Nachtkerze: Oenothera N. u. H. Nachtkerze: Oenothera N. u. H. Nachtkerze: Hesperis H. Nachtkerze: Hesperis H. Nachtkerze: Hesperis H. Nachtkerze: Narcissus Bz. Acterizes: Stachys H. Scheinziest: Stachys H. Scheinziest: Stachys H. Nelker Dianthus N. Nelker Dianthus N. Nelkenwurz: Geum N. u. H. Nieswurz: Helleborus N. Ochsenauge: Buphtalmum H. Ochsenauge: Buphtalmum H. Schildblume: Chelone H. Schildblume: Chelone H. Ochsenauge: Buphtalmum H. Schildkraut: Scutellaria N. Sturmhut: Aconitum H. Ysop: Hyssopus H. Ochsenauge: Andusa H. Palmalilie: Yucca H. Schleierkraut: Gypsoph. N. u. H. Pampasgras: Cortaderia Zg. Pantoffelblume: Calceolaria N. Schleierkraut: Gypsoph. N. u. H. Paradiseilie: Paradisea H. Schleierblume: Primula N. Pappelmalve: Malva H. Pednelke: Viscaria H. Beitschenaffodill: Asphodel. H. Schneekide: Erica carnea Hz. Perlfarn: Onoclea F. Perlmutterglöckch: Mertens N. Perlpfötchen: Anaphalis H. Schneekissen: Iberis N. Tausendkorn: Herniaria N. Zwergbaldrian: Valeriana N. Perlpfötchen: Anaphalis H. Schriffarn: Ceterach F. Perlmutterglöckch: Mertens N. Schneekissen: Dennstaedtia F. Perlfarninze: Mentha H. Schwarzköpfden: Lepadys H. Pfellaron: Peltandra S. Schwartlilie: Iris H. Thymian: Thymus N. Zwergspilox: Phlox N. Preinfschaumkraut: Cardam. N. Zwergspilox: Phlox N. Preinfschaumkraut: Sagittaria S. Schwartlilie: Iris H. Thymian: Thymus N. Zwergspilox: Phlox N. Preinfschaumkraut: Sagittaria S. Schwartlilie: Iris H. Thymian: Thymus N. Zwergspilox: Phlox N. Zwergspilox: Phlox N. Preinfschaumkraut: Sagittaria Schwalbenwurz: Asclepias H. Teufelskralle: Phyteuma N. Zwergspilox: Phlox N. Preinfschaumkraut: Cardam. N. Zwergspilox: Phlox N. Pr	Nabelkraut: Cotyledon N	Scheinkalla: Lysichitum S	Strandhafer: Elymus Zg	Wucherblume: Chrysant.max. H
Nachtviole: Hesperis	Nachtkerze: Oenothera Nu. II	Scheinmohn: Meconopsis . H	Strauchmalve: Lavatera H	Wüstenfeinstrahl: Bahia N
Narzisse: Narcissus Nelke: Dianthus Nelke: Dia	Nachtviole: Hesperis H	Scheinspiere: Gillenia H	Straußmohn: Macleaya H	Wüstengoldaster: Eriophyll. N
Nelkenwurz: Geum Nu, H Nieswurz: Helleborus N Ochsenauge: Buphtalmum H Schildkraut: Scutellaria N Ochsenauge: Anchusa H Palmlilie: Yucca H Pampasgras: Cortaderia Zg Pantoffelblume: Calceolaria N Pappelmalve: Malva H Paradieslilie: Paradisea H Pachnelke: Viscaria H Petitschenaffodill: Asphodel. H Perlfarn: Onoclea F Perlmutterglöckch.: Mertens N Perlpfötchen: Anaphalis H Pestwurz: Petasites H Pestwurz: Petasites H Pefferminze: Mentha H Pefferminze: Mentha I Pefellaron: Peltandra Schwarzköpfchen: Lepachys R Pfeilkraut: Sagittaria S Schwertlilie: Iris . H Schildblume: Chelone H Schueldlaria N Sturmhut: Aconitum H Scumpfanemone: Anemopsis S Sumpfanemone: Anemopsis S Sumpfotterblume: Caltha N Sumpfeibisch: Hibiscus S Sumpfkalla: Calla S Sumpfeibisch: Hibiscus S Sumpfkalla: Calla S Sumpfrose: Limnanthemum S Sumpfrose: Limnanthemum S Siterspargel: Asparagus H Tagblume: Commelina N Taglilie: Hemerocallis H Tannenwedel: Hippuris S Tausendkorn: Herniaria N Tausendkorn: Herniaria N Tausendkorn: Herniaria N Teppidhhartriegel: Cornus N Teppidhhox: Phlox subul. N Teppidhschaumkraut: Cardam. N Teppidschaumkraut: Cardam. N Teufelskralle: Phyteuma N Tewergspiere: Astilbe crispa N	Narzisse: Narcissus Bz	Scheinziest: Stachys H	Streifenfarn: Athyrium F	Wundklee: Anthyllis N
Nieswurz: Helleborus . N Ochsenzuge: Buphtalmum . H Ochsenzuge: Buphtalmum . H Ochsenzuge: Buphtalmum . H Ochsenzuge: Anchusa	Nelke: Dianthus N	Schildblatt: Peltiphyllum . H	Strohblume: Helydrisum . N	Wurmfarn: Dryopteris F
Ochsenzunge: Buphtalmum H Ochsenzunge: Anchusa H Ochsenzunge: Anchus	Nelkenwurz: Geum Nu. H	Schildblume: Chelone H	Strohblume: Anaphalis N	Ysander: Pachysandra N
Ochsenzunge: Anchusa H Palmlilie: Yucca H Palmlilie: Yucca H Schleierkraut: Gypsoph. Nu. H Pampasgras: Cortaderia Zg Pantoffelblume: Calceolaria N Pappelmalve: Malva H Paradieslilie: Paradisea H Paradieslilie: Paradisea H Pethnelke: Viscaria H Pethnelke: Viscaria H Pethnelke: Viscaria H Perlfarn: Onoclea Ferlautterglöckch.: Mertens N Perlpfötchen: Anaphalis H Pestwurz: Petasites H Schneedied: Erica carende H Schneedied: Ferlautterglöckch.: Mertens N Pethnelke: Mertens N Schwertlilie: Dennstaedtia F Petasites H Schwadengras: Glyceria Zg Schwalbenwurz: Asclepias H Schwadengras: Glyceria Zg Schwalbenwurz: Asclepias H Schwertlilie: Iris M Zwergspiere: Astilbe crispa N	Nieswurz: Helleborus N	Schildkraut: Scutellaria N	Sturmhut: Aconitum H	Ysop: Hyssopus H
Palmlilie: Yucca	Ochsenauge: Buphtalmum . H	Schlangenbart: Ophiopogon S	Sumptanemone: Anemopsis. S	Zaunlihe: Paradisea H
Pampasgras: Cortaderia Zg Schleifenblume: Iberis . N Pantoffelblume: Calceolaria N Schlüsselblume: Primula . N Pappelmalve: Malva	Palmilie: Yucca H	Schleierkraut: Cypsoph N. H.	Sumpfaotterblume: Caltha . N	Zaprchenkraut: Uvularia . N
Pantoffelblume: Calceolaria N Pappelmalve: Malva	Pampasgras: Cortaderia Z.g	Schleifenblume: Iberis N	Sumpferoisal. Thoiseus S	Zierenargel: Asparagus H
Pappelmalve: Malva				
Paradieslilie: Paradisea H Schneeglöckchen: Galanthus Bz Pechnelke: Viscaria H Schneeheide: Erica carnea Hk Taglilie: Hemerocallis . H Zwergbladian: Valeriana . N Zwergblelis: Bellis N Zwergblokenblume: Carne. N Zwergbloke				
Pechnelke: Viscaria	Paradieslilie: Paradisea . H	Schneeglöckchen: Galanthus Bz	Tagblume: Commelina N	Zwergalant: Inula N
Peitschenaffodill: Asphodel. H Perlfarn: Onoclea F Perlmutterglöckch.: Mertens. N Perlpfötchen: Anaphalis H Pestwurz: Petasites H Pfahlrohr: Arundo Zg Pfeilaron: Peltandra Schwarzköpfchen: Lepachys H Pfeilkraut: Sagittaria	Pednelke: Viscaria H	Schneeheide: Erica carnea Hk	Taglilie: Hemerocallis H	Zwergbaldrian: Valeriana . N
Perlmutterglöckch.: Mertens. N. Perlpfötchen: Anaphalis . H. Pestwurz: Petasites H. Pfahlrohr: Arundo Zg. Pfefferminze: Mentha				Zwergbellis: Bellis N
Perlpfötchen: Anaphalis Pestwurz: Petasites Pfablrohr: Arundo Pfefferminze: Mentha Pfeilaron: Peltandra Pfeilkraut: Sagittaria Schwarzköpfchen: Lepachys H Pfeilkraut: Sagittaria Pfeilkraut: Sagittaria H Schriftfarn: Ceterach F Teppichkamille: Matricaria N Teppichkamille: Matricaria N Zwerghahnenfuß: Ranuncul N Teppichkamille: Matricaria N Zwergmargerite: Anacyclus N Zwergminze: Mentha N Zwergphlox: Phlox N N Zwergschwertlilie: Iris pum. N	Perlfarn: Onoclea F	Schneerose: Helleborus N		
Pestwurz: Petasites	Perlmutterglockch.: Mertens. N	Schöllkrautmohn: Stylophor. H		
Pfahlrohr: Arundo Zg Schwarzköpfchen: Lepachys H Teppichphlox: Phlox subul N Zwergminze: Mentha N Pfefferminze: Mentha N Schwadengras: Glyceria Zg Teppichschaumkraut: Cardam.N Zwergphlox: Phlox N Zwergschwertlilie: Iris pum. N Pfeilkraut: Sagittaria S Schwalbenwurz: Asclepias H Thymian: Thymus N Zwergspiere: Astilbe crispa N	Peripiotenen: Anaphalis . H	Schriftarn: Ceterach F		
Pfefferminze: Mentha Pfeilaron: Peltandra Schwadengras: Glyceria Pfeilaron: Peltandra Schwalbenwurz: Asclepias H Teufelskralle: Phyteuma N Zwergshwertlilie: Iris pum. N Pfeilkraut: Sagittaria Schwartlilie: Iris H Thymian: Thymus N Zwergspiere: Astilbe crispa N	Pfahlrohr: Arunda	Schwarzkönfthan I - I		Zwergmargerite: Anacyclus N
Pfeilaron: Peltandra S Schwalbenwurz: Asclepias . H Teufelskralle: Phyteuma N Zwergschwertlilie: Iris pum. N Pfeilkraut: Sagittaria S Schwertlilie: Iris H Thymian: Thymus N Zwergspiere: Astilbe crispa N	Pfefferminge: Menths H	Schwadengras: Glycoria	Tennichechaumkraut Cardan N	Zwergphlov Phlor
Pfeilkraut: Sagittaria S Schwertlilie: Iris H Thymian: Thymus N Zwergspiere: Astilbe crispa N	Pfeilaron: Peltandra	Schwalbenwurz: Asclepias H	Teufelskralle: Phyteuma N	Zwergschwertlilie: Iris pum N
Pfingstrose: Paeonia H Schwingel: Festuca Zg Tigerlilie: Lilium tigr Bz Zypergras: Cyperus Zg	Pfeilkraut: Sagittaria S	Schwertlilie: Iris H	Thymian: Thymus N	Zwergspiere: Astilbe crispa N
	Pfingstrose: Paeonia H	Schwingel: Festuca Zg	Tigerlilie: Lilium tigr Bz	Zypergras: Cyperus Zg

Inhaltsverzeichnis

(Nomenklatur nach Dr. Zander)

0	C +1	C 44.	C *1
Seite	Seite	Seite	Seite
Abies 92	Arundinella 74	Chrysaboltonia 10	Elaeagnus 90
Acaena 17	Arundo 74	Chrysanthemum 11, 26, 53, 54	Elsholtzia 83
Acantholimon 17	Asarum	Chrysogonum 26	Elymus
Acanthus 17, 48	Asclepias 49	Chrysopogon 15	Empetrum 80
Acer 82, 89, 92	Asparagus 49	Chrysopsis 26	Ephedra 87
Adrillea 9, 17, 48	Asperula 24, 73	Chrysosplenium 26	Epilobium 28, 56
Aconitum	Asphodeline 9, 49	Cimicifuga 11,54 Circaea 26	Epimedium 28 Equisetum
Acorus	Asphodelus 50 Asplenium 78	Cirsium 26	Eranthis 28
Actinidia 93	Aster 9, 10, 24, 50, 51	Clematis 54, 93	Eremurus 56
Adenophora 17, 48	Astilbe 10, 24, 51, 52	Clethra 80	Erianthus 74
Adiantum 78	Astragalus 24	Colchicum	Erica 15, 79, 80
Adonis	Astrantia 24, 52	Colutea 89	Erigeron 11, 28, 56
Aegopodium 48	Athyrium 78	Commelina	Erinus 28
Aesculus 92	Aubrietia 10, 24	Convallaria 26	Eriogonum 28
Aethionema 17	Avena 74	Convolvulus 16	Eriophorum 74
Agrostis 74	Azalea 15, 80	Coreopsis 11, 26, 54	Eriophyllum 28
Ailanthus 92	Azorella 24	Cornus 26,89	Erodium 28
Aira 74	Bahia 24	Coronilla 26, 89	Eryngium 11, 28, 56
Ajuga 17, 20	Baptisia 52	Cortaderia 74	Erysimum 28
Akebia 93	Beerenobst 95	Cortusa 26	Erythronium
Alchemilla 20	Bellium	Corydalis 26	Escallonia 16
Alisma	Berberis 82, 83, 89	Corylus	Eupatorium 56
Allium 9, 20, 73	Bergenia 24, 25 Betula 83, 92	Cotolo	Euphorbia 28, 56 Evonymus 16, 83, 90
Alnus	Blechnum	Cotula 26 Cotyledon 26	Exodorda 90
Alstroemeria 48	Bouteloua	Crambe 54	Fagus
Althaea 48	Bruckenthalia	Crataegus 89, 92	Festuca
Alyssum 20	Brunella 25	Crepis	Filipendula 56
Amelanchier 89	Buddleia 16, 89	Crinum 54	Fontanesia 90
Amorpha 89	Buphtalmum 52	Crucianella 11, 26	Forsythia 90
Amsonia 48	Butomus 75	Cryptogramma 78	Frankenia 11
Amygdalus 82	Buxus 92	Cryptomeria 87	Fraxinus 92
Anacyclus 20	Calceolaria 25	Cyanthus 26	Fritillaria
Anaphalis 20, 48	Calimeris 52	Cyclamen 26	Fuchsia 16,83
Andrusa	Calla	Cydonia 89	Gaillardia 11, 29, 56
Andromeda 80	Callianthemum	Cyperus	Galanthus
Andropogon	Calluna 15, 79	Cypripedium 27	Galax 29
Androsace 20 Anemone 9, 20, 21, 49	Caltha	Cystopteris	Galega
Anemone 9, 20, 21, 49	Calycanthus 89 Calystegia 52	Cytisus 16, 83 Daboecia 80	Galium
Antennaria	Canystegia	Dahlie (Mignon) 78	Gaultheria 80
Anthemis 9, 21, 49	Campsis	Daphne 80	Genista 86
Anthyllis 21	Caragana 83	Datisca 54	Gentiana 29, 56
Antirrhinum 21	Cardamine 25, 52	Decaisnea 89	Geranium 11, 29
Aponogeton 75	Carex 15,74	Delphinium . 11, 27, 54, 55	Geum 11, 29, 56, 58
Aposeris 21	Carlina 25	Dennstaedtia 78	Gillenia 58
Aquilegia 9, 21, 49	Carpinus	Desmodium 89	Gladiolus 77
Arabis 9, 21	Caryopteris 83	Deutzia 89, 90	Glechoma 29
Aralia 49, 89	Cassiope 80	Dianthus 11, 27	Globularia 29
Arctostaphylos 80	Castanea 92	Dicentra 27, 55	Glyceria 74
Arenaria	Ceanothus 89	Dictamnus 55	Gratiola 29
Argemone 49	Cedrus	Diervilla	Gunnera
Aristolochia	Celastrus	Digitalis	Gypsophila . 12, 29, 30, 58
Armeria	Centaurea . 10, 25, 26, 52	Dodecatheon 27	Haberlea 30
Arnebia 21 Arnica 9, 21, 49	Centranthus	Doronicum	Hacquetia 30 Hamamelis 90
Aronia	Cerastium	Douglasia	Hedera
Arrhenatherum 74	Ceratostigma 26, 53	Dracocephalum 28, 55	Helenium
Artemisia : 24, 49, 73	Ceterach	Dryas 28	Helianthella
Arum 49	Chamaecyparis . 16, 87, 92	Dryopteris	Helianthemum 12, 30
Aruncus 49	Chelone 53	Edinops 56	Helianthus 58
Arundinaria 74	Chiastophyllum 26	Edraianthus 28	Helychrisum 30
			*

Seite	Seite	Seite	Seite
Heliopsis 58, 59	Maianthemum 32		
Helleborus 12, 30		Philadelphus 86, 91	Sempervivum 14, 44
	Malus 90	Phlomis 67	Senecio 14, 16, 44, 71
Heloniopsis 30	Malva 66	Phlox 13, 35, 38, 68, 69	Sescli 44
Hemerocallis 12, 59	Marrubium 32	Phyllitis 13, 79	Sesleria
Hepatica 30	Marsilia 75	Phyllodoce 16, 82	Shortia 44
Heracleum 59	Matricaria 32	Physalis 69	Sidalcea 71
Herniaria 30	Matteucia 79	Physocarpus 91	Sideritis 44
Hesperis 59	Mazus	Physostegia 13, 69	Silene 44, 45
Heuchera 30, 59	Meconopsis 66	Phyteuma 38	Silphium 72
Hibiscus 75, 90	Melica 74	Phytolacca 69	Sisyrinchium 45,72
Hieracium 30	Melissa 66,73	Picea 87, 92	Soldanella 45
Hippophae 90	Menispermum 93	Pinus 87, 92	Solidago 14, 45, 72
Hippuris 75	Mentha 32, 66, 73	Pirola	Sorbus
Homogyne 30	Menyanthes	Plantago	Spiraea 86, 87, 91
Horminum 30	Mertensia 32, 66		Spiraea
Hosta 59	Meum 66	Platanus	Sporobolus
Houstonia 30	Micromeria 32	Platycodon 69	Stachys 45, 72
Humulus		Podophyllum 69	Statice 45, 72
Hutchinsia 30	Mimulus 13, 32, 66	Polemonium 38, 69	Stenanthium
	Minuartia 32	Polygala 86	Stipa 75
Hydrangea 16, 90	Miscanthus 74,75	Polygonatum 69	Stokesia 72
Hydrocharis	Mitchella 32	Polygonum 38, 69, 93	Stratiodes 76
Hypericum . 12, 30, 31, 86	Mitella	Polypodium 79	Stylophorum 14
Hypsella	Moehringia 32	Polystichum 13,79	Symphiandra 45
Hyssopus 59, 73	Molinia 75	Pontederia 13,76	Symphoricarpus 91
Iberis	Moltkia 34	Populus 92	Symphytum 45
Ilex 80	Monarda 13,66	Potentilla 13, 16, 38, 69, 70, 86	Synthyris 45
Incarvillea 12, 31, 59	Monbretia	Poterium 70	Syringa 91
Inula	Morina 66	Primula 14, 38, 39	Tamarix 91
Iris 12, 31, 62, 63	Morus 90	Prunus 82, 91	Tanacetum 45
Jasione	Muehlenbeckia 86	Pseudotsuga 92	Taxus 87, 92
Jasminum	Mulgedium 66	Ptelea 91	Teucrium 45, 87
Juniperus 16, 87, 92	Muscari	Pteridium 79	Thalictrum 72
Kalmia 80	Myosotis 13, 34	Pterocephalus 39	Themeda 75
Kerria 90	Myrica 86	Pulmonaria	Thermopsis 72
Kirengeshoma 12	Narcissus	Pyracantha 16,86	Thlaspi 45
Kniphofia 12, 63, 65	Nepeta 13, 34	Pyrethrum 13, 14, 39, 41, 70	Thuya 87, 92
Kolkwitzia 16	Nierembergia 34	Quercus 92	Thymus 14, 45, 73
Laburnum 90, 92	Nuphar	Ramondia 41	Tiarella 45
Lamium 31	Nymphaea 76	Ranunculus . 14, 41, 70, 76	Tilia 92
Larix	Obstbäume etc 95	Raoulia 41	Trachelium 45
Lathyrus 31, 65 Lavandula 12, 65, 73	Oenothera 13, 34, 66	Rheum 70	Trachystemon 72
	Omphalodes 34	Rhododendron 16, 82	Tradescantia 72
Lavatera	Onoclea	Rhus 91	Tricyrtis 72
Ledum 80	Ononis	Ribes 16, 86, 91	Trifolium 46
Leiophyllum 80	Onosma	Robinia 92	Trillium 46
Leontopodium 31, 32	Ophiopogon	Rodgersia 70	Trollius 46, 72, 73
Lepachys	Opuntia 15, 34	Romneya 70	Trapaeolum
Leucoium	Origanum 35,73	Rosen	Tsuga
	Orontium	Roscoea 14, 41	Tunica 14, 46
Lewisia	Osmunda	Rosmarinus 70,73	Tussilago 46
Ligustrum 16, 86, 90, 92	Othonopsis	Rubus 86, 93	Typha
Lilium	Oxalis	Rudbeckia 70, 71	Ulex 87
Limnanthemum 75	Oxytropis 35	Ruscus	Ulmus 92
Linaria	Pachysandra 35 Paconia albifl 13, 66, 67	Ruta 41, 71, 73	Uniola
Lindelofia 65	Danasia and 11 15, 66, 67	Sagina	Uvularia 46
Linum 12, 32, 65	Paeonia moutan 90, 91	Sagittaria 14,76	Vaccinium 82
Lithospermum 32	Panicum	Salix 16, 86, 91, 92	Valeriana 46, 73
Lobelia 65	Papaver 13, 35, 67	Salvia 71, 73	Veratrum 73
Lonicera	Paradisea 67 Paronychia	Sambucus 91	Verbascum 14, 73
Lotus		Sanguinaria 41	Vernonia
Lupinus 12, 65	Parthenocissus 16, 93 Patrinia	Sanguisorba	Veronica 14, 46, 73
Luzula		Santolina 41	Viburnum 87, 91
Lychnis 65	Pelargonium 13 Peltandra	Saponaria 41,71	Vicia 47
Lydisilene 65	Pelthiphyllum 67	Satureia 41	Vinca 14, 15, 47
Lyonia 80	Pennisetum	Saururus	Viola 15, 47
Lysichitum	Pentastemon	Saxifraga . 14, 41, 42, 43, 71	Viscaria 15, 47, 73
Lysimachia 12, 32, 65	Periploca 93	Scabiosa 14, 43, 71	Waldsteinia 47
Lythrum 65	Pernettya 82	Schivereckia	Wistaria 93
Macleaya 13, 66	Perowskia 16, 86	Scutellaria 43, 71	Wulfenia
Magnolia 80, 82	Petasites	Sedum 14, 43, 44, 71, 73	Yucca 15, 73 Zauschneria 15, 47
Mahonia 90	Phalaris	Selaginella	Zizania
- '			

Richtlinien und Ratschläge für den Bezug

Erzielung einer dauernden Kundschaft durch Anpassung an die Wünsche und Bedürfnisse der Gartenliebhaber – innerhalb der naturbegrenzten Möglichkeit – ist Zweck und Ziel unserer Geschäftsführung. Wir wollen Niemand etwas aufdrängen und beraten Gartenliebhaber gerne, nicht oberslächlich und nicht eigennützig. Um Miherfolge zu vermeiden ist es angebracht, uns über Eigenart des Bodens, Sonnen- oder Schattenlage zu unterrichten, und uns Ersatz zu überlassen, wenn wir diese oder jene Art und Sorte nicht für geeignet halten.

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung

Mit wenigen Ausnahmen sind die Preise dieses Kataloges die vom Reichsnährstand festgesetzten Richtpreise. Sie verstehen sich in Reichsmark, ab unserer Gärtnerei. Bei persönlichem Aussuchen in unseren Kulturen sind die Katalogpreise nicht maßgebend.

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 %, bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25 %. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt.

An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. Nach dem Ausland kann nur gegen Voreinsendung des Betrages geliefert werden.

Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.

Muster

Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu umgehen.

Lieferung

Die Erledigung der Aufträge erfolgt zu geeigneter Pflanzzeit in der Reihenfolge ihres Eingangs. Kleinere Aufträge unter fünf Mark werden nicht bestätigt. Da es vorkommt, daß Pflanzen infolge ungünstiger Witterung teilweise versandunfähig werden und die verfügbaren Vorräte während der Versandzeit nicht genau bestimmt werden können, übernehmen wir für die vollständige Ausführung eines Auftrages, auch wenn er bestätigt ist, keine Gewähr.

Sortenersatz

Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten behalten wir uns vor, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wird.

Versand und Verpackung

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit zulässig per Eilgut zum Frachtgutsatz, oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt. Für Schäden, die auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht verantwortlich. Die Verpackung wird sorgfältig und sachgemäß ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Fracht, Rollgeld und Zollspesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Gewährleistung

Es werden nur gesunde, lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Gewähr übernommen werden; ausgenommen, wenn wir die Pflege der Pflanzen übernommen haben. Für Sortenechtheit bei Pflanzen wird garantiert, jedoch nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Beschwerden

Beschwerden werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt. Beim Fehlen von Pflanzen bitten wir dringend, das Packmaterial wiederholt auf das genaueste durchzusehen, da es häufig vorkam, daß sich die Pflanzen doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Nachprüfung. Es ist nicht gestattet, einen Rechnungsposten teilweise zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Bahnstation.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.